

PROJET DE PARC SOLAIRE COOPERATIF ET CITOYEN

Commune de Pauilhac (32)

DIAGNOSTIC FLORE-HABITATS ET FAUNE

Pour la SCIC **ENERCOOP Midi-Pyrénées**
26-28 rue Marie Magné, 31300 TOULOUSE



Mathieu MENAND
8 impasse du chêne, 31620 BOULOC
mathieumenand@yahoo.fr - tél. 06.77.79.29.49
n° SIREN 531 425 254

Juillet 2025

SOMMAIRE

Rappel du contexte	2
Méthodologie et déroulement des inventaires.....	3
Résultats.....	3
Description des habitats et végétations.....	3
Cartographie des habitats.....	12
La flore.....	13
La faune	13
Analyse des résultats et enjeux (avérés et potentiels)	14
Discussion et préconisations.....	14
Bibliographie	15
Annexes : listes d'espèces	15

Rappel du contexte

Un projet de parc solaire coopératif et citoyen est en cours d'étude par la SCIC Enercoop Midi-Pyrénées, sur la commune de Pauilhac, dans le département du Gers (32).

La carte ci-dessous montre le périmètre du projet, situé au sud-est du bourg, près d'un petit étang. Les parcelles 52, 1916 et 1917 totalisent environ 1,2 ha et sont propriétés de la commune. Cette ancienne zone cultivée sert aujourd'hui de dépôt de déchets végétaux (source : Enercoop).



L'objectif de la présente étude est d'effectuer un diagnostic de la flore et des végétations en place, ainsi que de la faune qui peut utiliser les terrains concernés pour accomplir son cycle biologique (reproduction, repos, alimentation...).

Méthodologie et déroulement des inventaires

Il s'agissait donc de parcourir l'ensemble de ces terrains, ainsi qu'une bande tampon d'environ 50 mètres de large autour du projet, où un inventaire exhaustif de la diversité floristique et faunistique a été réalisé, ainsi qu'une description des végétations.

L'accent a été porté sur la recherche de potentielles espèces patrimoniales.

Ces inventaires ont été menés en grande majorité à vue, en parcourant le site dans sa totalité, l'accès ne posant aucune difficulté. Certains groupes faunistiques ont pu être étudiés à l'aide de l'ouïe (oiseaux, orthoptères), d'autres à l'aide de matériel particulier (filet à papillons par exemple).

Les inventaires ont été effectués en un seul passage, le 11 juillet 2025. Les conditions météorologiques étaient plutôt bonnes, avec un ciel bien ensoleillé mais des températures très élevées, oscillant entre 25 le matin et 35°C l'après-midi, et un vent léger.

Ces températures élevées, ainsi que la date de prospection assez tardive, ne permettaient pas de réaliser des observations optimales (voir le chapitre en question, notamment sur la faune). Cela dit, la potentialité d'accueil du site peut être étudiée, liée à la nature des terrains et des habitats observés.

Résultats

- **Description des habitats et végétations**

En résumé, la zone d'emprise exacte prévue pour l'installation de panneaux est assez hétérogène. Il s'agit globalement d'une friche herbacée relativement thermophile, avec des ourlets, des plages de ronciers, mais aussi de vastes secteurs recolonisés par des ligneux.

Une petite zone est dédiée au dépôt de déchets végétaux en tous genres. De nombreux petits layons sont tondus régulièrement. Enfin, on retrouve dans la partie sud une zone qui a été creusée et dont la raison ne paraît pas évidente.

Autour, nous trouvons principalement des terrains de sport, des cultures, quelques bosquets, ainsi qu'un plan d'eau à usage récréatif.

Pour chaque type de végétation décrite ci-après, nous proposons une codification issue des nomenclatures classiques que sont Corine Biotope (CB) et Eunis.

Les « friches / ourlets » avec recrues de ligneux

Il s'agit donc des parcelles communales 52, 1916 et 1917, objet du projet en question. C'est une zone qui était auparavant cultivée, il y a environ une dizaine d'années. Depuis, la végétation y a évolué plus ou moins librement, hormis au niveau des zones encore entretenues (pourtour du site, accès au dépôt de déchets verts, petits layons).

Le cortège floristique observé nous permet de « qualifier » la végétation herbacée de « friche / ourlet » plutôt thermophile, sur sol argileux, avec des éléments de prairies et de pelouses, ce qui est en réalité assez inclassable. Il est composé d'environ une quarantaine d'espèces, dont les dominantes sont par exemple l'Agrostide capillaire, l'Aigremoine eupatoire, la Flouve odorante, le Fromental élevé, la Laîche glauque, l'Épilobe de Lamy, la Houle laineuse, le Millepertuis perforé, le Lin à feuilles étroites, le Lotier corniculé, l'Œnanthe faux boucage, la Fétuque faux roseau, le Trèfle des prés...

Localement, nous retrouvons quelques espèces rudérales pionnières en mélange avec le cortège ci-dessus, et de manière plus concentrée notamment autour du dépôt de déchets, ainsi que sur de petits tas de terre qui ont été formés suite au creusement d'un petit carré au sud du site.

Aussi, un cortège conséquent d'herbacées hygrophiles ont été observées ça et là, et de manière plus importante sur la partie basse du site. Elles semblent profiter des conditions édaphiques locales, à savoir un sol relativement argileux qui retient certainement l'eau en période hivernale, ainsi que de conditions stationnelles favorables, comme dans la partie nord du site, située en bas de pente. Les plantes les plus notables sont ici par exemple l'Agrostide stolonifère, la Laîche hérissée, plusieurs joncs (Joncs aggloméré, épars et glauque), la Pulicaire dysentérique, l'Oseille agglomérée...

Enfin, cette zone étant globalement en libre évolution, de nombreux ligneux recolonisent ces terrains, par endroit de manière épars, laissant encore une part belle à la végétation herbacée, mais à d'autres endroits de manière beaucoup plus dense, formant alors de véritables fourrés. Les essences principalement observées sont le Cornouiller sanguin, le Frêne à feuilles étroites, le Prunellier, le Chêne pubescent, l'Orme champêtre, le Saule roux... Les zones les plus denses sont notamment localisées dans les parties est et sud.

CB : 38.1 - pâtures mésophiles x 35.22 - pelouses siliceuses ouvertes permanentes x 34.42 - lisières mésophiles x 31.81 - fourrés médio-européens sur sol fertile / Eunis : E2.1 - pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage x E1.92 - pelouses siliceuses ouvertes pérennes x E5.22 - ourlets mésophiles x F3.11 - fourrés médio-européens sur sols riches



Zones de pelouses et friches/ourlets avec peu de recrues de ligneux, et nombreux layons tondus



Zones de pelouses et friches/ourlets avec peu de recrues de ligneux



Zones avec recrues de ligneux denses et variés



Zones avec recrues de ligneux denses, faciès à Saule roux et ronces

Les bosquets de chênes et frênes et les haies naturelles

Quelques bosquets subsistent autour du site.

Nous retrouvons au sud-est, en partie haute, une chênaie plutôt acidiphile à Chêne sessile, Chêne pubescent, Frêne oxyphylle, Alisier torminal, Charme, Merisier, Erable champêtre, avec une strate arbustive à Néflier, Prunellier, Aubépine monogyne, Cornouiller sanguin, Troène commun... La strate herbacée est assez pauvre, avec notamment le Fragon, le Brachypode des bois, le Lierre grimpant, la Garance voyageuse, le Tamier, etc. Ce type de bois est très classique dans ce genre de secteur.

Au nord-est, le long du ruisseau Pascal, il s'agit d'un bois un peu similaire au précédent, de type chênaie-frênaie, mais un peu plus frais de par la présence d'eau. Les végétations en sous-strates sont équivalentes, avec en plus quelques fougères qui affectionnent particulièrement les berges du petit ruisseau. La strate arborescente est identique, avec en plus quelques peupliers noirs.

En ce qui concerne les haies autour du site, elles sont caractérisées par les mêmes cortèges que l'on retrouve dans les bosquets décrites précédemment. Celle présente juste au nord des terrains du projet (parcelle 51) est en fait du même type que le bosquet à l'est. Elle longe le ruisseau Pascal mais est assez fine (et discontinue) car elle a dû être grignotée à une époque pour les cultures adjacentes. Autour du plan d'eau, ce sont des formations assez similaires, bien que l'on y retrouve quelques espèces horticoles qui ont dû être plantées lors de son aménagement.

Les bosquets et haies jouent un rôle très important pour le déplacement et les cycles de vie de la faune, surtout dans ce type de secteur très agricole.

CB : 41.22 - frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes x 41.55 - chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides / Eunis : G1.A12 - frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes x G1.85 - chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides



Vue extérieure d'un bosquet



Bosquet au sud-est



Bosquet au nord-est



Berges du ruisseau Pascal avec fougères



Haie au nord des terrains (parcelle 51)



Haie sur le talus est du plan d'eau

Les mégaphorbiaies eutrophes et prairies humides

Ces végétations sont très localisées sur le site d'étude, principalement rencontrées le long du ruisseau Pascal (parcelle 51) et sur les berges du plan d'eau (bande très fine).

Il s'agit de communautés à hautes herbes qui se développent en conditions humides, ici nettement eutrophisées, avec par exemple le Liseron des haies, l'Épilobe hirsute, la Grande prêle, la Scrofulaire auriculée, la Morelle douce-amère, la Grande ortie...

Les plus typiques sont présentes au bord du ruisseau, nous retrouvons plus d'espèces des prairies humides sur les berges du plan d'eau (Agrostide stolonifère, Laîche hérissée, Menthes aquatique et à feuilles rondes, Renoncule rampante, Pulicaire dysentérique, et plusieurs joncs). Ce cortège est également rencontré dans une bande enherbée qui longe le ruisseau au nord, sous la culture de colza adjacente, ainsi que le long du bois au sud-est.

Aussi, quelques espèces hygrophiles ont été notées dans une petite dépression creusée au sud de la parcelle 1916, dont certaines des tonsures humides (Jonc des crapauds, Érythrée élégante).

CB : 37.71 - ourlets des cours d'eau x 37.24 - prairies à Agropyre et Rumex / Eunis : E5.411 - voiles des cours d'eau x E3.44 - gazons inondés et communautés apparentées



Mégaphorbiaies le long du ruisseau Pascal



Berges (ceinture très fine non tondue) du plan d'eau



Dépression creusée au sud de la parcelle 1916 avec espèces hygrophiles très éparées



Bande enherbée entre le ruisseau Pascal et une culture de colza, avec végétation hygrophile eutrophe

Les végétations aquatiques et les cressonnières

De manière encore plus localisée que les précédentes, ces végétations ont été observées uniquement à un endroit, dans le ruisseau Pascal, juste à la sortie de l'exutoire du plan d'eau, près de la cabane de pompage ; elles ne représentent donc que 2 à 3 m² maximum.

Les communautés aquatiques sont de 2 types : flottantes / annuelles, à savoir quelques lentilles d'eau éparses, et enracinées / vivaces que sont les herbiers à Groenlandie dense et Callitriche des eaux stagnantes. La cressonnière n'est caractérisée que par une seule plante, l'Ache nodiflore. Nous nous retrouvons donc ici avec des communautés basales, pionnières.

CB : 22.411 - couvertures de Lemnacées x 22.432 - communautés flottantes des eaux peu profondes x 53.4 - bordures à Calamagrostis des eaux courantes / Eunis : C1.32 - végétations flottant librement des plans d'eau eutrophes x C1.341 - communautés flottantes des eaux peu profondes x C3.11 - formations à petits héliophytes des bords des eaux à débit rapide



Ruisseau Pascal au niveau de l'exutoire du plan d'eau et sa cabane de pompage



Communautés enracinées / vivaces



Communautés des cressonnières et lentilles d'eau

Les friches rudérales

Ce sont les végétations typiques des sols remaniés et perturbés, que l'on peut observer à plusieurs endroits autour et sur le site, principalement sur les talus longeant les terrains de sport, mais aussi de manière plus localisée : autour du dépôt de déchets verts (sud-ouest de la parcelle 52) et sur de petits tas de terre au sud de la parcelle 1916 (issus du creusement de la dépression adjacente).

La végétation est qualifiée de rudérale, caractérisée par des espèces pionnières qui peuvent être annuelles ou vivaces, comme ici, pour les principales : Folle avoine, Betterave commune, Moutarde noire, Chicorée sauvage, Cirse commun, Cardère à foulon, Picride fausse vipérine, Laitue scariote, Laiteron rude...

CB : 87.1 - terrains en friche x 87.2 - zones rudérales / Eunis : E5.13 - communautés d'espèces rudérales des constructions rurales récemment abandonnées x I1.53 - jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles / vivaces x J6.4 - déchets agricoles et horticoles



Végétations rudérales sur les talus longeant les terrains de sport



Dépôt de déchets verts sur le site

Tas de terre (au second plan après la dépression)

Les cultures annuelles

Le secteur est très agricole, et nous retrouvons autour du site d'étude des parcelles cultivées. Elles étaient déjà moissonnées lors du passage : culture de céréales à l'est et de colza au nord.

Nous ne nous sommes pas attardés sur ces milieux qui sont très pauvres en flore sauvage, à cause des traitements herbicides, et qui plus est, il était trop tard pour y voir la flore s'exprimer. Une observation très rapide semblait montrer un cortège rudéral composé d'adventices des cultures intensives.

CB : 82.11 - grandes cultures / Eunis : I1.1 - monocultures intensives



Cultures moissonnées de céréales (à l'est) et de colza (au nord)

Les terrains de sport

Le site d'étude est entouré à l'ouest et au sud par des terrains de football. Celui au sud est arrosé et présente un gazon relativement vert, alors que celui à l'ouest semble abandonné et avait l'allure d'une friche qui venait d'être broyée. Aucun relevé n'y a été effectué, ces terrains ne présentant que très peu (voire pas) d'intérêt pour la flore et la faune.

CB : - / Eunis : E2.63 - gazons des stades sportifs



Gazon vert arrosé (au sud)



Terrain a priori abandonné, en friche

Le plan d'eau de Belloc

Ce petit plan d'eau est d'origine artificielle et présente des berges raides et des enrochements. Il est entouré de haies et de bandes en herbe qui sont fortement entretenues (tontes répétées), pour son usage récréatif.

Une fine ceinture de végétation hygrophile est tout de même présente sur les berges (voir précédemment). La pièce d'eau ne présente aucune végétation aquatique spécifique, si ce n'est le développement de patches d'algues filamenteuses en surface, montrant clairement des signes d'eutrophisation.


CB : 22.13 - eaux eutrophes x 85.12 - pelouses de parcs / Eunis : C1.3 - lacs, étangs et mares eutrophes permanents x I2.23 - petits parcs et squares citadins



Plan d'eau de Belloc

- **Cartographie des habitats**

Représentation cartographique des habitats observés sur le site de Pauilhac



- **La flore**

L'inventaire du 11 juillet 2025 a permis le recensement de 139 espèces végétales, ce qui est un chiffre relativement peu élevé. Cela dit, au vu de la période non optimale, de la surface plutôt restreinte du site (avec une diversité de végétations plutôt moyenne), et de l'analyse peu approfondie de certains milieux (car ne présentant que très peu d'intérêt), nous pouvons relativiser. La liste complète des espèces recensées est à retrouver en annexe.

Globalement, la flore observée est très classique dans ce genre de secteur. Aucune espèce patrimoniale ou intéressante ne peut être mise en avant dans le cadre de cette étude.

En ce qui concerne les espèces exotiques ou plantées, on en trouve 8 sur la zone étudiée, ce qui est un chiffre relativement faible pour ce secteur. Aucune d'entre elles n'apparaît comme problématique, au vu des très faibles effectifs observés. Une attention particulière pourrait tout de même être à noter pour le Séneçon du Cap et le Pyracantha.

- **La faune**

Globalement, assez peu d'espèces animales ont été détectées sur le site. Cela est dû notamment à une météo non favorable à certaines espèces (températures très élevées), mais aussi probablement à la date de passage, assez tardive, ainsi que le nombre de visites, seulement une. Cela dit, la nature des terrains concernés par le projet et les alentours nous ont tout de même permis d'avoir une idée des enjeux potentiels.

Les oiseaux

L'avifaune est assez classique, avec l'observation de quelques passereaux communs dans les haies, bosquets et milieux ouverts (Mésanges charbonnière et à longue queue, Fauvette à tête noire, Chardonneret élégant, Pinson des arbres). Quelques plus grosses espèces ont été entendues dans les zones boisées ou dans les grandes haies, comme le Geai des chênes, le Lorient d'Europe, le Merle noir, la Tourterelle des bois, le Pigeon ramier, ou encore le Pic vert. La Corneille noire est fréquente un peu partout, surtout dans les milieux cultivés. Les rapaces comme la Buse variable ou le Milan noir ont été aperçus en survol du site et semblent chasser dans le secteur, tout comme le Circaète Jean-le-Blanc, bien moins commun que les 2 espèces précédentes, qui a été observé plus loin. Les hirondelles de fenêtre et rustique survolent le site également, à la recherche de petits insectes volants. Le Héron cendré semble fréquenter régulièrement le plan d'eau pour chasser les poissons et amphibiens. L'oiseau qui semble le plus utiliser les terrains du projet est la Cisticole des joncs, observée et entendue toute la journée. Elle s'accommode en effet des friches / ourlets à hautes herbes pour chasser et de ligneux épars pour se réfugier. Cela dit, cette espèce est assez répandue dans les plaines de notre région.

Aucune espèce à fort enjeu patrimonial n'a été observée sur le site. Quelques oiseaux sont listés dans la liste rouge régionale des espèces menacées dans la catégorie NT (quasi menacé) mais cela concerne uniquement les oiseaux nicheurs. Le statut de nidification de ces espèces n'a pas pu être vérifié sur site au vu du passage tardif. Cela dit, les terrains concernés ne semblent pas favorables pour accueillir les hirondelles et le Circaète, éventuellement pour le Chardonneret. Le Pic vert et la Tourterelle des bois pourraient nicher dans les bosquets alentour, même s'ils paraissent très peu étendus.

Les insectes

Pour ce qui est des insectes, assez peu d'espèces ont été recensées, ce qui est logique avec une seule visite en juillet.

12 espèces de papillons très communs ont été observés, surtout en milieu ouvert sur les terrains du projet. Parmi les espèces patrimoniales potentiellement présentes dans le secteur, seulement 2 peuvent être évoquées : la Damier de la succise et surtout l'Azuré du serpolet. La présence de la première paraît très peu probable, mais la seconde a été recherchée. Néanmoins, sa plante-hôte, l'Origan commun (*Origanum vulgare*) n'a pas été recensée, alors que la fenêtre d'observation est encore plutôt bonne.

Un petit nombre de libellules a pu être identifié, grâce à la présence du grand plan d'eau voisin, et certaines chassaient sur le site ou le long du ruisseau Pascal. Ce ne sont encore que des taxons communs qui ont été observés. Aucune espèce n'a été cherchée en particulier, le site n'étant pas favorable à l'installation d'une espèce patrimoniale.

Nous pouvons émettre les mêmes remarques pour les criquets et sauterelles, bien que d'identification plus complexe, il y a très peu de chances d'y rencontrer une espèce intéressante. Quelques taxons communs des friches et buissons ont été recensés, principalement à l'ouïe.

Les mammifères, reptiles et amphibiens

Très peu d'espèces ont été mises en évidence lors de cet inventaire, du fait des températures élevées, de la petitesse du site et de la discrétion de ces animaux. Au vu des milieux sur le site, il y a très peu de chances d'y trouver une espèce remarquable.

Pour les reptiles, la Couleuvre verte-et-jaune a été observée à 2 reprises, en fuite sur les talus entourant le site et les terrains de sport. Il est quasiment sûr que le Lézard des murailles soit présent, tout comme d'autres espèces de couleuvres, mais peut-être plus au niveau du plan d'eau (Couleuvres à collier et vipérine). Quelques grenouilles vertes, sans doute rieuses, étaient présentes dans le plan d'eau artificiel de Belloc. Enfin, seul un Chevreuil a été vu et entendu dans le bois au sud-est. Plusieurs espèces de mammifères sont susceptibles de fréquenter la zone, parmi les espèces communes et classiques dans ce genre de secteur (Sanglier, Renard, Blaireau, Hérisson, Ecureuil, micromammifères, peut-être chauves-souris en chasse).

Analyse des résultats et enjeux (avérés et potentiels)

En résumé des parties précédentes, la zone d'emprise même du projet est une ancienne parcelle agricole, en majorité en libre évolution, en état de friche. Les faciès y sont relativement variés, avec des milieux herbacés (friches / ourlets) et zones plus denses, avec des buissons et recrues de ligneux. De rares secteurs sont entretenus par fauche / broyage régulier, autour du dépôt de déchets verts et sous forme de bandes formant de petits layons. Ces terrains sont joutés par des cultures, des bosquets et des terrains de sport ; un plan d'eau à usage récréatif est présent au nord-ouest, d'où part le ruisseau Pascal qui longe le site au nord (et qui se jette dans le Gers à Fleurance). L'ensemble se place en contexte fortement agricole.

Aucune espèce patrimoniale à fort enjeu, observée sur site ou même potentielle, n'est a priori susceptible d'être impactée directement par l'installation d'un parc solaire à cet endroit.

Bien qu'une grande majorité des espèces d'oiseaux et de reptiles soit protégée, et que la présence de certaines soient avérées ou potentielles sur la zone, ce sont toutefois des espèces communes, dont l'impact du projet sera négligeable si quelques préconisations sont respectées en phase de travaux et si certaines végétations sont partiellement préservées.

La surface concernée par le projet est assez restreinte, et les milieux en place assez banals, mais ils offrent tout de même des capacités d'accueil intéressantes pour la biodiversité. En effet, la présence proche de zones humides (bien que petites), d'un plan d'eau, de bosquets et de haies plus ou moins naturelles, le tout dans une matrice agricole intensive, font du site une zone refuge pour la faune.

Discussion et préconisations

Quelques préconisations générales assez simples à prendre en compte sont proposées ici.

Dans l'idéal, l'essentiel des travaux lourds est à réaliser en fin d'été et début d'automne, en dehors de la période de reproduction globale des espèces, et à un moment où la faune encore sur place aura la vivacité pour fuir. Le reste des travaux pourra être effectué sur l'automne-hiver, en ne dépassant pas fin février.

L'accès se fera préférentiellement depuis les chemins existants, à savoir par l'ouest (accès actuel au dépôt de déchets verts), ou par le sud (depuis le terrain de foot, côté est).

Une partie du site devra faire l'objet d'un broyage et coupe de ligneux (zones les plus denses en arbustes). Quelques résidus de ces coupes pourraient être utilisés pour construire des abris très simples pour les reptiles et les petits mammifères, comme des tas de branchages par exemple, répartis ponctuellement autour du site. Les endroits seront judicieusement choisis en fonction de l'emplacement des travaux et des opérations d'entretien qui auront lieu en phase d'exploitation.

En lien avec le caractère refuge des terrains concernés, nous proposons de laisser sur le site quelques bandes de la végétation existante afin de permettre la circulation et l'abri des espèces locales. Nous suggérons de maintenir une bande de 20 mètres de large au nord (le long du ruisseau Pascal donc) et de 10 mètres à l'est, permettant une jonction entre les 2 bosquets.

Enfin, pour ce qui est de la zone même du parc, l'idéal est que les panneaux ne soient pas trop proches les uns des autres, afin d'éviter un ombrage permanent. Nous estimons que l'entretien de la végétation entre les panneaux peut être réalisée une ou deux fois par an, en fonction de la vitesse de pousse.

Bibliographie

BARTHE L., 2014. *Liste rouge des amphibiens et des reptiles de Midi-Pyrénées*. Nature Midi-Pyrénées. 12 p.

BISSARDON M. & GUIBAL L., 1997, *Corine Biotope (version originale) - Types d'habitats français*, ENGREF Nancy, 175 p.

CATIL J.-M. & COCHARD P.-O., (coord.), 2022. *Liste rouge des Orthoptères d'Occitanie*. Rapport d'évaluation. Nature En Occitanie. Toulouse. 235 p.

CHARLOT B., DANFLOUS S., LOUBOUTIN B. & JAULIN S. (coord.), 2018, *Liste rouge des Odonates d'Occitanie. Rapport d'évaluation*, CEN Midi-Pyrénées & OPIE, Toulouse, 102 p. + annexes.

CORRIOL G. (coord.), 2013, *Liste rouge de la flore vasculaire de Midi-Pyrénées*, Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, 16 p.

DREAL Occitanie, Listes d'espèces et d'habitats déterminants pour les ZNIEFF ; lien internet : <https://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/vers-des-znieff-troisieme-generation-en-occitanie-a24635.html>

GOR & LPO Occitanie (Coord.), 2024. *Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs d'Occitanie*. 20 p.

JULVE P., 1998, Baseflor : index botanique, écologique et chorologique de la flore de France
site Internet : <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

LOUBOUTIN B., JAULIN S., CHARLOT B. & DANFLOUS S. (coord.), 2019, *Liste rouge des Lépidoptères Rhopalocères et Zygènes d'Occitanie. Rapport d'évaluation*, OPIE, CEN MP & CEN LR. 304 p.

LOUVEL J., GAUDILLAT V. & PONCET L., 2013, *EUNIS - système d'information européen sur la nature - classification des habitats*, Museum National d'Histoire Naturelle, Ministère de l'Environnement. 289 p.

TURPIN L., DAO J. & COTTAZ C., 2023, *Stratégie régionale relative aux plantes exotiques envahissantes d'Occitanie. Plan d'actions 2023-2032*. Conservatoire botanique national méditerranéen et Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. 67 p. + annexes

UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2016. *La Liste rouge des espèces menacées en France, Chapitre oiseaux de France métropolitaine*, Paris, France, 31 p.

Annexes : listes d'espèces

Voir pages suivantes

Liste exhaustive des espèces végétales observées sur le site d'étude le 11 juillet 2025

Nom scientifique	Nom(s) français	Famille	Végétation sur site	Exogène
<i>Acer campestre</i> L., 1753	Érable champêtre, Acéraille	Sapindaceae	Bosquets et recrues de ligneux	
<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	Achillée millefeuille	Asteraceae	Friches / ourlets	
<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	Aigremoine eupatoire, Francormier	Rosaceae	Friches / ourlets	
<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	Agrostide capillaire, Agrostide commune	Poaceae	Friches / ourlets	
<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	Agrostide stolonifère	Poaceae	Cortège hygrophile des friches / ourlets	
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913	Alliaire pétiolée, Alliaire officinale	Brassicaceae	Bosquets	
<i>Allium polyanthum</i> Schult. & Schult.f., 1830	Ail à fleurs nombreuses, Poireau des vignes	Amaryllidaceae	Zones rudérales	
<i>Althaea officinalis</i> L., 1753	Guimauve officinale, Guimauve sauvage	Malvaceae	Mégaphorbiaies eutrophes	
<i>Andryala integrifolia</i> L., 1753	Andryale à feuilles entières, Andryale sinueuse	Asteraceae	Friches / ourlets	
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	Flouve odorante	Poaceae	Friches / ourlets	
<i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	Fromental élevé, Avoine élevée	Poaceae	Friches / ourlets	
<i>Arum italicum</i> Mill., 1768	Gouet d'Italie, Pied-de-veau, Arum d'Italie	Araceae	Zones rudérales	
<i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753	Scolopendre, Scolopendre officinale	Aspleniaceae	Bosquets	
<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC., 1805	Arroche prostrée, Arroche hastée	Amaranthaceae	Zones rudérales	
<i>Avena fatua</i> subsp. <i>fatua</i> L., 1753	Avoine folle, Folle avoine	Poaceae	Zones rudérales	
<i>Beta vulgaris</i> L., 1753	Betterave commune, Bette	Amaranthaceae	Zones rudérales	
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	Brachypode des forêts, Brachypode des bois	Poaceae	Bosquets	
<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch, 1833	Chou noir, Moutarde noire	Brassicaceae	Zones rudérales	
<i>Bromus arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> L., 1753	Brome des champs	Poaceae	Zones rudérales	
<i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>hordeaceus</i> L., 1753	Brome mou, Brome orge	Poaceae	Zones rudérales	
<i>Bryonia dioica</i> Jacq., 1774	Bryone dioïque	Cucurbitaceae	Friches / ourlets	
<i>Callitriche stagnalis</i> Scop., 1772	Callitriche des eaux stagnantes	Plantaginaceae	Aquatiques	
<i>Carex divulsa</i> Stokes, 1787	Laîche écartée	Cyperaceae	Bosquets	
<i>Carex flacca</i> subsp. <i>flacca</i> Schreb., 1771	Laîche glauque	Cyperaceae	Friches / ourlets	
<i>Carex hirta</i> L., 1753	Laîche hérissée	Cyperaceae	Cortège hygrophile des friches / ourlets	
<i>Carex otrubae</i> Podp., 1922	Laîche cuivrée	Cyperaceae	Cortège hygrophile des friches / ourlets	
<i>Carex pendula</i> Huds., 1762	Laîche à épis pendants, Laîche pendante	Cyperaceae	Friches / ourlets	

<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	Charme commun, Charme, Charmille	Betulaceae	Bosquets	
<i>Centaurea decipiens</i> Thuill., 1799	Centaurée trompeuse Centaurée des prés	Asteraceae	Friches / ourlets	
<i>Centaureum erythraea</i> subsp. <i>erythraea</i> Rafn, 1800	Érythrée petite-centaurée	Gentianaceae	Friches / ourlets	
<i>Centaureum pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1907	Érythrée élégante	Gentianaceae	Cortège hygrophile des friches / ourlets	
<i>Chenopodium album</i> subsp. <i>album</i> L., 1753	Chénopode blanc, Senousse	Amaranthaceae	Zones rudérales	
<i>Cichorium intybus</i> L., 1753	Chicorée sauvage, Chicorée amère	Asteraceae	Zones rudérales	
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des champs, Chardon des champs, Calcide	Asteraceae	Zones rudérales	
<i>Cirsium vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées	Asteraceae	Zones rudérales	
<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753	Liseron des champs, Vrillée, Petit liseron	Convolvulaceae	Friches / ourlets	
<i>Convolvulus sepium</i> L., 1753	Liseron des haies, Liset, Calystégie des haies	Convolvulaceae	Mégaphorbiaies eutrophes	
<i>Cornus sanguinea</i> subsp. <i>sanguinea</i> L., 1753	Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle	Cornaceae	Bosquets et recrues de ligneux	
<i>Crataegus germanica</i> (L.) Kuntze, 1891	Néflier d'Allemagne, Néflier	Rosaceae	Bosquets	
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style, Aubépine monogyne	Rosaceae	Bosquets et recrues de ligneux	
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840	Crépide capillaire, Crépide à tiges capillaires	Asteraceae	Friches / ourlets	
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852	Croisette commune, Gaillet croisette	Rubiaceae	Bosquets	
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805	Cynodon dactyle, Chiendent pied-de-poule	Poaceae	Zones rudérales	
<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i> L., 1753	Dactyle aggloméré, Pied-de-poule	Poaceae	Friches / ourlets	
<i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i> L., 1753	Carotte sauvage, Carotte commune	Apiaceae	Zones rudérales	
<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002	Dioscorée commune, Tamier commun	Dioscoreaceae	Bosquets	
<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	Cardère à foulon, Cardère sauvage	Caprifoliaceae	Zones rudérales	
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv., 1812	Échinochloa pied-de-coq, Panic pied-de-coq	Poaceae	Zones rudérales	
<i>Elytrigia repens</i> subsp. <i>repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934	Chiendent rampant, Chiendent commun	Poaceae	Zones rudérales	
<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	Épilobe hérissé, Épilobe hirsute	Onagraceae	Mégaphorbiaies eutrophes	
<i>Epilobium tetragonum</i> subsp. <i>lamyi</i> (F.W.Schultz) Nyman, 1879	Épilobe de Lamy	Onagraceae	Friches / ourlets	
<i>Equisetum telmateia</i> subsp. <i>telmateia</i> Ehrh., 1783	Prêle d'ivoire, Grande prêle	Equisetaceae	Mégaphorbiaies eutrophes	
<i>Ervilia hirsuta</i> (L.) Opiz, 1852	Vesce hérissée	Fabaceae	Friches / ourlets	
<i>Euphorbia lathyris</i> L., 1753	Euphorbe épurge, Euphorbe des jardins	Euphorbiaceae	Zones rudérales	X
<i>Euphorbia verrucosa</i> L., 1753	Euphorbe verruqueuse	Euphorbiaceae	Friches / ourlets	
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á.Löve, 1970	Fallopie liseron, Renouée liseron	Polygonaceae	Zones rudérales	

<i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779	Fétuque hétérophylle	Poaceae	Bosquets	
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl, 1804 [nom. cons.]	Frêne oxyphylle	Oleaceae	Bosquets et recrues de ligneux	
<i>Galium album</i> Mill., 1768	Gaillet blanc, Gaillet dressé	Rubiaceae	Friches / ourlets	
<i>Galium aparine</i> L., 1753	Gaillet gratteron, Herbe collante, Gratteron	Rubiaceae	Bosquets	
<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr., 1869	Groenlandie dense, Potamot dense	Potamogetonaceae	Aquatiques	
<i>Hedera helix</i> L., 1753	Lierre grimpant, Lierre commun	Araliaceae	Bosquets	
<i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub, 1973	Picride fausse vipérine	Asteraceae	Zones rudérales	
<i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	Ache nodiflore, Ache noueuse, Ache faux cresson	Apiaceae	Aquatiques	
<i>Holcus lanatus</i> subsp. <i>lanatus</i> L., 1753	Houlque laineuse, Blanchard	Poaceae	Friches / ourlets	
<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean	Hypericaceae	Friches / ourlets	
<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	Porcelle enracinée, Salade-de-porc	Asteraceae	Friches / ourlets	
<i>Juglans regia</i> L., 1753	Noyer royal, Noyer, Noyer anglais, Noyer commun	Juglandaceae	Bosquets	X
<i>Juncus articulatus</i> subsp. <i>articulatus</i> L., 1753	Jonc articulé, Jonc à fruits luisants	Juncaceae	Cortège hygrophile des friches / ourlets	
<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	Jonc des crapauds	Juncaceae	Cortège hygrophile des friches / ourlets	
<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753	Jonc aggloméré	Juncaceae	Cortège hygrophile des friches / ourlets	
<i>Juncus effusus</i> L., 1753	Jonc épars	Juncaceae	Cortège hygrophile des friches / ourlets	
<i>Juncus inflexus</i> L., 1753	Jonc glauque, Jonc courbé	Juncaceae	Cortège hygrophile des friches / ourlets	
<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort., 1827	Kickxie élatine, Velvete, Linaire élatine	Plantaginaceae	Zones rudérales	
<i>Lactuca saligna</i> L., 1753	Laitue à feuilles de saule	Asteraceae	Zones rudérales	
<i>Lactuca serriola</i> L., 1756	Laitue scariote, Escarole, Laitue sauvage	Asteraceae	Zones rudérales	
<i>Lapsana communis</i> subsp. <i>communis</i> L., 1753	Lampsane commune, Graceline	Asteraceae	Bosquets	
<i>Lathyrus nissolia</i> L., 1753	Gesse de Nissolle, Gesse sans vrilles	Fabaceae	Friches / ourlets	
<i>Lemna minuta</i> Kunth, 1816	Lentille d'eau minuscule	Araceae	Aquatiques	X
<i>Leontodon saxatilis</i> subsp. <i>saxatilis</i> Lam., 1779	Liondent des rochers, Liondent faux pissenlit	Asteraceae	Friches / ourlets	
<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk., 1844	Troène à feuilles ovales, Troène des haies	Oleaceae	Bosquets et recrues de ligneux	X
<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	Troène commun, Troène, Raisin de chien	Oleaceae	Bosquets	
<i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>angustifolium</i> (Huds.) Thell., 1912	Lin à feuilles étroites, Lin bisannuel	Linaceae	Friches / ourlets	
<i>Lonicera periclymenum</i> subsp. <i>periclymenum</i> L., 1753	Chèvrefeuille des bois, Chèvrefeuille grimpant	Caprifoliaceae	Friches / ourlets	
<i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753	Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies	Caprifoliaceae	Bosquets	

<i>Lotus angustissimus</i> L., 1753	Lotier grêle, Lotier à gousses très étroites	Fabaceae	Friches / ourlets	
<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i> L., 1753	Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée	Fabaceae	Friches / ourlets	
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793	Lotier pédonculé, Lotier des marais	Fabaceae	Mégaphorbiaies eutrophes	
<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	Lycophe d'Europe, Chanvre d'eau	Lamiaceae	Mégaphorbiaies eutrophes	
<i>Malva sylvestris</i> L., 1753	Mauve sylvestre, Grande mauve, Mauve sauvage	Malvaceae	Zones rudérales	
<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	Menthe aquatique	Lamiaceae	Mégaphorbiaies eutrophes	
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh., 1792	Menthe à feuilles rondes, Menthe sauvage	Lamiaceae	Mégaphorbiaies eutrophes	
<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L., 1753	Œnanthe faux boucage	Apiaceae	Friches / ourlets	
<i>Persicaria maculosa</i> Gray, 1821 [nom. cons.]	Persicaire maculée, Renouée persicaire, Persicaire	Polygonaceae	Zones rudérales	
<i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862	Piloselle officinale, Épervière piloselle	Asteraceae	Friches / ourlets	
<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	Plantain lancéolé, Petit plantain	Plantaginaceae	Friches / ourlets	
<i>Polygonum aviculare</i> subsp. <i>aviculare</i> L., 1753	Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse	Polygonaceae	Zones rudérales	
<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913	Polystic à soies, Polystic à frondes soyeuses	Dryopteridaceae	Bosquets	
<i>Populus nigra</i> L., 1753	Peuplier noir, Peuplier commun noir	Salicaceae	Bosquets	
<i>Populus tremula</i> L., 1753	Peuplier tremble, Tremble	Salicaceae	Bosquets et recrues de ligneux	
<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	Potentille rampante, Quintefeuille	Rosaceae	Friches / ourlets	
<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	Herbe Catois	Lamiaceae	Friches / ourlets	
<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	Prunier merisier, Cerisier	Rosaceae	Bosquets	
<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., 1784	Prunier myrobolan, Prunier porte-cerise	Rosaceae	Bosquets et recrues de ligneux	X
<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier	Rosaceae	Bosquets et recrues de ligneux	
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800	Pulicaire dysentérique	Asteraceae	Cortège hygrophile des friches / ourlets	
<i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem., 1847 [nom. cons.]	Pyracantha écarlate, Buisson ardent	Rosaceae	Bosquets et recrues de ligneux	X
<i>Pyrus communis</i> subsp. <i>pyraster</i> (L.) Ehrh., 1780	Poirier sauvage, Aigrin	Rosaceae	Bosquets et recrues de ligneux	
<i>Quercus petraea</i> subsp. <i>petraea</i> (Matt.) Liebl., 1784	Chêne sessile, Chêne rouvre	Fagaceae	Bosquets	
<i>Quercus pubescens</i> Willd., 1796	Chêne pubescent, chêne humble	Fagaceae	Bosquets et recrues de ligneux	
<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	Renoncule rampante, Bouton-d'or rampant	Ranunculaceae	Cortège hygrophile des friches / ourlets	
<i>Rosa sempervirens</i> L., 1753	Rosier toujours vert, Rosier de tous les mois	Rosaceae	Bosquets et recrues de ligneux	
<i>Rubia peregrina</i> subsp. <i>peregrina</i> L., 1753	Garance voyageuse, Petite garance	Rubiaceae	Bosquets	
<i>Rumex acetosa</i> subsp. <i>acetosa</i> L., 1753	Patience oseille, Oseille des prés, Rumex oseille	Polygonaceae	Friches / ourlets	

<i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770	Patience agglomérée, Oseille agglomérée	Polygonaceae	Cortège hygrophile des friches / ourlets	
<i>Rumex crispus</i> L., 1753	Rumex crépu	Polygonaceae	Zones rudérales	
<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	Fragon petit houx	Asparagaceae	Bosquets	
<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	Saule acuminé, Saule roux	Salicaceae	Bosquets et recrues de ligneux	
<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	Sureau noir, Sampéchier	Viburnaceae	Bosquets	
<i>Schedonorus arundinaceus</i> subsp. <i>arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort., 1824	Schédonore roseau, Fétuque faux roseau	Poaceae	Friches / ourlets	
<i>Scrophularia auriculata</i> subsp. <i>auriculata</i> L., 1753	Scrofulaire auriculée	Scrophulariaceae	Mégaphorbiaies eutrophes	
<i>Senecio inaequidens</i> DC., 1838	Séneçon du Cap, Séneçon à feuilles étroites	Asteraceae	Friches / ourlets	X
<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult., 1817	Sétaire naine, Sétaire glauque	Poaceae	Zones rudérales	
<i>Sison amomum</i> L., 1753	Sison amome, Sison, Sison aromatique	Apiaceae	Mégaphorbiaies eutrophes	
<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	Morelle douce-amère, Douce amère, Bronde	Solanaceae	Mégaphorbiaies eutrophes	
<i>Sonchus asper</i> subsp. <i>asper</i> (L.) Hill, 1769	Laiteron rude, Laiteron piquant	Asteraceae	Zones rudérales	
<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753	Épiaire des forêts, Épiaire des bois	Lamiaceae	Bosquets	
<i>Symphyotrichum squamatum</i> (Spreng.) G.L.Nesom, 1995	Symphyotriche écailleux, Aster écailleux	Asteraceae	Cortège hygrophile des friches / ourlets	X
<i>Tordylium maximum</i> L., 1753	Tordyle élevé, Tordyle majeur, Grand tordyle	Apiaceae	Zones rudérales	
<i>Torilis arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> (Huds.) Link, 1821	Torilide des champs, Torilis des champs	Apiaceae	Zones rudérales	
<i>Torminalis glaberrima</i> (Gand.) Sennikov & Kurtto, 2017	Sorbier alisier	Rosaceae	Bosquets	
<i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753	Trèfle porte-fraise, Trèfle-fraise, Porte-fraise	Fabaceae	Cortège hygrophile des friches / ourlets	
<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés, Trèfle violet	Fabaceae	Friches / ourlets	
<i>Trifolium repens</i> L., 1753	Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande	Fabaceae	Friches / ourlets	
<i>Typha latifolia</i> L., 1753	Massette à feuilles larges	Typhaceae	Mégaphorbiaies eutrophes	
<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	Petit orme, Orme champêtre, Ormeau	Ulmaceae	Bosquets et recrues de ligneux	
<i>Urtica dioica</i> subsp. <i>dioica</i> L., 1753	Ortie dioïque, Grande ortie	Urticaceae	Mégaphorbiaies eutrophes	
<i>Verbena officinalis</i> L., 1753	Verveine officinale, verveine sauvage	Verbenaceae	Friches / ourlets	
<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821	Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux brome	Poaceae	Friches / ourlets	

Liste exhaustive des espèces animales observées sur le site d'étude le 11 juillet 2025

Groupe / ordre	Nom scientifique	Nom(s) français	Famille
Oiseaux	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange à longue queue	Aegithalidae
Oiseaux	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Héron cendré	Ardeidae
Oiseaux	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Buse variable	Accipitridae
Oiseaux	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Chardonneret élégant	Fringillidae
Oiseaux	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Circaète Jean-le-Blanc	Accipitridae
Oiseaux	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	Cisticole des joncs	Cisticolidae
Oiseaux	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	Pigeon ramier	Columbidae
Oiseaux	<i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758	Corneille noire	Corvidae
Oiseaux	<i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de fenêtre	Hirundinidae
Oiseaux	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Pinson des arbres	Fringillidae
Oiseaux	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	Geai des chênes	Corvidae
Oiseaux	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée	Hirundinidae
Oiseaux	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Milan noir	Accipitridae
Oiseaux	<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	Loriot d'Europe, Loriot jaune	Oriolidae
Oiseaux	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Mésange charbonnière	Paridae
Oiseaux	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Pic vert, Pivert	Picidae
Oiseaux	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Tourterelle des bois	Columbidae
Oiseaux	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Fauvette à tête noire	Sylviidae
Oiseaux	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Merle noir	Turdidae

Groupe / ordre	Nom scientifique	Nom(s) français	Famille
Rhopalocères	<i>Aricia agestis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Collier-de-corail (Le), Argus brun (L')	Lycaenidae
Rhopalocères	<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	Fadet commun (Le), Procris (Le)	Nymphalidae
Rhopalocères	<i>Colias crocea</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Souci (Le)	Pieridae
Rhopalocères	<i>Gonepteryx cleopatra</i> (Linnaeus, 1767)	Citron de Provence (Le), Cléopâtre (La), Piérade Cléopâtre (La)	Pieridae
Rhopalocères	<i>Lycaena tityrus</i> (Poda, 1761)	Cuivré fuligineux (Le), Argus myope (L'), Polyommate Xanthé (Le)	Lycaenidae
Rhopalocères	<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	Myrtil (Le), Myrtille (Le), Jurtine (La), Janire (La)	Nymphalidae

Rhopalocères	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L')	Nymphalidae
Rhopalocères	<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade du Chou (La), Papillon du Chou (Le)	Pieridae
Rhopalocères	<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le)	Pieridae
Rhopalocères	<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L')	Lycaenidae
Rhopalocères	<i>Pyrgus malvoides</i> (Elwes & Edwards, 1897)	Tacheté austral (Le), Hespérie de la Mauve du Sud (L')	Hesperiidae
Rhopalocères	<i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1771)	Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le)	Nymphalidae
Odonates	<i>Anax imperator</i> Leach, 1815	Anax empereur (L')	Aeshnidae
Odonates	<i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832)	Crocothémis écarlate (Le)	Libellulidae
Odonates	<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)	Orthétrum réticulé (L')	Libellulidae
Odonates	<i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771)	Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre	Platycnemididae
Odonates	<i>Sympetrum fonscolombii</i> (Selys, 1840)	Sympétrum de Fonscolombe (Le)	Libellulidae
Odonates	<i>Trithemis annulata</i> (Palisot de Beauvois, 1807)	Trithémis annelé (Le)	Libellulidae
Orthoptères	<i>Decticus albifrons</i> (Fabricius, 1775)	Dectique à front blanc, Sauterelle à front blanc	Tettigoniidae
Orthoptères	<i>Roeseliana roeselii</i> (Hagenbach, 1822)	Decticelle bariolée	Tettigoniidae
Orthoptères	<i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Sauterelle verte, Tettigonie verte	Tettigoniidae
Orthoptères	<i>Tylopsis lilifolia</i> (Fabricius, 1793)	Phanéoptère liliacé, Sauterelle feuille-de-lys	Tettigoniidae
Orthoptères	<i>Uromenus rugosicollis</i> (Audinet Serville, 1838)	Ephippigère carénée	Tettigoniidae
Hémiptères	<i>Tettigetta argentea</i> (Olivier, 1791)	Cigale argentée (La)	Cicadidae
Arachnides	<i>Argiope bruennichi</i> (Scopoli, 1772)	Épeire frelon	Araneidae

Groupe / ordre	Nom scientifique	Nom(s) français	Famille
Mammifères	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Chevreuil européen, Chevreuil	Cervidae
Reptiles	<i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacepède, 1789)	Couleuvre verte et jaune (La)	Colubridae
Amphibiens	<i>Pelophylax ridibundus</i> (Pallas, 1771)	Grenouille rieuse (La)	Ranidae