

PROJET DE PARC SOLAIRE COOPERATIF ET CITOYEN

Commune de Castelsarrasin (82)

PRE-DIAGNOSTIC FLORE-HABITATS ET FAUNE

Pour la SCIC **ENERCOOP Midi-Pyrénées**
26-28 rue Marie Magné, 31300 TOULOUSE



Mathieu MENAND

8 impasse du chêne, 31620 BOULOC
mathieumenand@yahoo.fr - tél. 06.77.79.29.49
n° SIREN 531 425 254

Octobre 2025


SOMMAIRE

Rappel du contexte	2
Méthodologie et déroulement des inventaires.....	3
Résultats.....	3
Description des habitats et végétations.....	3
Cartographie des habitats.....	10
La flore.....	11
La faune	11
Analyse des résultats et enjeux (avérés et potentiels)	12
Discussion et préconisations.....	12
Bibliographie	13
Annexes : listes d'espèces	13

Rappel du contexte

Un projet de parc solaire coopératif et citoyen est en cours d'étude par la SCIC Enercoop Midi-Pyrénées, sur la commune de Castelsarrasin, dans le département du Tarn-et-Garonne (82).

La carte ci-dessous montre le périmètre du projet, situé à l'ouest du bourg, au niveau du lieu-dit Pessayre. Il est localisé sur la parcelle 0162 (section CM), qui est propriété de la commune. Elle représente une surface d'environ 6,5 ha mais le projet est prévu sur une surface d'environ 1 ha. C'est une ancienne parcelle agricole, aujourd'hui entretenue par la commune (source : Enercoop).



Emprise du projet de parc solaire de Castelsarrasin (panneaux en bleu) ; source : Enercoop

Dans ce cadre, la SCIC Enercoop Midi-Pyrénées souhaite disposer d'une étude simplifiée (cas par cas) visant à déterminer si le projet peut avoir des impacts sur la biodiversité.

L'objectif de la présente étude est d'effectuer un diagnostic de la flore et des végétations en place, ainsi que de la faune qui peut utiliser les terrains concernés pour accomplir son cycle biologique (reproduction, repos, alimentation...).

Méthodologie et déroulement des inventaires

Il s'agissait donc de parcourir l'ensemble de ces terrains, ainsi qu'une bande tampon d'environ 50 mètres de large autour du projet, où un inventaire exhaustif de la diversité floristique et faunistique a été réalisé, ainsi qu'une description des végétations.

L'accent a été porté sur la recherche de potentielles espèces patrimoniales.

Ces inventaires ont été menés en grande majorité à vue, en parcourant le site dans sa totalité, l'accès ne posant aucune difficulté. Certains groupes faunistiques ont pu être étudiés à l'aide de l'ouïe (oiseaux, orthoptères), d'autres à l'aide de matériel particulier (filet à papillons par exemple).

Les inventaires ont été effectués en un seul passage, le 29 septembre 2025. Les conditions météorologiques étaient plutôt bonnes, avec un ciel bien ensoleillé et des températures modérées, oscillant entre 15 le matin et 23°C l'après-midi, et un vent léger.

La date de prospection très tardive ne permettait pas de réaliser des observations optimales (voir le chapitre en question, notamment sur la faune). Cela dit, la potentialité d'accueil du site peut être étudiée, liée à la nature des terrains et des habitats observés.

Résultats

- **Description des habitats et végétations**

En résumé, la zone d'emprise exacte prévue pour l'installation de panneaux est une grande friche herbacée plutôt méso-eutrophile, avec des ourlets, des plages de ronciers, et quelques ligneux épars. Une partie significative est plus régulièrement entretenue que le reste de la parcelle.

Le projet se situe dans une « dent creuse », zone pour l'instant non urbanisée au milieu d'habitations et de milieux très anthropisés. Autour, en dehors des parcelles habitées (et leurs jardins), nous trouvons principalement des cultures (annuelles et vergers d'arbustes), des plantations, des friches et zones rudérales diverses. Quelques petits fossés sont également présents, ainsi que le ruisseau de l'Azin au sud.

Pour chaque type de végétation décrite ci-après, nous proposons une codification issue des nomenclatures classiques que sont Corine Biotopes (CB) et Eunis.

Les « friches / ourlets » avec ronciers et ligneux épars

Il s'agit d'une grande partie de la parcelle communale 0162, notamment sa moitié sud, objet du projet en question. C'est une zone qui était auparavant cultivée, il y a environ une quinzaine d'années. Depuis, la végétation y est entretenue par broyage assez régulièrement, mais de manière hétérogène.

En effet, une partie du site, lors du passage fin septembre n'avait pas encore été broyée, et présentait une végétation de type friche-ourlet, ponctuée d'arbustes épars (Robinier, Frêne commun, Chênes pubescent et pédonculé, Peuplier noir, Orme champêtre, Saule roux-cendré, Cornouiller sanguin, Prunellier, Aubépine) ou de petits ronciers. La strate herbacée est quant à elle largement dominée par les graminées sociales que sont la Fétuque faux roseau, le Dactyle aggloméré, la Houlque laineuse, le Chiendent rampant, accompagnées par exemple par la Renoncule acre, l'Oseille crépue, la Potentille rampante, et des espèces d'ourlets, comme la Centaurée trompeuse et l'Aigremoine eupatoire.

L'autre partie, tout au sud, est plus entretenue, et présentait donc une végétation bien plus basse lors du passage (broyage récent). La raison tient certainement au fait que des arbres ont été plantés à cet endroit assez récemment, au vu de leur taille, et qu'il convient donc d'éviter le développement d'une végétation trop haute. Force est de constater que ces plantations n'ont pas très bien fonctionné, les arbres demeurant très épars. La strate herbacée est elle semblable à la partie précédente.

Le cortège floristique observé nous permet de « qualifier » la végétation herbacée de « friche / ourlet » plutôt mésophile à eutrophile, relativement thermophile, avec des éléments de prairies et de friches. Les ourlets apparaissent aux endroits les moins entretenus, souvent au voisinage des ronciers et arbustes. Ces derniers sont distribués sur la parcelle de manière assez aléatoire.

Localement, nous retrouvons quelques espèces rudérales pionnières en mélange avec ces cortèges.

Nous incluons ici des parcelles (0148 et 0013) localisées à l'ouest qui sont des friches herbacées entretenues assez régulièrement a priori, sans ligneux.

CB : 38.1 - pâtures mésophiles 87.1 - terrains en friche x 34.42 - lisières mésophiles x 31.81 - fourrés médio-européens sur sol fertile / Eunis : E2.1 - pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage x I1.53 - jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles et/ou vivaces x E5.22 - ourlets mésophiles x F3.11 - fourrés médio-européens sur sols riches



Friches/ourlets avec quelques ligneux épars



Zone avec ronciers et ourlets



Partie sud de la friche plus entretenue



Traces de plantations dans la partie sud

Les friches rudérales

Ce sont les végétations typiques des sols remaniés et perturbés, que l'on peut observer à de nombreux endroits autour et sur le site : nord-ouest de la parcelle 0162 (zone décapée et tas de terre avec recolonisation très éparse) ; nord de la parcelle 0162 (large route asphaltée bloquée à la circulation, avec reprise dans les fissures et interstices, et sur les accotements et bordures) ; est de la parcelle 0162 (aire d'accueil de campings-cars avec zones gravillonnées, et zone empierrée juste à l'ouest, avec végétation très clairsemée ; parcelle 0009 au sud-est (zone décapée - fermée par un portail - avec stockage de déchets inertes et déchets verts, milieux piétinés à l'entrée près d'une conduite de gaz et d'un gros regard) ; accotements et talus le long des routes qui longent le site au sud et à l'ouest.

La végétation est qualifiée de rudérale, caractérisée par des espèces pionnières qui peuvent être annuelles ou vivaces, comme ici, pour les principales annuelles (Vergerettes du Canada et Sumatra, Moutarde noire, Datura, Amarantes couchée et hybride, Laiteron rude, Chénopode blanc et nombreuses graminées exogènes...) et vivaces (Sureau yèble, Betterave commune, Chicorée sauvage, Cirses commun et des champs, Picrides fausse vipérine et fausse épervière Mélilot blanc, Oseilles élégante et à feuilles obtuses, Carotte sauvage...).

CB : 87.1 - terrains en friche x 87.2 - zones rudérales / Eunis : E5.13 - communautés d'espèces rudérales des constructions rurales récemment abandonnées x I1.53 - jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles / vivaces x J6 - dépôts de déchets



Végétations rudérales sur des zones empierrées ou piétinées (est parcelle 0162)



Végétations rudérales à l'entrée de la parcelle 0009

Tas de terre et zone décapée (nord-ouest parcelle 0162)

Les cultures annuelles

Dès que l'on sort de la ville, les paysages sont très agricoles, et nous retrouvons autour du site d'étude des parcelles cultivées. La parcelle 0042 au sud étaient en labour, et a sans doute été cultivée en céréales cette année au vu du regain ; la parcelle 0172, non accessible (de l'autre côté du ruisseau de l'Azin) n'était pas encore moissonnée (tournesol).

Nous ne nous sommes pas attardés sur ces milieux qui sont très pauvres en flore sauvage, à cause des traitements herbicides, et qui plus est, il était trop tard pour y voir la flore s'exprimer. Une observation très rapide semblait montrer un cortège rudéral composé d'adventices des cultures intensives.

CB : 82.11 - grandes cultures / Eunis : I1.1 - monocultures intensives
--



Culture labourée (parcelle 0042)



Culture de tournesol en arrière-plan (parcelle 0172)

Les plantations d'arbres

Tout autour du site, plusieurs types de plantations artificielles ou alignements d'arbres ont été observés : de pins au sud-ouest (parcelle 0045), de chênes rouges et de charmes au niveau de l'aire d'accueil de campings-cars (parcelle 0162), de peupliers hybrides sur une toute petite parcelle (0001) au sud, mais aussi d'autres conifères dans les jardins alentour (thuyas, cyprès).

Nous n'avons pas prospecté ces plantations et alignements qui sont assez pauvres en flore sauvage, et qui ne seront pas touchés par le projet. Ils peuvent bien sûr servir de zone refuge pour les oiseaux notamment.

CB : 83.312 - plantations de conifères exotiques x 83.321 - plantations de peupliers x 83.323 - plantations de chênes exotiques / Eunis : G3.F2 - plantations de conifères exotiques x G1.C1 - plantations de <i>Populus</i> x G1.C2 - plantations de <i>Quercus</i> caducifoliés exotiques



Alignement de chênes rouges (parcelle 0162)



Plantation de pins (parcelle 0045)

Les vergers

Nous nous trouvons dans un secteur où les vergers sont très abondants le long de la Garonne. On retrouve généralement beaucoup de vergers de pommiers, mais juste à côté du site, c'est une culture de kiwis qui est présente (parcelle 0035). Un passage très rapide en bordure a permis de voir la colonisation de cette parcelle par des pelouses piétinées et tondues dans les inter-rangs, et par un cortège rudéral dans les rangs (sous les arbustes donc). Quelques espèces hygrophiles (que l'on retrouve dans les fossés adjacents) y ont été repérées, ce type de culture irriguée présentant une certaine humidité.

CB : 83.18 - autres vergers à hautes tiges / Eunis : G1.D5 - autres vergers de hautes tiges



Verger de kiwis (parcelle 0035) et sa végétation rudérale

Les végétations hygrophiles et aquatiques des fossés

Quelques fossés parcourent les alentours du site :

- à l'est de la parcelle 0162, en limite avec la 0009, puis passant sous les chênes rouges, sans végétation hygrophile, plus ou moins obstrué par les ronces et des arbustes ;
- à l'ouest de la parcelle 0162 le long de la route, très entretenu et avec végétation hygrophile quasi absente ;
- le long du verger de kiwis, côtés nord-est (le long de la route) et est (limite avec parcelle 0054), avec là une végétation hygrophile bien développée et variée et une espèce aquatique ;

- le long de la large route asphaltée à l'abandon au nord de la parcelle 0162, relativement identique au précédent.

Ce sont donc particulièrement les 2 derniers qui ont fait l'objet de relevés. Il s'agit de plusieurs communautés imbriquées : cressonnières à *Ache nodiflore* et *Cresson de fontaine*, plus ou moins envahies par le *Paspale distique* (dans le compartiment le plus humide, les pieds dans l'eau, le long du verger de kiwis) ; mégaphorbiaies eutrophes (plutôt sur les berges) à hautes herbes qui se développent en conditions humides, avec par exemple le *Liseron des haies*, la *Prêle très ramifiée*, la *Grande ortie*, la *Menthe suave*, la *Pulicaire dysentérique*, le *Souchet robuste*, la *Baldingère faux roseau*... (dans les 2 fossés) ; friches hygrophiles eutrophiles amphibies à annuelles, avec les *Persicares poivre-d'eau*, tachetée et à feuilles de patience, le *Bident feuillé*, le *Panic pied-de-coq*, l'*Arroche prostrée* (dans les 2 fossés).

Aussi, dans le fossé au sud (verger de kiwis), on retrouve très ponctuellement des herbiers aquatiques à feuilles flottantes à *Renouée amphibie*.

CB : 53.4 - bordures à *Calamagrostis* des eaux courantes x 37.71 - ourlets des cours d'eau x 22.33 - groupements à *Bidens tripartitus* x 22.4315 - tapis de *Renouées* / Eunis : C3.11 - formations à petits héliophytes des bords des eaux à débit rapide x E5.411 - voiles des cours d'eau x C3.52 - Communautés à *Bidens* x C1.2415 - tapis de *Renouée amphibie*



Fossés avec végétations hygrophiles et/ou aquatiques (à gauche au sud, à droite au nord)



Fossés sans végétations hygrophiles, obstrués ou entretenus (à gauche à l'est, à droite à l'ouest)

Les végétations hygrophiles du ruisseau de l'Azin

A moins de 50 mètres du site, nous signalons la présence d'un ruisseau, nommé l'Azin, bien qu'il ne jouxte pas la parcelle du projet (de l'autre côté de la route au sud). Il passe entre des habitations et des cultures, et est donc calibré, présentant des berges abruptes. Ces dernières sont nettement anthropisées.

Il est longé par des strates arborées et arbustives hétérogènes et interrompues, le plus souvent avec des espèces exogènes (Robinier, Ailanthé, arbres fruitiers des jardins attenants, mais aussi quelques frênes et chênes), des ronciers et fourrés denses. Localement, les berges sont colonisées par une mégaphorbiaie eutrophe avec la Grande ortie, la Salicaire, la Scrophulaire à oreillettes, le Lycope, la Scutellaire à casque, le Liseron des haies, et l'exotique Vigne-vierge commune. Quelques roselières à Phragmite se sont également développées, notamment le long de la parcelle labourée 0042.

Le cours d'eau ne présente pas d'herbiers aquatiques a priori.

CB : 24.1 - lits des rivières x 37.71 - ourlets des cours d'eau x 53.112 - phragmitaies sèches / Eunis : C2.3 - cours d'eau permanents non soumis aux marées, à débit régulier x E5.411 - voiles des cours d'eau x D5.11 - phragmitaies normalement sans eau libre
--



Ruisseau de l'Azin entre habitations et cultures avec végétations hygrophiles eutrophes




Phragmitaie le long du ruisseau de l'Azin

Enfin, le reste des parcelles entourant le site du projet est constitué d'habitations et de jardins (CB : 85.3 x 86.2 ; Eunis : I2.2 x J1.2).

- Cartographie des habitats

Représentation cartographique des habitats observés sur le site de Castelsarrasin



- **La flore**

L'inventaire du 29 septembre 2025 a permis le recensement de 139 taxons végétaux, ce qui est un chiffre relativement peu élevé. Cela dit, au vue de la période non optimale, de la surface plutôt restreinte du site (avec une diversité de végétations plutôt moyenne), et de l'analyse peu approfondie de certains milieux (car ne présentant que très peu d'intérêt), nous pouvons relativiser. La liste complète des espèces recensées est à retrouver en annexe.

Globalement, la flore observée est très classique et banale dans ce genre de secteur. Aucune espèce patrimoniale ou intéressante ne peut être mise en avant dans le cadre de cette étude, et il y a très peu de potentiel à en trouver, même à la bonne saison. Plusieurs tulipes sauvages sont connues dans l'ouest du Tarn-et-Garonne (*Tulipa sylvestris*, *T. agenensis* et *T. raddii*) et pourraient croître sur des talus notamment, mais elles n'ont jamais été repérées à Castelsarrasin.

En ce qui concerne les espèces exotiques ou plantées, on en trouve 34 sur la zone étudiée (voir le tableau en annexe), ce qui est un chiffre très important. Nous avons identifié la plupart des espèces exogènes le plus souvent présentes en milieu périurbain, qui plus est jouxtant de grandes zones agricoles dans le couloir garonnais.

- **La faune**

Globalement, assez peu d'espèces animales ont été détectées sur le site. Cela est dû notamment à la date de passage, très tardive, au nombre de visites (seulement une) et au contexte périurbain fortement anthropisé. Cela dit, la nature des terrains concernés par le projet et les alentours nous ont tout de même permis d'avoir une idée des enjeux potentiels.

Les oiseaux

Il est clair que les oiseaux constituent un groupe largement sous-prospecté dans le cadre de cet inventaire. Cela dit, il y a très peu de chance que les cortèges soient très intéressants dans ce type de secteur très anthropisé.

Nous avons pu identifier sur le site plusieurs passereaux, en général autour de la parcelle 0162, au niveau des jardins et plantations d'arbres : la Mésange charbonnière, le Rouge-gorge familier, le Pouillot véloce, le Merle noir et le Gobemouche noir. La Bouscarle de Cetti a été entendue plusieurs fois près du ruisseau et dans les arbustes près des fossés.

Le Pic vert a également été entendu dans le secteur, ainsi que la Corneille noire et la Pie bavarde. Le Pigeon ramier a été observé en train de survoler le site.

Enfin, notons l'observation de 2 rapaces : la Buse variable a été entendue et aperçue survolant la zone, mais assez loin, alors que le Faucon crécerelle a été identifié en chasse au-dessus de la parcelle 0162.

Aucune espèce à fort enjeu patrimonial n'a été observée sur le site et les terrains concernés ne semblent pas favorables pour accueillir une avifaune riche. L'utilisation du site par le Faucon crécerelle comme terrain de chasse est à signaler, même si cette espèce bénéficie de nombreux milieux similaires dans les abords immédiats.

Les insectes

Pour ce qui est des insectes, très peu d'espèces ont été recensées, ce qui est logique avec une seule visite fin septembre.

6 espèces de papillons ont été observées, tous très communs, en milieu ouvert au niveau des friches, ainsi que 3 espèces d'orthoptères dans les mêmes milieux, très répandues également. Aucune libellule n'a été observée (très peu de points d'eau à proximité).

Aucune espèce patrimoniale n'est potentiellement attendue dans ce genre de secteur.

Les mammifères, reptiles et amphibiens

Très peu d'espèces ont été mises en évidence lors de cet inventaire, du fait de la période, de la petitesse du site et de la discrétion de ces animaux. Au vu des milieux sur le site, il y a très peu de chances d'y trouver une espèce remarquable.

Pour les reptiles, seul le Lézard des murailles a pu être identifié, se chauffant sur le transformateur électrique présent au sud-est de la parcelle 0162. Il est fort probable que la Couleuvre verte-et-jaune fréquente les abords du site, tout comme d'autres espèces de couleuvres, plutôt au niveau du ruisseau et des fossés en eau (Couleuvres à collier et vipérine).

Quelques grenouilles vertes, sans doute rieuses, étaient présentes dans le fossé en eau au sud (le long du verger de kiwis).

Enfin, plusieurs espèces de mammifères sont susceptibles de fréquenter la zone, parmi les espèces communes et classiques dans ce genre de secteur (Sanglier, Chevreuil, Renard, Blaireau, Hérisson, Ecureuil, micromammifères, chauves-souris au moins en chasse).

Analyse des résultats et enjeux (avérés et potentiels)

En résumé des parties précédentes, la zone d'emprise même du projet est une ancienne parcelle agricole, aujourd'hui entretenue par la commune, en état de friche. Les faciès y sont relativement variés, avec des milieux herbacés de type friches-ourlets, un secteur plus souvent broyé à végétation plus rase, et des zones avec des arbustes épars, voire des buissons et ronciers. Ces terrains sont joutés par des zones rudérales très anthropisées, des cultures, des plantations et vergers ; quelques fossés (tout autour du site) et un ruisseau (au sud) sont présents. L'ensemble se place en contexte agricole, en situation périurbaine.

Aucune espèce patrimoniale à fort enjeu, observée sur site ou même potentielle, n'est a priori susceptible d'être impactée directement par l'installation d'un parc solaire à cet endroit.

Bien qu'une grande majorité des espèces d'oiseaux et de reptiles soit protégée, et que la présence de certaines sont avérées ou potentielles sur la zone, ce sont toutefois des espèces communes, dont l'impact du projet sera négligeable si quelques préconisations sont respectées en phase de travaux.

La surface concernée par le projet est assez restreinte, et les milieux en place assez banals, mais ils offrent tout de même des capacités d'accueil intéressantes pour la biodiversité dans cette « dent creuse ». De plus, des milieux ouverts similaires sont présents sur la partie de la parcelle 0162 qui ne sera pas concernée par l'installation de panneaux.

Discussion et préconisations

Quelques préconisations générales assez simples à prendre en compte sont proposées ici.

Dans l'idéal, l'essentiel des travaux lourds est à réaliser en fin d'été et début d'automne, en dehors de la période de reproduction globale des espèces, et à un moment où la faune encore sur place aura la vivacité pour fuir. Le reste des travaux pourra être effectué sur l'automne-hiver, en ne dépassant pas fin février.

L'accès se fera préférentiellement depuis les routes existantes, et au plus court jusqu'au chantier, donc a priori par le sud (route qui longe la parcelle 0162 entre Pessayre et Très Cassés).

Une partie du site devra faire l'objet d'un broyage et coupe de ligneux, même si les arbustes sont peu nombreux. Quelques résidus de ces coupes pourraient être utilisés pour construire des abris très simples pour les reptiles et les petits mammifères, comme des tas de branchages par exemple, répartis ponctuellement autour du site. Les endroits seront judicieusement choisis en fonction de l'emplacement des travaux et des opérations d'entretien qui auront lieu en phase d'exploitation.

Comme la partie de la parcelle 0162 qui ne sera pas concernée par l'installation de panneaux est recouverte par le même type de milieux herbacés, il n'y a pas forcément nécessiter d'épargner des bandes tampons autour des panneaux.

Enfin, pour ce qui est de la zone même du parc, l'idéal est que les panneaux ne soient pas trop proches les uns des autres, afin d'éviter un ombrage permanent. Nous estimons que l'entretien de la végétation entre les panneaux peut être réalisée une ou deux fois par an, en fonction de la vitesse de pousse.

Bibliographie

- BARTHE L., 2014. *Liste rouge des amphibiens et des reptiles de Midi-Pyrénées*. Nature Midi-Pyrénées. 12 p.
- BISSARDON M. & GUIBAL L., 1997, *Corine Biotope (version originale) - Types d'habitats français*, ENGREF Nancy, 175 p.
- CATIL J.-M. & COCHARD P.-O., (coord.), 2022. *Liste rouge des Orthoptères d'Occitanie*. Rapport d'évaluation. Nature En Occitanie. Toulouse. 235 p.
- CHARLOT B., DANFLOUS S., LOUBOUTIN B. & JAULIN S. (coord.), 2018, *Liste rouge des Odonates d'Occitanie. Rapport d'évaluation*, CEN Midi-Pyrénées & OPIE, Toulouse, 102 p. + annexes.
- CORRIOL G. (coord.), 2013, *Liste rouge de la flore vasculaire de Midi-Pyrénées*, Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, 16 p.
- DREAL Occitanie, Listes d'espèces et d'habitats déterminants pour les ZNIEFF ; lien internet : <https://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/vers-des-znieff-troisieme-generation-en-occitanie-a24635.html>
- GOR & LPO Occitanie (Coord.), 2024. *Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs d'Occitanie*. 20 p.
- JULVE P., 1998, Baseflor : index botanique, écologique et chorologique de la flore de France
site Internet : <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>
- LOUBOUTIN B., JAULIN S., CHARLOT B. & DANFLOUS S. (coord.), 2019, *Liste rouge des Lépidoptères Rhopalocères et Zygènes d'Occitanie. Rapport d'évaluation*, OPIE, CEN MP & CEN LR. 304 p.
- LOUVEL J., GAUDILLAT V. & PONCET L., 2013, *EUNIS - système d'information européen sur la nature - classification des habitats*, Museum National d'Histoire Naturelle, Ministère de l'Environnement. 289 p.
- TURPIN L., DAO J. & COTTAZ C., 2023, *Stratégie régionale relative aux plantes exotiques envahissantes d'Occitanie. Plan d'actions 2023-2032*. Conservatoire botanique national méditerranéen et Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. 67 p. + annexes
- UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2016. *La Liste rouge des espèces menacées en France, Chapitre oiseaux de France métropolitaine*, Paris, France, 31 p.

Annexes : listes d'espèces

Voir pages suivantes

Liste exhaustive des espèces végétales observées sur le site d'étude le 29 septembre 2025

Nom scientifique	Nom(s) français	Famille	Végétation sur site	Exogène
<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	Achillée millefeuille	Asteraceae	Friches herbacées	
<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	Aigremoine eupatoire, Francormier	Rosaceae	Friches herbacées (ourlets)	
<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	Agrostide capillaire, Agrostide commune	Poaceae	Friches herbacées	
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, 1916	Ailante glanduleux, Faux vernis du Japon	Simaroubaceae	Ruisseau de l'Azin	x
<i>Amaranthus deflexus</i> L., 1771	Amarante couchée, Amarante étalée	Amaranthaceae	Zones rudérales (et bords de route)	x
<i>Amaranthus hybridus</i> L., 1753	Amarante hybride, Brède pariétaire	Amaranthaceae	Zones rudérales (et bords de route)	x
<i>Atriplex patula</i> L., 1753	Arroche étalée	Amaranthaceae	Zones rudérales (et bords de route)	
<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC., 1805	Arroche prostrée, Arroche hastée	Amaranthaceae	Fossés (friches amphibies annuelles)	
<i>Beta vulgaris</i> L., 1753	Betterave commune, Bette, Betterave à sucre	Amaranthaceae	Zones rudérales (et bords de route)	
<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	Bouleau pleureur, Bouleau verruqueux, Boulard	Betulaceae	Friches herbacées (arbustes isolés)	
<i>Bidens frondosa</i> L., 1753	Bident feuillé, Bident à fruits noirs	Asteraceae	Fossés (friches amphibies annuelles)	x
<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch, 1833	Chou noir, Moutarde noire	Brassicaceae	Zones rudérales (et bords de route)	
<i>Bryonia dioica</i> Jacq., 1774	Bryone dioïque	Cucurbitaceae	Vergers	
<i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753	Cardamine hérissée, Cardamine hirsute	Brassicaceae	Vergers	
<i>Carex divulsa</i> Stokes, 1787	Laîche écartée	Cyperaceae	Friches herbacées (ourlets)	
<i>Carex pendula</i> Huds., 1762	Laîche à épis pendants, Laîche pendante	Cyperaceae	Fossés (mégaphorbiaies eutrophes)	
<i>Catalpa bignonioides</i> Walter, 1788	Catalpa fausse bignone, Catalpa	Bignoniaceae	Friches herbacées (arbustes isolés)	x
<i>Centaurea decipiens</i> Thuill., 1799	Centauree trompeuse, Centauree décevante	Asteraceae	Friches herbacées (ourlets)	
<i>Ceratochloa cathartica</i> (Vahl) Herter, 1940	Brome cathartique, Brome purgatif	Poaceae	Zones rudérales (et bords de route)	x
<i>Chenopodium album</i> subsp. <i>album</i> L., 1753	Chénopode blanc, Senousse	Amaranthaceae	Zones rudérales (et bords de route)	
<i>Cichorium intybus</i> L., 1753	Chicorée sauvage, Chicorée amère	Asteraceae	Zones rudérales (et bords de route)	
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des champs, Chardon des champs, Calcide	Asteraceae	Friches herbacées	
<i>Cirsium vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées	Asteraceae	Zones rudérales (et bords de route)	
<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753	Liseron des champs, Vrillée, Petit liseron	Convolvulaceae	Cultures	
<i>Convolvulus sepium</i> L., 1753	Liseron des haies, Liset, Calystégie des haies	Convolvulaceae	Fossés (mégaphorbiaies eutrophes)	
<i>Cornus sanguinea</i> subsp. <i>sanguinea</i> L., 1753	Cornouiller sanguin, Sanguine	Cornaceae	Friches herbacées (arbustes isolés)	
<i>Corylus avellana</i> L., 1753	Noisetier commun, Noisetier, Coudrier	Betulaceae	Ruisseau de l'Azin	
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style, Aubépine monogyne	Rosaceae	Friches herbacées (arbustes isolés)	

Nom scientifique	Nom(s) français	Famille	Végétation sur site	Exogène
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805	Cynodon dactyle, Chiendent pied-de-poule	Poaceae	Zones rudérales (et bords de route)	
<i>Cyperus eragrostis</i> Lam., 1791	Souchet vigoureux, Souchet robuste	Cyperaceae	Fossés (mégaphorbiaies eutrophes)	x
<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i> L., 1753	Dactyle aggloméré, Pied-de-poule	Poaceae	Friches herbacées	
<i>Datura stramonium</i> L., 1753	Datura stramoine	Solanaceae	Zones rudérales (et bords de route)	x
<i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i> L., 1753	Carotte sauvage, Carotte commune	Apiaceae	Friches herbacées	
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop., 1771	Digitaire sanguine, Digitaire commune	Poaceae	Zones rudérales (et bords de route)	
<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	Cardère à foulon, Cabaret des oiseaux	Caprifoliaceae	Fossés (mégaphorbiaies eutrophes)	
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv., 1812	Échinochloa pied-de-coq, Panic pied-de-coq	Poaceae	Fossés (friches amphibies annuelles)	
<i>Echium vulgare</i> L., 1753	Vipérine commune, Vipérine vulgaire	Boraginaceae	Zones rudérales (et bords de route)	
<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn., 1788	Éleusine des Indes, Crételle des Indes	Poaceae	Zones rudérales (et bords de route)	x
<i>Elytrigia repens</i> subsp. <i>repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934	Chiendent rampant, Élytrigie rampante	Poaceae	Friches herbacées	
<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf., 1799	Prêle très rameuse, Prêle rameuse	Equisetaceae	Fossés (mégaphorbiaies eutrophes)	
<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P.Beauv., 1812	Éragrostide poilue, Éragrostis poilu	Poaceae	Zones rudérales (et bords de route)	
<i>Erigeron canadensis</i> L., 1753	Érigéron du Canada, Vergerette du Canada	Asteraceae	Zones rudérales (et bords de route)	x
<i>Erigeron sumatrensis</i> Retz., 1810	Érigéron de Sumatra, Vergerette de Sumatra	Asteraceae	Zones rudérales (et bords de route)	x
<i>Euphorbia helioscopia</i> subsp. <i>helioscopia</i> L., 1753	Euphorbe réveil-matin	Euphorbiaceae	Vergers	
<i>Euphorbia lathyris</i> L., 1753	Euphorbe épurge, Euphorbe des jardins	Euphorbiaceae	Zones rudérales (et bords de route)	x
<i>Euphorbia maculata</i> L., 1753	Euphorbe maculée, Euphorbe tachetée	Euphorbiaceae	Zones rudérales (et bords de route)	x
<i>Euphorbia peplus</i> L., 1753	Euphorbe péplus, Euphorbe des jardins	Euphorbiaceae	Vergers	
<i>Euphorbia prostrata</i> Aiton, 1789	Grande rougette, euphorbe prostrée	Euphorbiaceae	Zones rudérales (et bords de route)	x
<i>Ficus carica</i> L., 1753	Figuier d'Europe	Moraceae	Ruisseau de l'Azin	x
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl, 1804 [nom. cons.]	Frêne à feuilles étroites	Oleaceae	Friches herbacées (arbustes isolés)	
<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	Frêne élevé, Frêne commun	Oleaceae	Friches herbacées (arbustes isolés)	
<i>Galega officinalis</i> L., 1753	Galéga officinal, Sainfoin d'Espagne	Fabaceae	Fossés (mégaphorbiaies eutrophes)	x
<i>Galium album</i> Mill., 1768	Gaillet blanc, Gaillet dressé	Rubiaceae	Friches herbacées (ourlets)	
<i>Galium aparine</i> L., 1753	Gaillet gratteron, Herbe collante, Gratteron	Rubiaceae	Fossés (mégaphorbiaies eutrophes)	
<i>Hedera helix</i> L., 1753	Lierre grimpant, Lierre commun	Araliaceae	Vergers	
<i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub, 1973	Picride fausse vipérine	Asteraceae	Zones rudérales (et bords de route)	
<i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	Ache nodiflore, Ache noueuse	Apiaceae	Cressonnières (fossés)	

Nom scientifique	Nom(s) français	Famille	Végétation sur site	Exogène
<i>Holcus lanatus</i> subsp. <i>lanatus</i> L., 1753	Houlque laineuse, Blanchard	Poaceae	Friches herbacées	
<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean	Hypericaceae	Friches herbacées	
<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	Porcelle enracinée, Salade-de-porc	Asteraceae	Friches herbacées	
<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791	Jacobée commune, Séneçon jacobée	Asteraceae	Friches herbacées	
<i>Juglans regia</i> L., 1753	Noyer royal, Noyer commun	Juglandaceae	Friches herbacées (arbustes isolés)	x
<i>Juncus effusus</i> L., 1753	Jonc épars	Juncaceae	Fossés (mégaphorbiaies eutrophes)	
<i>Laurus nobilis</i> L., 1753	Laurier noble, Laurier-sauce	Lauraceae	Ruisseau de l'Azin	x
<i>Leontodon saxatilis</i> subsp. <i>saxatilis</i> Lam., 1779	Liondent des rochers, Liondent faux pissenlit	Asteraceae	Zones rudérales (et bords de route)	
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton, 1810	Troène luisant	Oleaceae	Ruisseau de l'Azin	x
<i>Lipandra polysperma</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012	Lipandra polysperme, Chénopode polysperme	Amaranthaceae	Fossés (friches amphibies annuelles)	
<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	Lycophe d'Europe, Chanvre d'eau	Lamiaceae	Ruisseau de l'Azin (mégaphorbiaies eutrophes)	
<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	Salicaire commune, Salicaire pourpre	Lythraceae	Ruisseau de l'Azin (mégaphorbiaies eutrophes)	
<i>Malva sylvestris</i> L., 1753	Mauve sylvestre, Grande mauve	Malvaceae	Zones rudérales (et bords de route)	
<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762	Luzerne d'Arabie, Luzerne maculée	Fabaceae	Zones rudérales (et bords de route)	
<i>Melilotus albus</i> Medik., 1787	Mélilot blanc	Fabaceae	Zones rudérales (et bords de route)	
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh., 1792	Menthe à feuilles rondes, Menthe sauvage	Lamiaceae	Fossés (mégaphorbiaies eutrophes)	
<i>Mercurialis annua</i> L., 1753	Mercuriale annuelle, Vignette	Euphorbiaceae	Cultures	
<i>Nasturtium officinale</i> W.T.Aiton, 1812	Rorippe cresson-d'eau, Cresson	Brassicaceae	Cressonnières (fossés)	
<i>Oenothera x fallax</i> Renner, 1917	Onagre trompeuse	Onagraceae	Zones rudérales (et bords de route)	x
<i>Panicum capillare</i> L., 1753	Panic capillaire, Millet capillaire	Poaceae	Zones rudérales (et bords de route)	x
<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx., 1803	Panic à fleurs dichotomes, Panic dichotome	Poaceae	Zones rudérales (et bords de route)	x
<i>Parthenocissus inserta</i> (A.Kern.) Fritsch, 1922	Vigne-vierge commune, Vigne-vierge insérée	Vitaceae	Fossés (mégaphorbiaies eutrophes)	x
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir., 1804	Paspale dilaté	Poaceae	Zones rudérales (et bords de route)	x
<i>Paspalum distichum</i> L., 1759	Paspale distique, Paspale à deux épis	Poaceae	Cressonnières (fossés)	x
<i>Persicaria amphibia</i> (L.) Gray, 1821	Persicaire amphibie, Renouée amphibie	Polygonaceae	Fossés (herbiers aquatiques)	
<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach, 1841	Persicaire poivre-d'eau, Renouée poivre-d'eau	Polygonaceae	Fossés (friches amphibies annuelles)	
<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre, 1800	Persicaire à feuilles de patience	Polygonaceae	Fossés (friches amphibies annuelles)	

Nom scientifique	Nom(s) français	Famille	Végétation sur site	Exogène
<i>Persicaria maculosa</i> Gray, 1821 [nom. cons.]	Persicaire maculée, Renouée persicaire	Polygonaceae	Fossés (friches amphibies annuelles)	
<i>Phalaris arundinacea</i> subsp. <i>arundinacea</i> L., 1753	Alpiste roseau, Baldingère faux roseau	Poaceae	Fossés (mégaphorbiaies eutrophes)	
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	Phragmite austral, Roseau commun	Poaceae	Ruisseau de l'Azin (roselières)	
<i>Phytolacca americana</i> L., 1753	Phytolaque d'Amérique, Raisin d'Amérique	Phytolaccaceae	Zones rudérales (et bords de route)	x
<i>Picris hieracioides</i> subsp. <i>hieracioides</i> L., 1753	Picride fausse épervière, Picride épervière	Asteraceae	Friches herbacées	
<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	Plantain lancéolé, Petit plantain	Plantaginaceae	Friches herbacées	
<i>Poa annua</i> subsp. <i>annua</i> L., 1753	Pâturin annuel	Poaceae	Vergers	
<i>Polygonum aviculare</i> L., 1753	Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse	Polygonaceae	Zones rudérales (et bords de route)	
<i>Populus nigra</i> L., 1753	Peuplier noir, Peuplier commun noir	Salicaceae	Friches herbacées (arbustes isolés)	
<i>Portulaca oleracea</i> L., 1753	Pourpier potager, Pourpier rouge	Portulacaceae	Zones rudérales (et bords de route)	
<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	Potentille rampante, Quintefeuille	Rosaceae	Friches herbacées	
<i>Poterium sanguisorba</i> subsp. <i>balearica</i> (Bourg. ex Nyman) Stace, 2009	Sanguisorbe des Baléares	Rosaceae	Friches herbacées	
<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	Herbe Catois	Lamiaceae	Friches herbacées	
<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., 1784	Prunier myrobolan, Prunier porte-cerise	Rosaceae	Friches herbacées (arbustes isolés)	x
<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	Prunier épineux, Épine noire, Prunellier	Rosaceae	Friches herbacées (arbustes isolés)	
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800	Pulicaire dysentérique, Inule dysentérique	Asteraceae	Fossés (mégaphorbiaies eutrophes)	
<i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem., 1847 [nom. cons.]	Pyracantha écarlate, Buisson ardent	Rosaceae	Friches herbacées (arbustes isolés)	x
<i>Quercus pubescens</i> Willd., 1796	Chêne pubescent, chêne humble	Fagaceae	Friches herbacées (arbustes isolés)	
<i>Quercus robur</i> L., 1753	Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle	Fagaceae	Friches herbacées (arbustes isolés)	
<i>Ranunculus acris</i> subsp. <i>friesianus</i> (Jord.) Syme, 1863	Renoncule de Fries	Ranunculaceae	Friches herbacées	
<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	Renoncule rampante, Bouton-d'or rampant	Ranunculaceae	Fossés (mégaphorbiaies eutrophes)	
<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753	Robinier faux-acacia, Robinier	Fabaceae	Friches herbacées (arbustes isolés)	x
<i>Rosa trachyphylla</i> A.Rau, 1816	Rosier à feuilles scabres, Rosier de Jundzill	Rosaceae	Friches herbacées (arbustes isolés)	
<i>Rubus</i> sp.	Ronces (non identifiées)	Rosaceae	Friches herbacées (roncières)	
<i>Rumex acetosa</i> subsp. <i>acetosa</i> L., 1753	Patience oseille, Oseille des prés, Rumex oseille	Polygonaceae	Friches herbacées	
<i>Rumex crispus</i> L., 1753	Rumex crépu	Polygonaceae	Friches herbacées	
<i>Rumex obtusifolius</i> subsp. <i>obtusifolius</i> L., 1753	Oseille à feuilles obtuses	Polygonaceae	Zones rudérales (et bords de route)	
<i>Rumex pulcher</i> subsp. <i>pulcher</i> L., 1753	Patience élégante, Oseille élégante	Polygonaceae	Zones rudérales (et bords de route)	

Nom scientifique	Nom(s) français	Famille	Végétation sur site	Exogène
<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	Saule roux cendré foncé, Saule acuminé	Salicaceae	Friches herbacées (arbustes isolés)	
<i>Salvia verbenaca</i> subsp. <i>verbenaca</i> L., 1753	Sauge verveine, Sauge fausse verveine	Lamiaceae	Zones rudérales (et bords de route)	
<i>Sambucus ebulus</i> L., 1753	Sureau yèble, Herbe à l'aveugle, Petit sureau	Viburnaceae	Zones rudérales (et bords de route)	
<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	Sureau noir, Sampéquier	Viburnaceae	Ruisseau de l'Azin	
<i>Saponaria officinalis</i> L., 1753	Saponaire officinale, Savonnière, Herbe à savon	Caryophyllaceae	Zones rudérales (et bords de route)	
<i>Schedonorus arundinaceus</i> subsp. <i>arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort., 1824	Schédonore roseau, Fétuque faux roseau	Poaceae	Friches herbacées	
<i>Scrophularia auriculata</i> subsp. <i>auriculata</i> L., 1753	Scrofulaire auriculée	Scrophulariaceae	Ruisseau de l'Azin (mégaphorbiaies eutrophes)	
<i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753	Scutellaire à casque, Scutellaire casquée	Lamiaceae	Ruisseau de l'Azin (mégaphorbiaies eutrophes)	
<i>Senecio inaequidens</i> DC., 1838	Séneçon du Cap	Asteraceae	Zones rudérales (et bords de route)	x
<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult., 1817	Sétaire naine, Sétaire glauque	Poaceae	Zones rudérales (et bords de route)	
<i>Silene latifolia</i> Poir., 1789	Silène à feuilles larges, Compagnon blanc	Caryophyllaceae	Zones rudérales (et bords de route)	
<i>Solanum nigrum</i> L., 1753	Morelle noire	Solanaceae	Zones rudérales (et bords de route)	
<i>Sonchus asper</i> subsp. <i>asper</i> (L.) Hill, 1769	Laiteron rude, Laiteron piquant	Asteraceae	Zones rudérales (et bords de route)	
<i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753	Laiteron potager, Laiteron lisse	Asteraceae	Cultures	
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers., 1805	Sorgho d'Alep, Herbe de Cuba	Poaceae	Zones rudérales (et bords de route)	x
<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br., 1810	Sporobole des Indes, Sporobole tenace	Poaceae	Zones rudérales (et bords de route)	x
<i>Symphyotrichum squamatum</i> (Spreng.) G.L.Nesom, 1995	Symphyotriche écailléux, Aster écailléux	Asteraceae	Fossés (mégaphorbiaies eutrophes)	x
<i>Taraxacum officinale</i> F.H.Wigg., 1780	Pissenlit officinal, Pissenlit commun	Asteraceae	Vergers	
<i>Tragus racemosus</i> (L.) All., 1785	Bardanette en grappe	Poaceae	Zones rudérales (et bords de route)	
<i>Trifolium hybridum</i> L., 1753	Trèfle hybride, Trèfle bâtard, Trèfle fistuleux	Fabaceae	Friches herbacées	
<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés, Trèfle violet	Fabaceae	Friches herbacées	
<i>Trifolium repens</i> L., 1753	Trèfle rampant, Trèfle blanc	Fabaceae	Zones rudérales (et bords de route)	
<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	Orme mineur, Orme champêtre, Ormeau	Ulmaceae	Friches herbacées (arbustes isolés)	
<i>Urtica dioica</i> subsp. <i>dioica</i> L., 1753	Ortie dioïque, Grande ortie	Urticaceae	Fossés (mégaphorbiaies eutrophes)	
<i>Verbascum sinuatum</i> L., 1753	Molène sinuée	Scrophulariaceae	Zones rudérales (et bords de route)	
<i>Verbena officinalis</i> L., 1753	Verveine officinale, verveine sauvage	Verbenaceae	Zones rudérales (et bords de route)	
<i>Veronica persica</i> Poir., 1808	Véronique de Perse	Plantaginaceae	Zones rudérales (et bords de route)	x

Liste exhaustive des espèces animales observées sur le site d'étude le 29 septembre 2025

Groupe	Famille	Nom scientifique	Nom(s) français
Amphibiens	Ranidae	<i>Pelophylax ridibundus</i> (Pallas, 1771)	Grenouille rieuse (La)
Insectes Lépidoptères	Pieridae	<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade du Chou (La)
Insectes Lépidoptères	Pieridae	<i>Colias crocea</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Souci (Le)
Insectes Lépidoptères	Lycaenidae	<i>Lycaena tityrus</i> (Poda, 1761)	Cuivré fuligineux (Le)
Insectes Lépidoptères	Pieridae	<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade de la Rave (La)
Insectes Lépidoptères	Hesperiidae	<i>Carcharodus alceae</i> (Esper, 1780)	Hespérie de la Mauve (L')
Insectes Lépidoptères	Lycaenidae	<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L')
Insectes Orthoptères	Acrididae	<i>Anacridium aegyptium</i> (Linnaeus, 1764)	Criquet égyptien
Insectes Orthoptères	Tettigoniidae	<i>Decticus albifrons</i> (Fabricius, 1775)	Dectique à front blanc
Insectes Orthoptères	Acrididae	<i>Omocestus rufipes</i> (Zetterstedt, 1821)	Criquet noir-ébène
Oiseaux	Falconidae	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Faucon crécerelle
Oiseaux	Turdidae	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Merle noir
Oiseaux	Corvidae	<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	Pie bavarde
Oiseaux	Muscicapidae	<i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764)	Gobemouche noir
Oiseaux	Corvidae	<i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758	Corneille noire
Oiseaux	Columbidae	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	Pigeon ramier
Oiseaux	Scotocercidae	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	Bouscarle de Cetti
Oiseaux	Accipitridae	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Buse variable
Oiseaux	Picidae	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Pic vert, Pivert
Oiseaux	Paridae	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Mésange charbonnière
Oiseaux	Phylloscopidae	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817)	Pouillot véloce
Oiseaux	Muscicapidae	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Rougegorge familier
Reptiles	Lacertidae	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Lézard des murailles (Le)