

Annexe 1 : Diagnostic stationnel

Parcelle 1: sondage 7 et 8.




Figure 1-Champs voisin

Commentaire(s) :

Couleur : brune.

Structure : grumeleuse.


Éléments grossiers : supérieurs à 25 %
dès 15 cm de profondeur.

Prospection racinaire : blocage de la
tarière, mais prospection possible au-delà
sous réserve d'une préparation du sol
adaptée.

Activité biologique : bonne, avec présence
de lombrics.

pH : 7.

Parcelle 2: Sondage 6



Commentaire(s) :

Couleur : brune.

Structure : grumeleuse.


Éléments grossiers : environ 5 % à partir de 40 cm de profondeur, sous forme de petits graviers.

Prospection racinaire : bonne.
Horizons légèrement plus compact à partir de 30 cm.

Activité biologique : bonne, avec présence de lombrics.

pH : 6,5.

Parcelle 6: Sondage 1



Commentaire(s) :

Couleur : brune.

Structure : grumeleuse.

Éléments grossiers : environ 5 % à partir de 40 cm de profondeur, sous forme de petits graviers.

Prospection racinaire : bonne, mais localement limitée par un horizon plus compact vers 30 cm de profondeur, lié au tassement de l'argile provoqué par le passage d'engins agricoles. Présence de tâches de rouilles.

Activité biologique : bonne, malgré un travail du sol répété.

pH : 6.

