



SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE

Lieu-dit les Grands Prés, commune de Mâcon et
Charnay-lès-Mâcon (71)

Etude de pré-diagnostic écologique

Rapport

Réf : CE6000227 / 1110199

FBR / HT / FRBO

13/02/2026



GINGER BURGEAP Région Centre-Est (Lyon) • 19, rue de la Villette
69425 Lyon CEDEX 03

Tél : 04.37.91.20.50 • burgeap.lyon@groupeginger.com



SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE

Lieu-dit les Grands Prés, commune de Mâcon et Charnay-lès-Mâcon (71)

Etude de pré-diagnostic écologique

Ce rapport a été rédigé avec la collaboration de :

Objet de l'indice	Date	Indice	Rédaction Nom / signature	Vérification Nom / signature	Validation Nom / signature
Rapport	25/09/2024	01	F. BRUNET 	H. THOMAS 	F. BONNET 
Rapport	18/04/2025	02	F. BRUNET 	H. THOMAS 	F. BONNET 
Rapport	13/02/2026	03	F. BRUNET 	H. THOMAS 	S. BAKALOGLOU 

Numéro de projet / de rapport :	Réf : CE6000227 / 1110199 1110199
Num. du site d'intervention (GMP) :	15405
Domaine technique :	6_7

SOMMAIRE

1.	Objet et localisation de l'étude	5
2.	Pré-diagnostic écologique	6
2.1	Echelle territoriale : Localisation des éléments favorables à l'accueil et aux déplacements de la faune et de la flore	6
2.1.1	Les zonages du patrimoine naturel à valeur réglementaire	7
2.1.2	Les zonages du patrimoine naturel à valeur d'inventaire	9
2.1.3	Eléments de la Trame Verte et Bleue relevés (SRCE -SRADDET)	11
2.2	Echelle écosystémique : Espèces et habitats	14
2.2.2	Flore présente sur le site	15
2.2.3	Faune présente sur le site	19
2.3	Synthèse des enjeux	40

TABLEAUX

Tableau 1 : Liste des principaux éléments de la Trame Verte et Bleue relevés	7
Tableau 2 : Zonages réglementaires du patrimoine naturel	7
Tableau 3 : Zonages d'inventaire du patrimoine naturel avec leurs indices MNHN et leurs distances par rapport au site d'étude	9
Tableau 4 : Attribution de points à la présence d'une espèce dans les listes réglementaires et/ou patrimoniale	14
Tableau 5 : Enjeux obtenue par l'espèce en fonction de sa présence dans les listes règlementaires ou patrimoniales	15
Tableau 6 : Espèces végétales exotiques envahissantes	16
Tableau 7 : Espèces végétales avec un enjeu réglementaires et/ou patrimoniales significatifs	17
Tableau 8 : Espèces d'oiseaux à enjeux réglementaires et/ou patrimoniaux significatifs	20
Tableau 9 : Espèces de reptiles relevées lors des inventaires naturalistes	28
Tableau 10 : Espèces d'amphibiens relevées lors des suivis naturalistes de 2014 à 2023	30
Tableau 11 : Espèces de mammifères relevées lors des suivis naturalistes de 2016 à 2024	32
Tableau 12 : Tableau récapitulatif des espèces de chiroptères protégées et/ou remarquables relevées dans la bibliographie	34
Tableau 13 : Tableau récapitulatif des espèces d'insectes protégées et/ou remarquables relevées dans la bibliographie	37

FIGURES

Figure 1 : Localisation de l'étude	5
Figure 2 : Zonages réglementaires du patrimoine naturel	8
Figure 3 : Zonages d'inventaire du patrimoine naturel	10
Figure 4 : Schéma Régionale de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Bourgogne	12
Figure 5 : Trame verte et bleue à proximité du site d'étude	13
Figure 6 : Synthèse des enjeux localisés pressentis au stade du pré-diagnostic écologique	41

ANNEXES

Annexe 1. Liste des espèces de la flore et de la faune relevées sur le terrain et dans la bibliographie

1. Objet et localisation de l'étude

Le projet prévoit l'aménagement de plusieurs parcelles dont l'occupation actuelle est majoritairement agricole. Trois lots sont concernés (lots 1, 2 et 4), représentant une surface totale de 101 041 m², pour une surface de projet réelle de 91 866 m². Le lot 4 est conservé en réserve foncière.


Le projet comprendra à la fois des bâtiments et des aires de stationnement, sur le territoire de la commune de Charnay-lès-Mâcon en Saône-et-Loire (71).

Le site s'inscrit dans une matrice agricole et urbaine, à proximité de l'aérodrome de Mâcon. Bien que l'usage actuel des parcelles soit agricole, l'implantation du projet s'effectue au sein d'une ZAC, sur des parcelles classées AUX au PLU.

La **Figure 1** localise l'emprise du site d'étude.

Figure 1 : Localisation de l'étude

(Source : GINGER BURGEAP sur fond Scan 25 de Géoportail)



L'objectif de cette étude est de prédéfinir les enjeux liés à la faune et à la flore, présents sur le site ou à proximité immédiate.

Cet inventaire n'est pas exhaustif, il vise à dégrossir les enjeux écologiques du site, sans en proposer une caractérisation fine.

Pour cela, plusieurs passages de terrain sont nécessaires et devront être complétés par un diagnostic écologique plus approfondi. L'ensemble des espèces issues de la bibliographie est présenté dans les tableaux des enjeux par groupe, avec un niveau d'enjeu défini uniquement au regard de leur statut réglementaire et patrimonial.

Ainsi, les enjeux ne sont pas caractérisés finement à l'échelle du site, seul un ressenti issu du passage de terrain réalisé en septembre est proposé.

De ce fait, les enjeux et les espèces peuvent être surreprésentés, notamment par la prise en compte d'espèces non inféodées au site, ou au contraire sous-représentés pour certaines autres espèces.

Il repose principalement sur des données bibliographiques extraites du Système d'Information de l'Inventaire du Patrimoine naturel (SINP) « Sigogne » de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Une phase de terrain a ensuite été réalisée pour compléter ces données bibliographiques. Cette phase s'est déroulée le 11/09/2024 et a consisté en des observations opportunistes.

Bien que la période estivale ne soit pas la plus propice à l'observation de la faune et de la flore, elle a permis de mieux appréhender la diversité des habitats, les obstacles potentiels pour la faune, ainsi que les corridors écologiques.

La méthodologie adoptée est une approche à descente d'échelle, où les éléments et zonages favorables à la biodiversité sont d'abord consultés, avant de procéder à l'inventaire des espèces faunistiques et floristiques.

Pour rappel, cette étude ne constitue pas un inventaire faune-flore complet et réalisé selon les règles de l'art et ne pourra pas satisfaire les exigences de l'évaluation environnementale si le projet devait y être soumis.

2. Pré-diagnostic écologique

2.1 Echelle territoriale : Localisation des éléments favorables à l'accueil et aux déplacements de la faune et de la flore

En premier lieu, sera analysé, le patrimoine naturel sur site et à proximité. Les zonages du patrimoine naturel sont qualifiés de zonages réglementaires ou d'inventaires.

Les zonages d'inventaire sont des zonages d'intérêts et d'avertissements pour les aménageurs, mais n'ont pas de valeur d'opposabilité. Leurs objectifs étant d'apporter des informations sur la qualité et la patrimonialité des milieux en présence.

Les zonages réglementaires apportent une contrainte réglementaire et ont valeur d'opposabilité au projet. Les contraintes sont intrinsèques aux milieux en question et les interventions sur site peuvent être limitées ou interdites.

Cette analyse bibliographique intégrera également les **éléments de la Trame Verte et Bleue**, mais l'écologue en charge de l'étude pourra également apporter son expertise afin de positionner des éléments qui lui semblent favorables au bon déplacement des espèces et des populations.

Le **Tableau 1** suivant récapitule les éléments analysés et identifiés dans la démarche de la Trame Verte et Bleue.

Tableau 1 : Liste des principaux éléments de la Trame Verte et Bleue relevés

Éléments de la trame verte et bleue (TVB)
Espaces perméables favorables aux déplacements de population
Réservoirs de biodiversité
Corridors écologiques surfacique
Corridors écologiques linéaires
Corridors écologiques transrégionaux
Cours d'eau de la trame bleue

2.1.1 Les zonages du patrimoine naturel à valeur réglementaire

Trois zonages réglementaires sont présents à proximité du site d'étude.

Ces zonages règlementaires sont des zones Spéciale de Conservation (ZSC), des Zones de Protection Spéciales (ZPS) et des Zone Importante pour la Conservations des Oiseaux (ZICO).

Les ZSC et les ZPS font partie du réseau Natura 2000. La ZSC vise à protéger des habitats et des espèces d'intérêt communautaire. L'objectif est de maintenir ou de rétablir un état de conservation favorable pour ces espèces et habitats. La ZPS est destinée à protéger les oiseaux sauvages. Elle vise à assurer la conservation des espèces d'oiseaux migrateurs ou en danger, en offrant des espaces adaptés pour leur reproduction, alimentation, et migration.

Les ZICO sont des sites identifiés comme cruciaux pour la conservation des populations d'oiseaux à l'échelle nationale ou internationale.

L'ensemble des zonages sont récapitulés dans le **Tableau 2**.


Tableau 2 : Zonages réglementaires du patrimoine naturel

Nom de la zone naturelle	Distance et position par rapport au site
<u>Protections réglementaires</u>	
<u>Zone Spéciale de Conservation (ZSC)</u>	
Prairies humides et forêts alluviales du Val de Saône : FR8201632	2.1 km (à l'ouest)
Pelouses calcicoles du Mâconnais : FR2600972	5 km (à l'est)
<u>Zone de Protection Spéciale (ZPS)</u>	
Prairies alluviales et milieux associés de Saône-et-Loire : FR2612006	2.1 km (à l'ouest)
Val de Saône : FR8212017	2.4 km (à l'ouest)
<u>Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO)</u>	
Val de Saône	2.2 km (à l'ouest)

La **Figure 2** localise les zonages réglementaires à proximité du site d'étude.

Figure 2 : Zonages réglementaires du patrimoine naturel

(Source: INPN et Ginger BURGEAP)



2.1.2 Les zonages du patrimoine naturel à valeur d'inventaire

Plusieurs zonages d'inventaire se trouvent à proximité du site d'étude avec deux ZNIEFF de type 1 et trois ZNIEFF de type 2.

Pour rappel, les ZNIEFF de type 1 sont sélectionnées en raison de la rareté, de la fragilité ou de la représentativité des espèces, des milieux ou des paysages qu'elles abritent ce qui en fait un intérêt écologique exceptionnel. Leur protection vise à assurer la pérennité des espèces et des milieux rares ou menacés. Ces zones bénéficient d'une protection réglementaire renforcée en comparaison aux ZNIEFF de type 2.

Les ZNIEFF de type 2 sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

Le **Tableau 3** relève l'ensemble des zonages d'inventaires à proximité du site d'étude.


Tableau 3 : Zonages d'inventaire du patrimoine naturel avec leurs indices MNHN et leurs distances par rapport au site d'étude

Nom de la zone naturelle	Distance et position par rapport au site
Protections réglementaires	
<u>Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1</u>	
Prairies inondables du val de Saône : 820030856	2.3 km (à l'est)
Prairies inondables du Val de Saône de Varennes à Saint-Symphorien-d'Ancelles : 260015449	1.4 km (à l'est)
<u>Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 2</u>	
Roches-sud-mâconnaises : 260014865	2.6 km (à l'ouest)
Val de Saône méridional : 820030870	2.2 km (à l'est)
Saône aval et confluence avec la Selle : 260120001	2.1 km (à l'est)

La **Figure 3** localise les zonages d'inventaires à proximité du site d'étude.

Figure 3 : Zonages d'inventaire du patrimoine naturel

(Source: INPN et Ginger BURGEAP)



2.1.3 Eléments de la Trame Verte et Bleue relevés (SRCE -SRADDET)

La mise en place d'un réseau national de continuités écologiques, la trame verte et bleue, est l'une des mesures phares du Grenelle de l'environnement. Cette démarche, s'inscrivant pleinement dans l'objectif d'enrayer la perte de biodiversité, vise à favoriser les déplacements et la migration de certaines espèces en préservant et restaurant des continuités écologiques entre les milieux naturels.

La conception de la trame verte et bleue repose sur trois niveaux :

- des orientations nationales pour la préservation et la restauration des continuités écologiques,
- des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE), élaborés par les régions et l'Etat en association avec les collectivités, les associations de protection de l'environnement concernées ainsi que des représentants des partenaires socioprofessionnels intéressés,
- des documents de planification et projets des collectivités territoriales.

Le conseil régional de Bourgogne, réuni en session plénière le 16 mars 2015, a approuvé le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de Bourgogne par 51 voix pour et 3 abstentions.

L'arrêté d'adoption a été signé le 6 mai 2015 par M. Eric DELZANT, préfet de la région Bourgogne et de Côte d'Or.

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) prévoit l'intégration du SRCE dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) de Bourgogne-Franche-Comté.


Selon les cartes des composantes de la trame verte et bleue, le site d'étude se trouve en périphérie d'une grande agglomération. L'agglomération Mâconnais-Beaujolais est située à l'est, à proximité du site d'étude, et crée de nombreux obstacles aux déplacements de la faune, notamment en raison des infrastructures de transport importantes.

Le corridor alluvial le plus proche, d'intérêt régional et interrégional, est représenté par la Saône. Ce cours d'eau abrite une grande diversité d'habitats pour la faune et la flore inféodées aux milieux humides, tout en attirant une large variété d'espèces de tous taxons et milieux.

Le SRCE de la Bourgogne est représenté dans la **Figure 4**.

Figure 4 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Bourgogne

(Source: DREAL BFC avec annotations GINGER BURGEAP)



Le standard SRCE COVADIS (Couche SIG nationale) a également été regardé par GINGER BURGEAP, il est représenté en **Figure 5**.

Dans la zone d'étude, l'aéroport de Mâcon-Charnay peut être considéré comme un réservoir de biodiversité. En effet, les aéroports constituent souvent des habitats refuges, notamment grâce aux prairies qui les entourent. L'aéroport est situé dans une partie ouest du site, relativement moins urbanisée, avec seulement quelques lotissements dispersés. Les milieux y sont majoritairement ouverts, composés de grandes cultures et de prairies. Des haies et de petits boisements forment des unités bocagères essentielles pour la faune et la flore.

À une échelle plus large, les bois de Cenves, situés à environ 7 km du site d'étude, constituent un réservoir forestier important pour les espèces inféodées aux milieux boisés. Ces bois sont connectés aux petits boisements environnants (4 km du site d'étude), renforçant les corridors écologiques de la trame verte. Bien que le site d'étude ne soit pas un véritable réservoir de biodiversité en raison de l'activité humaine importante, il peut servir de milieu transitoire au sein de cette trame, offrant des zones de repos, de reproduction et de nourriture, en particulier pour les insectes et les oiseaux.


Toutefois, la présence de grillages et de talus autour du site limite les déplacements des espèces terrestres, en particulier des petits animaux.

En revanche, les prairies situées au nord de la zone d'étude sont quant à elles des habitats propices à plusieurs étapes du cycle de vie des mammifères, des reptiles et des insectes. Les rapaces, par exemple, peuvent utiliser ces prairies comme réservoirs de nourriture, renforçant ainsi l'importance de ces milieux ouverts pour la biodiversité locale.

Au niveau des obstacles à proximité du site d'étude, plusieurs routes communales entourent le site d'étude. Les plus gros obstacles restent l'autoroute A6 qui se situe à 500m environ qui crée une grosse barrière qui peut isoler les populations animales et végétales, rendant difficile leur déplacement et la recherche de nourriture, de partenaires, ou de nouveaux territoires. Cela peut également limiter les échanges génétiques entre populations.

Figure 5 : Trame verte et bleue à proximité du site d'étude

(Source: SRCE COVADIS et Ginger BURGEAP)



2.2 Echelle écosystémique : Espèces et habitats

Les espèces ont été recensées via le SINP de la DREAL Bourgogne, connu sous le nom de Sigogne.

Ces données couvrent une maille de **5 km x 5 km** autour du site.

Par conséquent, les espèces observées ne sont pas nécessairement inféodées au site en question. Elles peuvent y être présentes de façon transitoire, y trouver un lieu de nourrissage, un refuge, ou encore un habitat de reproduction. GINGER BURGEAP a également mené une prospection sur le site, en portant une attention particulière aux habitats, afin de mieux comprendre quelles espèces peuvent y être rencontrées.

Les espèces présentées sont celles présentant le plus d'enjeux par taxon mais l'ensemble des espèces relevées sur le terrain et dans la bibliographie se trouve en **Annexe 1**.

2.2.1 Méthodologie pour la définition des enjeux

Pour déterminer les enjeux, la présence des espèces dans les listes réglementaires et patrimoniales aux échelles nationale et régionale sont pris en compte. Un système de point est établi afin de catégoriser l'enjeu de l'espèce.

Tableau 4 : Attribution de points à la présence d'une espèce dans les listes réglementaires et/ou patrimoniale

Statuts	Score retenue					
Réglementaires						
Directive habitats/oiseaux (toutes annexes confondues)	6					
Espèces protégées en France ou en région	6					
Patrimonialités						
Liste rouge en France (Toutes LR confondues statut le plus élevé retenu)	DD	LC	NT	VU	EN	CR
	0	0.5	1.5	2.5	4	5
Liste rouge régionale	DD	LC	NT	VU	EN	CR
	0	0.5	1.5	2.5	4	5
Espèces déterminantes Znieff	3					
Score maximum	25					

Tableau 5 : Enjeux obtenue par l'espèce en fonction de sa présence dans les listes règlementaires ou patrimoniales

Score final de l'espèce	Enjeux
<0	Sans enjeux
0-5	Faible
5-10	Moyen
10-15	Fort
15-20	Très fort
20-25	Dominant

2.2.2 Flore présente sur le site

De nombreuses espèces végétales exotiques envahissantes sont présentes dans la maille de 5km par 5km autour du site. Cependant, en raison de leur niche écologique, plusieurs d'entre elles ont peu de chances d'être présentes directement sur le site. Ces espèces sont généralement adaptées aux bords de cours d'eau ou aux zones humides permanentes (Saône, affluents et milieux humides à proximité).

Le couvert maraîcher présente un avantage en limitant le risque d'implantation de ces espèces, grâce à un travail régulier du sol et à un couvert végétal permanent à quasi-permanent, ce qui rend difficile leur établissement. Ces espèces sont en effet mieux adaptées à des milieux pionniers. Toutefois, certaines zones sur site, comme les friches agricoles, remblais ou espaces peu végétalisés, pourraient offrir des conditions favorables à leur développement. Lors du projet, la perturbation du sol et l'absence de végétation pourraient favoriser la germination de graines en dormance dans le sol. Le risque d'invasion n'est donc pas totalement écarté.

Ces espèces pionnières, très compétitives, colonisent rapidement leur environnement. Elles bénéficient de mécanismes de reproduction optimisés (reproduction végétative, production abondante de graines), tolèrent une large gamme de conditions environnementales et résistent bien aux perturbations fréquentes (érosion, inondations, etc.), ce qui favorise leur expansion. C'est pourquoi GINGER BURGEAP a également considéré des espèces non encore reconnues comme envahissantes à l'échelle de la Bourgogne, mais potentiellement problématiques en raison des caractéristiques mentionnées.

Le **Tableau 6** cite les espèces végétales exotiques envahissantes recensées à proximité du site. Parmi ces espèces les espèces intrinsèquement liés au milieu humide ou bord de cours sont surlignés en **rouge** et les espèces présentant une niche écologique proche de la zone d'étude sont surlignés en **orange**.

Tableau 6 : Espèces végétales exotiques envahissantes

Noms vernaculaires	Noms scientifiques
Liste préliminaire d'espèces exotiques envahissantes présentes ou potentiellement présentes sur le territoire bourguignon datant de 2009	
Ambroise élevée	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>
Bident feuillé	<i>Bidens frondosa</i>
Érable negundo	<i>Acer negundo</i>
Robinier faux-acacia	<i>Robinia pseudoacacia</i>
Topinambour	<i>Helianthus tuberosus</i>
Vergerette annuelle	<i>Erigeron annuus</i>
Vigne-vierge commune	<i>Parthenocissus inserta</i>
Espèces supplémentaires potentiellement considérées comme exotiques envahissantes en raison de leur origine géographique, de leur capacité de dispersion, de leur compétitivité et des impacts négatifs qu'elles peuvent engendrer (Selon GINGER BURGEAP)	
Amarante couchée	<i>Amaranthus deflexus</i>
Amarante réfléchie	<i>Amaranthus retroflexus</i>
Aster lancéolé	<i>Symphyotrichum lanceolatum</i>
Conyze du Canada	<i>Erigeron canadensis</i>
Jonc grêle	<i>Juncus tenuis</i>
Oxalide droit	<i>Oxalis stricta</i>
Panic à fleurs dichotomes	<i>Panicum dichotomiflorum</i>
Panic capillaire	<i>Panicum capillare</i>
Symphorine à fruits blancs	<i>Symphoricarpos albus</i>
Vergerette de Barcelone	<i>Erigeron sumatrensis</i>

La zone d'étude abrite de nombreuses espèces végétales protégées et/ou patrimoniales, bien que peu d'entre elles présentent des enjeux significatifs. **Les relevés, étant anciens, ne garantissent pas la présence actuelle de toutes ces espèces dans la zone d'étude.**

Seules sept espèces sont considérées comme présentant des enjeux notables en dehors de la zone d'étude. Parmi ces espèces, il y a une très faible probabilité que celle-ci soient rencontrés sur site et sont plutôt inféodées aux milieux humides de la Saône.

Seul, le brome à deux étamines (*Anisantha diandra*) et le prénanthe pourpre (*Prenanthes purpurea*) pourraient se retrouver sur site. **Aucune espèce à enjeu réglementaire n'a été identifiée par GINGER BURGEAP** lors des prospections, celles-ci ont eu lieu dans des conditions peu favorables, certaines parcelles ayant été fauchées et la période de prospection n'étant pas optimale.

Les principales espèces à enjeux sont énoncées dans le **Tableau 7**.

Tableau 7 : Espèces végétales avec un enjeux réglementaires et/ou patrimoniales significatifs

Nom vernaculaire (Nom scientifique)	Statuts réglementaires			Statuts patrimoniaux			Espèces exotiques envahissantes	ENJEUX
	Directive habitats - annexe IV	Directive habitats - annexe II	Espèces protégées en France	LR France	LR Bourgogne	Dét. ZNIEFF Bourgogne	Bourgogne	
Ail à tige anguleuse (<i>Allium angulosum</i>)	–	–	–	EN	EN	Déterminant	–	Fort
Fougère d'eau à quatre feuilles (<i>Marsilea quadrifolia</i>)	–	–	Oui	NT	EN	Déterminant	–	Fort
Brome à deux étamines (<i>Anisantha diandra</i>)	–	–	–	LC	CR	Déterminant	–	Moyen
Genêt d'Allemagne (<i>Genista germanica</i>)	–	–	–	LC	EN	Déterminant	–	Moyen
Inule des fleuves (<i>Inula britannica</i>)	–	–	–	NT	VU	Déterminant	–	Moyen
Laîche à épi noir (<i>Carex melanostachya</i>)	–	–	–	VU	VU	Déterminant	–	Moyen
Préanthe pourpre (<i>Prenanthes purpurea</i>)	–	–	–	LC	VU	Déterminant	–	Moyen

Légende :

- Directive habitats - annexe IV : statut communautaire au titre de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats » qui regroupe les espèces animales et végétales espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte
- Directive habitats - annexe II : statut communautaire au titre de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats » qui regroupe des espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
- Espèces protégées en France : Annexe 1 de l'arrêté du 20 janvier 1982 modifié fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire
- LR France : La liste rouge des espèces menacées de la flore vasculaire de France métropolitaine (UICN, 2018) : CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes
- LR Bourgogne : Liste rouge régionale de la flore vasculaire de Bourgogne (DREAL BFC, 2015) : CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes
- Dét. ZNIEFF Bourgogne : Liste des espèces de flore déterminantes en région BFC (Bailly et al., 2021)
- Espèces végétales exotiques envahissantes : Proposition de liste préliminaire d'espèces exotiques envahissantes présentes ou potentiellement présentes sur le territoire bourguignon (Diren Bourgogne, 2009)

2.2.3 Faune présente sur le site

► Avifaune

L'avifaune est particulièrement diversifiée en raison de la grande variété d'habitats disponibles à proximité : des milieux humides en lien avec la Saône, des habitats ouverts à semi-ouverts caractéristiques de la zone d'étude, ainsi que des zones urbaines.

La proximité avec la Saône, véritable réservoir de biodiversité et axe migratoire majeur, renforce l'attrait du site pour les oiseaux.

Ainsi, de nombreuses espèces l'utilisent comme site de reproduction, notamment dans les haies et boisements, mais aussi comme lieu d'alimentation et de refuge.

Les secteurs les plus sensibles sont les zones ligneuses, les bords de cultures et les prairies situées au nord.

Entre 2014 et 2022, 97 espèces d'oiseaux ont été recensées aux abords du site dans une maille de 5km par 5km, parmi lesquelles on retrouve notamment le Milan royal (*Milvus milvus*) et le Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*), présentant respectivement des enjeux de conservation très forts et forts.

À noter que de nombreuses espèces inféodées aux milieux humides et rivulaires de la Saône présentent peu de probabilités d'utiliser le site, hormis éventuellement en transit. Parmi celles-ci, les espèces suivantes ont de très faibles chances d'utiliser le site : Héron pourpré (*Ardea purpurea*), Aigrette garzette (*Egretta garzetta*), Grande Aigrette (*Ardea alba*), Héron cendré (*Ardea cinerea*), Héron garde-bœufs (*Bubulcus ibis*), Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*), Cygne tuberculé (*Cygnus olor*), Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*) et Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*).

D'autres espèces ne présentent aucune probabilité de présence sur le site, notamment le Martin-pêcheur d'Europe (*Alcedo atthis*), la Bergeronnette des ruisseaux (*Motacilla cinerea*), le Chevalier cul-blanc (*Tringa ochropus*) et le Petit Gravelot (*Charadrius dubius*).

Enfin, plusieurs espèces pourraient utiliser le site de manière ponctuelle, en lien avec des phases de déplacement ou d'alimentation opportuniste, telles que le Pipit farlouse (*Anthus pratensis*), le Pipit spioncelle (*Anthus spinoletta*), la Cisticole des joncs (*Cisticola juncidis*), le Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*), la Mouette rieuse (*Chroicocephalus ridibundus*), le Goéland leucophée (*Larus michahellis*) et le Goéland brun (*Larus fuscus*).

Le **Tableau 8** présente les espèces ayant un statut réglementaire et/ou patrimonial, classées de très fort à moyen.

Les espèces surlignées en bleu sont les espèces relevées par GINGER BURGEAP lors des relevés de terrain.

Tableau 8 : Espèces d'oiseaux à enjeux réglementaires et/ou patrimoniaux significatifs

Nom vernaculaire (Nom scientifique)	Statuts réglementaires		Statuts patrimoniaux					ENJEUX
	Espèces protégées en France	Directive Oiseaux - annexe I	LR France Oiseaux nicheurs	LR France Oiseaux hivernants	LR France Oiseaux de passage	LR Oiseaux Bourgogne	Dét. ZNIEFF Bourgogne	
Héron pourpré (<i>Ardea purpurea</i>)	Nat.	N2000	LC	–	–	EN	Déterminant	Très fort
Milan royal (<i>Milvus milvus</i>)	Nat.	N2000	VU	VU	NA	EN	–	Très fort
Aigrette garzette (<i>Egretta garzetta</i>)	Nat.	N2000	LC	NA	–	VU	–	Fort
Alouette lulu (<i>Lullula arborea</i>)	Nat.	N2000	LC	NA	–	VU	–	Fort
Bondrée apivore (<i>Pernis apivorus</i>)	Nat.	N2000	LC	–	LC	LC	–	Fort
Bruant jaune (<i>Emberiza citrinella</i>)	Nat.	–	VU	NA	NA	VU	–	Fort
Chardonneret élégant (<i>Carduelis carduelis</i>)	Nat.	–	VU	NA	NA	VU	–	Fort
Cigogne blanche (<i>Ciconia ciconia</i>)	Nat.	N2000	LC	NA	NA	NT	–	Fort
Épervier d'Europe (<i>Accipiter nisus</i>)	Nat.	N2000	LC	NA	NA	LC	–	Fort
Goéland michahellis (<i>Larus michahellis</i>)	Nat.	–	LC	NA	NA	EN	–	Fort
Grande Aigrette (<i>Ardea alba</i>)	Nat.	N2000	NT	LC	–	–	–	Fort
Grimpereau des jardins (<i>Certhia brachydactyla</i>)	Nat.	N2000	LC	–	–	LC	–	Fort
Martin-pêcheur d'Europe (<i>Alcedo atthis</i>)	Nat.	N2000	VU	NA	–	DD	–	Fort

Nom vernaculaire (Nom scientifique)	Statuts réglementaires		Statuts patrimoniaux					ENJEUX
	Espèces protégées en France	Directive Oiseaux - annexe I	LR France Oiseaux nicheurs	LR France Oiseaux hivernants	LR France Oiseaux de passage	LR Oiseaux Bourgogne	Dét. ZNIEFF Bourgogne	
Milan noir (Milvus migrans)	Nat.	N2000	LC	–	NA	LC	–	Fort
Moineau friquet (Passer montanus)	Nat.	–	EN	–	–	EN	–	Fort
Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus)	Nat.	–	NT	LC	NA	EN	–	Fort
Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus)	Nat.	N2000	LC	NA	NA	VU	–	Fort
Pic épeiche (Dendrocopos major)	Nat.	N2000	LC	NA	–	LC	–	Fort
Pic noir (Dryocopus martius)	Nat.	N2000	LC	–	–	LC	–	Fort
Pinson des arbres (Fringilla coelebs)	Nat.	N2000	LC	NA	NA	LC	–	Fort
Pipit farlouse (Anthus pratensis)	Nat.	–	VU	DD	NA	VU	–	Fort
Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes)	Nat.	N2000	LC	NA	–	LC	–	Fort
Accenteur mignon (Prunella modularis)	Nat.	–	LC	NA	–	LC	–	Moyen
Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea)	Nat.	–	LC	NA	–	LC	–	Moyen
Bergeronnette grise (Motacilla alba)	Nat.	–	LC	NA	–	LC	–	Moyen
Bruant proyer (Emberiza calandra)	Nat.	–	LC	–	–	LC	–	Moyen
Bruant zizi (Emberiza cirlus)	Nat.	–	LC	–	NA	LC	–	Moyen

Nom vernaculaire (Nom scientifique)	Statuts réglementaires		Statuts patrimoniaux					ENJEUX
	Espèces protégées en France	Directive Oiseaux - annexe I	LR France Oiseaux nicheurs	LR France Oiseaux hivernants	LR France Oiseaux de passage	LR Oiseaux Bourgogne	Dét. ZNIEFF Bourgogne	
Buse variable (Buteo buteo)	Nat.	–	LC	NA	NA	LC	–	Moyen
Chevalier cul-blanc (Tringa ochropus)	Nat.	–	–	NA	LC	–	–	Moyen
Choucas des tours (Corvus monedula)	Nat.	–	LC	NA	–	LC	–	Moyen
Chouette hulotte (Strix aluco)	Nat.	–	LC	NA	–	LC	–	Moyen
Cisticole des joncs (Cisticola juncidis)	Nat.	–	VU	–	–	LC	–	Moyen
Cygne tuberculé (Cygnus olor)	Nat.	–	LC	NA	–	NA	–	Moyen
Effraie des clochers (Tyto alba)	Nat.	–	LC	–	–	NT	–	Moyen
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)	Nat.	–	NT	NA	NA	LC	–	Moyen
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla)	Nat.	–	LC	NA	NA	LC	–	Moyen
Fauvette des jardins (Sylvia borin)	Nat.	–	NT	–	DD	NT	–	Moyen
Fauvette grisette (Sylvia communis)	Nat.	–	LC	–	DD	LC	–	Moyen
Gobemouche gris (Muscicapa striata)	Nat.	–	NT	–	DD	DD	–	Moyen
Goéland brun (Larus fuscus)	Nat.	–	LC	LC	NA	–	–	Moyen
Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis)	Nat.	–	LC	NA	–	LC	–	Moyen

Nom vernaculaire (Nom scientifique)	Statuts réglementaires		Statuts patrimoniaux					ENJEUX
	Espèces protégées en France	Directive Oiseaux - annexe I	LR France Oiseaux nicheurs	LR France Oiseaux hivernants	LR France Oiseaux de passage	LR Oiseaux Bourgogne	Dét. ZNIEFF Bourgogne	
Grèbe huppé (Podiceps cristatus)	Nat.	–	LC	NA	–	LC	–	Moyen
Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes)	Nat.	–	LC	NA	–	LC	–	Moyen
Guêpier d'Europe (Merops apiaster)	Nat.	–	LC	–	NA	LC	–	Moyen
Héron cendré (Ardea cinerea)	Nat.	–	LC	NA	NA	LC	–	Moyen
Héron garde-boeufs (Bubulcus ibis)	Nat.	–	LC	NA	–	VU	–	Moyen
Hibou moyen-duc (Asio otus)	Nat.	–	LC	NA	NA	LC	–	Moyen
Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum)	Nat.	–	NT	–	DD	NT	–	Moyen
Hirondelle rustique (Hirundo rustica)	Nat.	–	NT	–	DD	VU	–	Moyen
Huppe fasciée (Upupa epops)	Nat.	–	LC	NA	–	LC	–	Moyen
Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta)	Nat.	–	LC	–	NA	LC	–	Moyen
Linotte mélodieuse (Linaria cannabina)	Nat.	–	–	–	–	–	–	Moyen
Loriot d'Europe (Oriolus oriolus)	Nat.	–	LC	–	NA	LC	–	Moyen
Martinet à ventre blanc (Tachymarptis melba)	Nat.	–	LC	–	–	–	–	Moyen
Martinet noir (Apus apus)	Nat.	–	NT	–	DD	DD	–	Moyen

Nom vernaculaire (Nom scientifique)	Statuts réglementaires		Statuts patrimoniaux					ENJEUX
	Espèces protégées en France	Directive Oiseaux - annexe I	LR France Oiseaux nicheurs	LR France Oiseaux hivernants	LR France Oiseaux de passage	LR Oiseaux Bourgogne	Dét. ZNIEFF Bourgogne	
Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus)	Nat.	–	LC	–	NA	NT	–	Moyen
Mésange bleue (Cyanistes caeruleus)	Nat.	–	LC	–	–	LC	–	Moyen
Mésange charbonnière (Parus major)	Nat.	–	LC	NA	NA	LC	–	Moyen
Mésange noire (Periparus ater)	Nat.	–	LC	–	–	DD	–	Moyen
Mésange paludicole (Poecile palustris)	Nat.	–	LC	–	–	LC	–	Moyen
Moineau domestique (Passer domesticus)	Nat.	–	LC	–	NA	LC	–	Moyen
Petit Gravelot (Charadrius dubius)	Nat.	–	LC	–	NA	NT	–	Moyen
Pic épeichette (Dendrocopos minor)	Nat.	–	VU	–	–	LC	–	Moyen
Pic vert (Picus viridis)	Nat.	–	LC	–	–	LC	–	Moyen
Pinson du Nord (Fringilla montifringilla)	Nat.	–	–	DD	NA	–	–	Moyen
Pipit spioncelle (Anthus spinoletta)	Nat.	–	LC	NA	NA	–	–	Moyen
Pouillot véloce (Phylloscopus collybita)	Nat.	–	LC	NA	NA	LC	–	Moyen
Roitelet huppé (Regulus regulus)	Nat.	–	NT	NA	NA	LC	–	Moyen
Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos)	Nat.	–	LC	–	NA	LC	–	Moyen

Nom vernaculaire (Nom scientifique)	Statuts réglementaires		Statuts patrimoniaux					ENJEUX
	Espèces protégées en France	Directive Oiseaux - annexe I	LR France Oiseaux nicheurs	LR France Oiseaux hivernants	LR France Oiseaux de passage	LR Oiseaux Bourgogne	Dét. ZNIEFF Bourgogne	
Rougegorge familier (Erithacus rubecula)	Nat.	–	LC	NA	NA	DD	–	Moyen
Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus)	Nat.	–	LC	–	NA	LC	–	Moyen
Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros)	Nat.	–	LC	NA	NA	LC	–	Moyen
Serin cini (Serinus serinus)	Nat.	–	VU	–	NA	DD	–	Moyen
Sittelle torchepot (Sitta europaea)	Nat.	–	LC	–	–	LC	–	Moyen
Sizerin flammé (Acanthis flammea)	Nat.	–	–	–	–	–	–	Moyen
Tarier pâtre (Saxicola rubicola)	Nat.	–	NT	–	–	LC	–	Moyen
Tarin des aulnes (Spinus spinus)	Nat.	–	–	–	–	–	–	Moyen
Vanneau huppé (Vanellus vanellus)	–	–	NT	LC	NA	EN	–	Moyen
Verdier d'Europe (Chloris chloris)	Nat.	–	–	–	–	LC	–	Moyen

Légende :

- Directive Oiseaux – annexe I : Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 abrogée et remplacée par la Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concerne la conservation des oiseaux sauvages

- Espèces protégées en France : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection

- LR France oiseaux nicheurs : La Liste rouge des espèces menacées en France - oiseaux de France métropolitaine (UICN, 2016) : CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes

- LR France oiseaux hivernants : Liste rouge des oiseaux non nicheurs de France métropolitaine hivernants (UICN, 2011) : CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes
- LR France oiseaux de passage : Liste rouge des oiseaux non nicheurs de France métropolitaine de passage (UICN, 2011) : CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes
- LR RA : Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs, migratoires et hivernants de Rhône-Alpes (2008) : CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes
- Dét. ZNIEFF PACA : liste des espèces de faune déterminantes en région AURA (DREAL AURA, 2023)

► Reptiles

Entre 2018 et 2019, trois espèces de reptiles ont été recensées lors d'investigations de terrain dans une maille de 5km par 5km. Cependant, aucune n'a été identifiée par GINGER BURGEAP.

Malgré cela, plusieurs habitats sur le site sont favorables à l'accueil de ces espèces, et des proies y sont disponibles pour la chasse.

Il est très probable que le Lézard des murailles (*Podarcis muralis*) soit présent sur place.

Par ailleurs, les zones ensoleillées en lisière de forêt et au sein des parcelles agricoles pourraient convenir à la Couleuvre verte et jaune (*Hierophis viridiflavus*).

Le site d'étude comprend également des milieux plus fermés et ombragés, comme des zones boisées, susceptibles d'abriter la Couleuvre d'Esculape (*Zamenis longissimus*), bien que cette espèce soit plus difficile à observer, en raison du faible nombre de points d'eau à proximité immédiate.

Le **Tableau 9** cite les différentes espèces de reptiles relevées sur les précédents suivis naturalistes.

Tableau 9 : Espèces de reptiles relevées lors des inventaires naturalistes

Nom vernaculaire (Nom scientifique)	Statuts réglementaires			Statuts patrimoniaux			ENJEUX
	Directive habitats - annexe IV	Directive habitats - annexe II	Espèces protégées en France	LR France	LR Bourgogne	Dét. ZNIEFF Bourgogne	
Couleuvre verte et jaune (<i>Hierophis viridiflavus</i>)	—	—	Nat.	LC	LC	Complémentaire	Moyen
Couleuvre d'Esculape (<i>Zamenis longissimus</i>)	—	—	Nat.	LC	LC	Complémentaire	Moyen
Lézard des murailles (<i>Podarcis muralis</i>)	N2000	—	Nat.	—	LC	Complémentaire	Moyen

Légende :

- Directive habitats - annexe IV : statut communautaire au titre de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats » qui regroupe les espèces animales et végétales espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte
- Directive habitats - annexe II : statut communautaire au titre de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats » qui regroupe des espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
- Espèces protégées en France : Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national
- LR France : La Liste rouge des reptiles de France métropolitaine (UICN, 2015) : CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes
- LR Bourgogne : Liste rouge régionale des reptiles menacés en Bourgogne (DREAL BFC, 2015) : CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes
- Dét. ZNIEFF AURA : liste des espèces de faune déterminantes en région Bourgogne (Buffat, 2021)

► Amphibiens

Concernant les amphibiens, trois espèces ont été recensées entre 2016 et 2024.

Les mares artificielles et les bassins présents sur le site offrent des conditions favorables à l'accueil et à la reproduction des amphibiens.

GINGER BURGEAP a identifié la Grenouille verte (*Pelophylax kl. esculentus*) dans les zones 1. Étant donné que les spécimens observés étaient juvéniles, il est très probable que la reproduction ait lieu sur site.

Le Crapaud commun (*Bufo bufo*), inventorié en 2016 aux abords du site dans une maille de 5km par 5km, est une espèce ubiquiste, pouvant occuper divers habitats du site, notamment les boisements et les bords de cultures.

Quant à la Salamandre tachetée (*Salamandra salamandra*), elle préfère les boisements humides ce qui limite sa présence sur site, hormis au niveau du bois au nord-est du site d'étude.

Le **Tableau 10** cite les différentes espèces d'amphibiens connues aux abords du site.

Tableau 10 : Espèces d'amphibiens relevées lors des suivis naturalistes de 2014 à 2023

Nom vernaculaire (Nom scientifique)	Statuts réglementaires			Statuts patrimoniaux			ENJEUX
	Directive habitats - annexe IV	Directive habitats - annexe II	Espèces protégées en France	LR France	LR Rhône - Alpes	Dét. ZNIEFF Med	
Crapaud commun (Bufo bufo)	—	—	Nat.	LC	LC	—	Moyen
Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)	—	—	Nat.	LC	LC	—	Moyen
Grenouille commune (Pelophylax kl. Esculentus)	—	—	Nat.	NT	DD	—	Moyen

Légende :

- Directive habitats - annexe IV : statut communautaire au titre de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats » qui regroupe les espèces animales et végétales espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte
- Directive habitats - annexe II : statut communautaire au titre de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats » qui regroupe des espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
- Espèces protégées en France : Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national
- LR France : La Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine (UICN, 2015) : CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes
- LR Bourgogne : Liste rouge des amphibiens menacés en Rhône-Alpes (DREAL, 2015) : CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes
- Dét. ZNIEFF Bourgogne : liste des espèces de faune déterminantes en région AURA (Buffat, 2021)

► Mammifères (hors chiroptères)

Dix espèces de mammifères (hors chiroptères) ont été recensées dans une maille de 5km par 5km aux abords du site d'étude, toutes susceptibles d'être retrouvées sur le site d'étude, au moins en transit. Les enjeux de conservation pour ces espèces sont globalement faibles à moyens.

Le hérisson d'Europe (*Erinaceus europaeus*) et l'écureuil roux (*Sciurus vulgaris*) représentent les espèces présentant les enjeux les plus importants. Les espaces forestiers sont les plus favorables aux mammifères, bien que GINGER BURGEAP ait relevé des traces de chevreuil. Cela montre que, malgré la forte anthropisation, des grands mammifères peuvent encore se déplacer et se nourrir dans ces parcelles maraîchères.

Le **Tableau 11** cite les espèces de mammifères rencontrées lors des précédents suivis naturalistes.

Tableau 11 : Espèces de mammifères relevées lors des suivis naturalistes de 2016 à 2024

Nom vernaculaire (Nom scientifique)	Statuts réglementaires			Statuts patrimoniaux			ENJEUX
	Directive habitats - annexe IV	Directive habitats - annexe II	Espèces protégées en France	LR France	LR Bourgogne	Dét. ZNIEFF Bourgogne	
Hérisson d'Europe (<i>Erinaceus europaeus</i>)	Oui	–	–	LC	LC	–	Moyen
Ecureuil roux (<i>Sciurus vulgaris</i>)	–	–	Oui	LC	LC	–	Moyen
Lapin de garenne (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	–	–	–	NT	NT	–	Faible
Renard roux (<i>Vulpes vulpes</i>)	–	–	–	LC	LC	–	Faible
Sanglier (<i>Sus scrofa</i>)	–	–	–	LC	LC	–	Faible
Chevreuil (<i>Capreolus capreolus</i>)	–	–	–	LC	LC	–	Faible
Lièvre d'Europe (<i>Lepus europaeus</i>)	–	–	–	LC	LC	–	Faible
Lérot (<i>Eliomys quercinus</i>)	–	–	–	LC	LC	–	Faible
Blaireau (<i>Meles meles</i>)	–	–	–	LC	LC	–	Faible
Rat surmulot (<i>Rattus norvegicus</i>)	–	–	–	–	–	–	Espèce exotique envahissante

Légende :

- Directive habitats - annexe IV : statut communautaire au titre de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats » qui regroupe les espèces animales et végétales espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte

- Directive habitats - annexe II : statut communautaire au titre de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats » qui regroupe des espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)

- Espèces protégées en France : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire

- LR France : La Liste rouge des espèces menacées en France - Mammifères de France métropolitaine (UICN, 2017) : CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes

- LR Bourgogne : Liste rouge des mammifères hors-chiroptères de Bourgogne (DREAL Bourgogne, 2015) : CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes

- Dét. ZNIEFF Bourgogne : liste des espèces de faune déterminantes en région Bourgogne (Buffat, 2021)

► Chiroptères

L'enjeu sur les chiroptères est moyen à très fort, dix espèces dans la bibliographie ont été recensées.

Le site d'étude peut présenter des habitats de refuge ou d'hivernation tels que des arbres à cavité.

Le site présentant le plus d'enjeu est le boisement au nord-est du site d'étude mais les chauves-souris pourraient également utiliser les haies ou les prairies pour chasser les insectes présents dans le reste de l'aire d'étude. Ces milieux ouverts sont également des corridors de déplacement entre leurs gîtes et leurs zones de chasse.

Le **Tableau 12** relève les espèces identifiées dans la bibliographie aux abords du site dans une maille de 5km par 5km entre 2019 et 2020.

Tableau 12 : Tableau récapitulatif des espèces de chiroptères protégées et/ou remarquables relevées dans la bibliographie

Noms communs (noms scientifiques)	Statuts réglementaires			Statuts patrimoniaux			ENJEUX
	Directive habitats - annexe IV	Directive habitats - annexe II	Espèces protégées en France	LR France	LR Bourgogne	Espèces déterminantes ZNIEFF	
Murin de Natterer (<i>Myotis nattereri</i>)	Oui		Oui	VU	VU	–	Très Fort
Petit rhinolophe (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)	Oui	Oui	Oui	LC	NT	Déterminante	Très fort
Barbastelle d'Europe (<i>Barbastella barbastellus</i>)	Oui	Oui	Oui	LC	NT	Déterminante	Très fort
Sérotine commune (<i>Eptesicus serotinus</i>)	Oui	–	Oui	NT	LC	–	Fort
Noctule de Leisler (<i>Nyctalus leisleri</i>)	Oui	–	Oui	NT	NT	–	Fort
Noctule commune (<i>Nyctalus noctula</i>)	Oui		Oui	VU	DD	–	Fort
Pipistrelle commune (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)	Oui	–	Oui	NT	LC	–	Fort
Pipistrelle de Kuhl (<i>Pipistrellus kuhlii</i>)	Oui	–	Oui	LC	LC	–	Fort
Oreillard roux (<i>Plecotus auritus</i>)	Oui	–	Oui	LC	DD	–	Fort
Murin de Daubenton (<i>Myotis daubentonii</i>)	–	–	Oui	LC	LC	–	Moyen

Légende :

- Directive habitats - annexe IV : statut communautaire au titre de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats » qui regroupe les espèces animales et végétales espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte

- Directive habitats - annexe II : statut communautaire au titre de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats » qui regroupe des espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)

- Espèces protégées en France : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire

- LR France : La Liste rouge des espèces menacées en France - Mammifères de France métropolitaine (UICN, 2017) : CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes

- LR Bourgogne : Liste rouge régionale des chiroptères de Bourgogne (DREAL BFC, 2015) : CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes

- Dét. ZNIEFF Bourgogne : liste des espèces de faune déterminantes en région Bourgogne (Buffat, 2021)

► Entomofaune

Au total, 65 espèces d'insectes ont été inventoriées dont 53 espèces ayant des enjeux réglementaires et/ou patrimoniaux mais ces enjeux restent faibles.

Ces inventaires ont été réalisés entre 2014 et 2022 dans une maille de 5km par 5km autour du site d'étude et il est probable que les populations d'insectes aient changé.

En revanche, il est probable que d'autres espèces au vu de la mosaïque d'habitat soient présentes sur site. Les zones maraîchères présentent de nombreux avantages pour les insectes. Elles constituent une source importante de nourriture, avec des fleurs disponibles une grande partie de l'année, offrant nectar et pollen indispensables aux pollinisateurs tels que les abeilles, bourdons, papillons, et autres espèces de mouches.

En outre, ces cultures maraîchères et vergers fournissent des refuges pour les insectes auxiliaires, comme les coccinelles, syrphes et chrysopes, qui se trouvent souvent dans les haies et les bordures de parcelles.

Dans ce jardin maraîcher, géré en agriculture biologique, la biodiversité des insectes peut être renforcée grâce à l'absence ou à la faible utilisation de pesticides.

Enfin, plusieurs espèces sont préférentiellement liées aux milieux humides, aquatiques ou rivulaires, notamment ceux formés par la Saône, en particulier les odonates (libellules et demoiselles), dont le cycle de vie dépend directement de la présence d'eau. Ainsi, l'Aeschne bleue (*Aeshna cyanea*), le Caloptéryx vierge (*Calopteryx virgo*), l'Agrion mignon (*Coenagrion scitulum*), l'Agrion élégant (*Ischnura elegans*), l'Agrion à larges pattes (*Platycnemis pennipes*), la Petite nymphe au corps de feu (*Pyrrhosoma nymphula*), le Leste brun (*Sympecma fusca*), l'Orthétrum à stylets blancs (*Orthetrum albistylum*) et l'Orthétrum réticulé (*Orthetrum cancellatum*) ne sont pas inféodés au site, mais susceptibles d'être observés uniquement en périphérie ou en transit.

Le **Tableau 13** relève les espèces inventoriées aux abords du site dans une maille de 5km par 5km.

Tableau 13 : Tableau récapitulatif des espèces d'insectes protégées et/ou remarquables relevées dans la bibliographie

Nom vernaculaire (Nom scientifique)	Statuts réglementaires			Statuts patrimoniaux				ENJEUX
	Espèces protégées en France	Directive habitats - annexe II	Directive habitats - annexe IV	LR France	LR Odonates Bourgogne	LR Rhopalocères et Zygènes Bourgogne	Dét. ZNIEFF PACA	
Aeschna bleue (Aeshna cyanea)	–	–	–	LC	LC	–	–	Faible
Paon-du-jour (Aglais io)	–	–	–	LC	–	LC	–	Faible
Petite Tortue (Aglais urticae)	–	–	–	LC	–	LC	–	Faible
Aurore (Anthocharis cardamines)	–	–	–	LC	–	LC	–	Faible
Gazé (Aporia crataegi)	–	–	–	LC	–	LC	–	Faible
Carte géographique (Araschnia levana)	–	–	–	LC	–	LC	–	Faible
Collier-de-coraïl (Aricia agestis)	–	–	–	LC	–	LC	–	Faible
Petite Violette (Boloria dia)	–	–	–	LC	–	LC	–	Faible
Nacré de la ronce (Brenthis daphne)	–	–	–	LC	–	LC	–	Faible
Thécia de la ronce (Callophrys rubi)	–	–	–	LC	–	LC	–	Faible
Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo)	–	–	–	LC	LC	–	–	Faible
Hespérie de l'alcée (Carcharodus alceae)	–	–	–	LC	–	LC	–	Faible
Hespérie du brome (Carterocephalus palaemon)	–	–	–	LC	–	LC	–	Faible
Azuré des nerpruns (Celastrina argiolus)	–	–	–	LC	–	LC	–	Faible
Agrion mignon (Coenagrion scitulum)	–	–	–	LC	LC	–	–	Faible
Céphale (Coenonympha arcania)	–	–	–	LC	–	LC	–	Faible
Fadet commun (Coenonympha pamphilus)	–	–	–	LC	–	LC	–	Faible
Argus frêle (Cupido minimus)	–	–	–	LC	–	LC	–	Faible

Azuré des cytises (<i>Glaucopsyche alexis</i>)	—	—	—	LC	—	NT	—	Faible
Citron (<i>Gonepteryx rhamni</i>)	—	—	—	LC	—	LC	—	Faible
Lucine (<i>Hamearis lucina</i>)	—	—	—	LC	—	LC	—	Faible
Flambé (<i>Iphiclides podalirius</i>)	—	—	—	LC	—	LC	—	Faible
Agrion élégant (<i>Ischnura elegans</i>)	—	—	—	LC	LC	—	—	Faible
Mégère (<i>Lasiommata megera</i>)	—	—	—	LC	—	LC	—	Faible
Piérade du lotier (<i>Leptidea sinapis</i>)	—	—	—	LC	—	LC	—	Faible
Cuivré commun (<i>Lycaena phlaeas</i>)	—	—	—	LC	—	LC	—	Faible
Myrtil (<i>Maniola jurtina</i>)	—	—	—	LC	—	LC	—	Faible
Demi-deuil (<i>Melanargia galathea</i>)	—	—	—	LC	—	LC	—	Faible
Mélitée du mélampyre (<i>Melitaea athalia</i>)	—	—	—	LC	—	LC	—	Faible
Mélitée du plantain (<i>Melitaea cinxia</i>)	—	—	—	LC	—	LC	—	Faible
Mélitée orangée (<i>Melitaea didyma</i>)	—	—	—	LC	—	LC	—	Faible
Mélitée des centaurees (<i>Melitaea phoebe</i>)	—	—	—	LC	—	LC	—	Faible
Sylvaine (<i>Ochlodes sylvanus</i>)	—	—	—	LC	—	LC	—	Faible
Orthétrum à stylets blancs (<i>Orthetrum albistylum</i>)	—	—	—	LC	LC	—	—	Faible
Orthétrum réticulé (<i>Orthetrum cancellatum</i>)	—	—	—	LC	LC	—	—	Faible
Machaon (<i>Papilio machaon</i>)	—	—	—	LC	—	LC	—	Faible
Tircis (<i>Pararge aegeria</i>)	—	—	—	LC	—	LC	—	Faible
Piérade du chou (<i>Pieris brassicae</i>)	—	—	—	LC	—	LC	—	Faible
Piérade du navet (<i>Pieris napi</i>)	—	—	—	LC	—	LC	—	Faible
Piérade de la rave (<i>Pieris rapae</i>)	—	—	—	LC	—	LC	—	Faible
Agrion à larges pattes (<i>Platycnemis pennipes</i>)	—	—	—	LC	LC	—	—	Faible
Azuré des coronilles (<i>Plebejus argyrognomon</i>)	—	—	—	LC	—	LC	—	Faible
Azuré de la bugrane (<i>Polyommatus icarus</i>)	—	—	—	LC	—	LC	—	Faible
Petite nymphe au corps de feu (<i>Pyrrhosoma nymphula</i>)	—	—	—	LC	LC	—	—	Faible
Leste brun (<i>Sympecma fusca</i>)	—	—	—	LC	LC	—	—	Faible

Hespérie du dactyle (<i>Thymelicus lineola</i>)	—	—	—	LC	—	LC	—	Faible
Hespérie de la houque (<i>Thymelicus sylvestris</i>)	—	—	—	LC	—	LC	—	Faible
Vulcain (<i>Vanessa atalanta</i>)	—	—	—	LC	—	LC	—	Faible
Belle Dame (<i>Vanessa cardui</i>)	—	—	—	LC	—	LC	—	Faible
Zygène du Pied-de-Poule (La) (<i>Zygaena filipendulae</i>)	—	—	—	—	—	LC	—	Faible
Zygène du Lotier (<i>Zygaena loti</i>)	—	—	—	—	—	NT	—	Faible
Zygène transalpine (<i>Zygaena transalpina</i>)	—	—	—	—	—	LC	—	Faible
Zygène Des près (<i>Zygaena trifolii</i>)	—	—	—	—	—	LC	—	Faible

Légende :

- Directive habitats - annexe IV : statut communautaire au titre de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats » qui regroupe les espèces animales et végétales espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte

- Directive habitats - annexe II : statut communautaire au titre de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats » qui regroupe des espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)

- Espèces protégées en France : Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire

- LR France : La Liste rouge des araignées de France métropolitaine (UICN, 2023) / La Liste rouge des éphémères de France métropolitaine (UICN, 2018) / La Liste rouge des odonates de France métropolitaine (UICN, 2016) / La Liste rouge des rhopalocères de France métropolitaine (UICN, 2016): CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes

- LR Odonates Bourgogne : Liste rouge régionale des odonates de Bourgogne (DREAL BFC, 2015) : CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes

- LR Rhopalocères et Zygènes Bourgogne : Liste rouge régionale des Rhopalocères et Zygènes de Bourgogne (DREAL BFC, 2015) : CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes

- Dét. ZNIEFF Bourgogne : liste des espèces de faune déterminantes en région PACA (Buffat, 2021)

2.3 Synthèse des enjeux

GINGER BURGEAP a réalisé une cartographie des enjeux anticipés dans le cadre du pré-diagnostic écologique.

À ce stade, les espèces mentionnées n'ont pas été spécifiquement observées sur le site, mais sont issues d'une grille de référence de 5 km × 5 km, permettant d'intégrer les espèces susceptibles de transiter par la zone, plutôt que de s'appuyer sur des données ponctuelles à un instant donné.

Les tableaux associés précédemment présentent ainsi des enjeux définis uniquement au regard de la présence des espèces dans les listes réglementaires et patrimoniales.

Il est probable qu'une part importante de ces espèces soit principalement associée à la Saône ou à d'autres milieux environnants, sans lien fonctionnel direct avec le site du projet.

Afin de mieux caractériser les enjeux écologiques, des passages de terrain en périodes favorables aux différents groupes sont fortement recommandés, afin d'identifier les espèces effectivement présentes et de caractériser finement les enjeux, en fonction des fonctionnalités du site, de l'usage réel par les espèces et des impacts potentiels du projet.

Ces compléments permettront de mieux caractériser les enjeux réglementaires liés à la biodiversité associés au projet.

Globalement, les secteurs les plus concernés par les enjeux écologiques correspondent aux prairies situées au nord de la zone d'étude, aux bordures de parcelles comportant des alignements d'arbres, ainsi qu'aux zones boisées. Ces milieux présentent des enjeux forts à très forts, en raison des habitats qu'ils offrent à de nombreux taxons.

Une partie des prairies nord et du boisement sera maintenue en l'état dans le cadre du lot 4, tandis que le projet se développera exclusivement sur les lots 1 et 3.


Les secteurs présentant des enjeux forts correspondent à des milieux plus anthropisés, incluant notamment des bassins favorables aux amphibiens, lesquels constituent à la fois des habitats d'intérêt et des sources potentielles de risque pour la faune.

Les zones à enjeux moyens comprennent principalement les surfaces d'intercultures et de pelouses, susceptibles d'accueillir des insectes et des reptiles, et de constituer des zones de nourrissage pour l'avifaune et certains mammifères.

Enfin, les secteurs à faible enjeu écologique sont majoritairement constitués de zones maraîchères, caractérisées par une fréquentation humaine plus élevée, et offrant des habitats principalement favorables aux insectes.

La **Figure 6** présente les enjeux pressentis.

Figure 6 : Synthèse des enjeux localisés pressentis au stade du pré-diagnostic écologique



ANNEXES



Annexe 1. Liste des espèces de la flore et de la faune relevées sur le terrain et dans la bibliographie

Cette annexe contient 18 pages.

Liste des espèces floristiques relevés dans la bibliographie ou sur site (surlignée en bleu)

Noms latins	Noms communs
Aesculus hippocastanum	Marronnier d'Inde
Centaurea jacea subsp. jacea	Centaurée jacée
Stellaria aquatica	Stellaire aquatique
Rabelera holostea	Stellaire holostée
Euphorbia verrucosa	Euphorbe verruqueuse
Polytrichum formosum	Polytric élégant
Achillea millefolium	Achillée millefeuille
Achillea ptarmica	Achillée sternutatoire
Agrostis capillaris	Agrostide capillaire
Agrostis canina	Agrostide des chiens
Agrostis stolonifera	Agrostide stolonifère
Agrimonia eupatoria	Aigremoine
Allium angulosum	Ail à tige anguleuse
Allium vineale	Ail des vignes
Allium oleraceum	Ail maraîcher
Alliaria petiolata	Alliaire
Amaranthus deflexus	Amarante couchée
Amaranthus blitum	Amarante livide
Amaranthus retroflexus	Amarante réfléchie
Ambrosia artemisiifolia	Ambroise élevée
Anemone nemorosa	Anémone des bois
Angelica sylvestris	Angélique sauvage
Arabidopsis thaliana	Arabette de thalium
Aristolochia clematitis	Aristolochie clématite
Artemisia vulgaris	Armoise commune
Ononis spinosa subsp. spinosa	Arrête-boeuf
Atriplex patula	Arroche étalée
Atriplex prostrata	Arroche hastée
Asparagus officinalis	Asperge officinale
Symphyotrichum lanceolatum	Aster lancéolé
Crataegus laevigata	Aubépine à deux styles
Crataegus monogyna	Aubépine à un style
Alnus glutinosa	Aulne glutineux
Avena fatua	Avoine folle
Avenula pubescens	Avoine pubescente
Phalaris arundinacea	Baldingère faux-roseau
Barbarea vulgaris	Barbarée commune
Bothriochloa ischaemum	Barbon pied-de-poule
Arctium minus	Bardane à petites têtes

Noms latins	Noms communs
Geum urbanum	Benoîte commune
Heracleum sphondylium	Berce sphondyle
Bidens frondosa	Bident feuillé
Bidens tripartita	Bident trifolié
Prunus mahaleb	Bois de Sainte-Lucie
Euonymus europaeus	Bonnet-d'évêque
Betula pendula	Bouleau verruqueux
Ranunculus acris	Bouton d'or
Brachypodium sylvaticum	Brachypode des bois
Primula veris var. veris	Brérelle
Briza media	Brize intermédiaire
Anisantha diandra	Brome à deux étamines
Bromus arvensis	Brome des champs
Anisantha tectorum	Brome des toits
Bromus racemosus	Brome en grappe
Bromus hordeaceus	Brome mou
Anisantha sterilis	Brome stérile
Bromus commutatus	Brome variable
Prunella vulgaris	Brunelle commune
Bryonia dioica	Bryone dioïque
Ajuga reptans	Bugle rampante
Ononis spinosa subsp. procurrens	Bugrane maritime
Buxus sempervirens	Buis commun
Butomus umbellatus	Butome en ombelle
Dipsacus fullonum	Cabaret des oiseaux
Calluna vulgaris	Callune
Deschampsia cespitosa	Canche cespiteuse
Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens	Capillaire
Asplenium trichomanes	Capillaire des murailles
Capsella bursa-pastoris	Capselle bourse-à-pasteur
Cardamine pratensis	Cardamine des prés
Cardamine hirsuta	Cardamine hérissée
Dipsacus pilosus	Cardère poilu
Carlina vulgaris	Carline commune
Daucus carota	Carotte sauvage
Centaurea jacea	Centaurée jacée
Cerastium glomeratum	Céraiste aggloméré
Cerastium fontanum subsp. vulgare	Céraiste commun
Cerastium fontanum	Céraiste commune
Asplenium ceterach	Cétérach
Carpinus betulus	Charme

Noms latins	Noms communs
Castanea sativa	Chataignier
Quercus robur	Chêne pédonculé
Quercus pubescens	Chêne pubescent
Quercus petraea	Chêne sessile
Chenopodium hybridum	Chénopode à feuilles de Stramoine
Chenopodium album	Chénopode blanc
Chaerophyllum temulum	Chérophylle penché
Lonicera periclymenum	Chèvrefeuille des bois
Lonicera xylosteum	Chèvrefeuille des haies
Cichorium intybus	Chicorée sauvage
Elytrigia repens	Chiendent commun
Circaea lutetiana	Circée de Paris
Cirsium vulgare	Cirse commun
Cirsium arvense	Cirse des champs
Cirsium palustre	Cirse des marais
Clematis vitalba	Clématite des haies
Colchicum autumnale	Colchique d'automne
Silene latifolia	Compagnon blanc
Erigeron canadensis	Conyze du Canada
Papaver rhoeas	Coquelicot
Ceratophyllum demersum	Cornifle nageant
Cornus sanguinea	Cornouiller sanguin
Coronilla varia	Coronille changeante
Hippocrepis emerus	Coronille faux-séné
Primula veris	Coucou
Crepis capillaris	Crépide capillaire
Crepis pulchra	Crépide élégante
Crepis foetida	Crépide fétide
Crepis setosa	Crépide hérissée
Veronica beccabunga	Cresson de cheval
Nasturtium officinale	Cresson des fontaines
Silene baccifera	Cucubale couchée
Cymbalaria muralis	Cymbalaire
Cynodon dactylon	Cynodon dactyle
Cynosurus cristatus	Cynosure crételle
Dactylis glomerata	Dactyle aggloméré
Danthonia decumbens	Danthonie
Daphne laureola	Daphné lauréole
Digitaria sanguinalis	Digitaire sanguine
Digitalis purpurea	Digitale pourpre
Vincetoxicum hirundinaria	Dompte-venin

Noms latins	Noms communs
Asplenium ruta-muraria	Doradille rue des murailles
Solanum dulcamara	Douce amère
Dryopteris carthusiana	Dryoptéris des chartreux
Echinochloa crus-galli	Échinochloé Pied-de-coq
Hieracium sabaudum	Épervière de Savoie
Hieracium umbellatum	Épervière en ombelle
Pilosella lactucella	Épervière petite Laitue
Stachys sylvatica	Épiaire des bois
Stachys palustris	Épiaire des marais
Stachys recta	Épiaire droite
Betonica officinalis	Épiaire officinale
Epilobium lanceolatum	Épilobe à feuilles lancéolées
Epilobium parviflorum	Épilobe à petites fleurs
Epilobium tetragonum subsp. tetragonum	Épilobe à quatre angles
Epilobium tetragonum	Épilobe à tige carrée
Epilobium tetragonum subsp. lamyi	Épilobe de Lamy
Epilobium montanum	Épilobe des montagnes
Epilobium hirsutum	Épilobe hérissé
Epilobium roseum	Épilobe rosée
Epilobium obscurum	Épilobe vert foncé
Prunus spinosa	Épine noire
Berberis vulgaris	Épine-vinette
Epipactis helleborine	Épipactis à larges feuilles
Acer campestre	Érable champêtre
Acer negundo	Érable negundo
Acer platanoides	Érable plane
Acer pseudoplatanus	Érable sycomore
Eragrostis minor	Éragrostis faux-pâturin
Erodium cicutarium	Érodium à feuilles de cigue
Eupatorium cannabinum	Eupatoire à feuilles de chanvre
Euphorbia amygdaloides	Euphorbe des bois
Euphorbia lathyris	Euphorbe épurge
Euphorbia esula	Euphorbe ésule
Euphorbia peplus	Euphorbe omblette
Euphorbia cyparissias	Euphorbe petit-cyprès
Euphorbia stricta	Euphorbe raide
Euphorbia helioscopia	Euphorbe réveil matin
Bromopsis ramosa	Faux-brome rameux
Schedonorus pratensis	Fétuque des prés
Festuca heterophylla	Fétuque hétérophylle
Schedonorus arundinaceus	Fétuque Roseau

Noms latins	Noms communs
Festuca rubra	Fétuque rouge
Ficaria verna	Ficaire à bulbilles
Phleum nodosum	Fléole de Bertoloni
Phleum pratense	Fléole des prés
Anthoxanthum odoratum	Flouve odorante
Avenella flexuosa	Foin tortueux
Marsilea quadrifolia	Fougère d'eau à quatre feuilles
Athyrium filix-femina	Fougère femelle
Dryopteris filix-mas	Fougère mâle
Ruscus aculeatus	Fragon
Fragaria vesca	Fraisier sauvage
Fraxinus angustifolia	Frêne à feuilles étroites
Fraxinus excelsior	Frêne élevé
Elymus caninus	Froment des haies
Arrhenatherum elatius	Fromental élevé
Cruciata laevipes	Gaillet croisetie
Galium palustre	Gaillet des marais
Galium aparine	Gaillet gratteron
Galium verum	Gaillet jaune
Galium mollugo	Gaillet mollugine
Galeopsis tetrahit	Galéopsis tétrahit
Galinsoga parviflora	Galinsoge à petites fleurs
Rubia peregrina	Garance voyageuse
Cytisus scoparius	Genêt à balai
Genista germanica	Genêt d'Allemagne
Genista tinctoria	Genêt des teinturiers
Juniperus communis	Genévrier commun
Geranium dissectum	Géranium découpé
Geranium columbinum	Géranium des colombes
Geranium pyrenaicum	Géranium des Pyrénées
Teucrium scorodonia	Germandrée
Teucrium scordium	Germandrée des marais
Lathyrus linifolius	Gesse des montagnes
Lathyrus pratensis	Gesse des prés
Lathyrus niger	Gesse noire
Glyceria notata	Glycérie pliée
Arum maculatum	Gouet tacheté
Alisma plantago-aquatica	Grand plantain d'eau
Chelidonium majus	Grande chélidoine
Sanguisorba officinalis	Grande pimprenelle
Ribes rubrum	Groseillier rouge

Noms latins	Noms communs
Viscum album	Gui des feuillus
Althaea officinalis	Guimauve officinale
Helleborus foetidus	Hellébore fétide
Geranium robertianum subsp. robertianum	Herbe à Robert
Geranium robertianum	Herbe à Robert
Jacobaea vulgaris	Herbe de saint Jacques
Fagus sylvatica	Hêtre
Humulus lupulus	Houblon grimpant
Holcus lanatus	Houlque laineuse
Holcus mollis	Houlque molle
Ilex aquifolium	Houx
Hylotelephium telephium	Hylotéléphium téléphium
Inula britannica	Inule des fleuves
Iris pseudacorus	Iris faux acore
Lolium perenne	Ivraie vivace
Juncus articulatus	Jonc à fruits luisants
Juncus acutiflorus	Jonc à tépales aigus
Juncus compressus	Jonc à tiges comprimées
Juncus conglomeratus	Jonc aggloméré
Juncus bufonius	Jonc des crapauds
Juncus effusus	Jonc épars
Juncus inflexus	Jonc glauque
Juncus tenuis	Jonc grêle
Knautia arvensis	Knautie des champs
Carex melanostachya	Laîche à épi noir
Carex distans	Laîche à épis distants
Carex pendula	Laîche à épis pendants
Carex pairae	Laîche de Paira
Carex sylvatica	Laîche des bois
Carex acutiformis	Laîche des marais
Carex riparia	Laîche des rives
Carex disticha	Laîche distique
Carex spicata	Laîche en épi
Carex remota	Laîche espacée
Carex flacca	Laîche glauque
Carex hirta	Laîche hérissée
Carex panicea	Laîche millet
Carex caryophyllea	Laîche printanière
Carex tomentosa	Laîche tomenteuse
Sonchus asper	Laiteron épineux
Sonchus oleraceus	Laiteron potager

Noms latins	Noms communs
Lactuca serriola	Laitue scariole
Lactuca virosa	Laitue vireuse
Lamium galeobdolon	Lamier jaune
Lamium maculatum	Lamier maculé
Lapsana communis	Lampsane commune
Leersia oryzoides	Léersie faux Riz
Hedera helix	Lierre grimpant
Glechoma hederacea	Lierre terrestre
Lipandra polysperma	Limoine
Kickxia spuria	Linaire bâtarde
Linaria vulgaris	Linaire commune
Scorzoneroïdes autumnalis	Liondent d'automne
Leontodon hispidus subsp. hispidus	Liondent hispide
Leontodon hispidus	Liondent hispide
Convolvulus arvensis	Liseron des haies
Calystegia sepium	Liset
Convolvulus sepium	Liset
Lotus corniculatus	Lotier corniculé
Lotus pedunculatus	Lotus des marais
Luzula forsteri	Luzule de Forster
Luzula pilosa	Luzule de printemps
Luzula sylvatica	Luzule des bois
Luzula multiflora	Luzule multiflore
Lycopus europaeus	Lycophe d'Europe
Lysimachia vulgaris	Lysimaque commune
Lysimachia nummularia	Lysimaque nummulaire
Leucanthemum vulgare	Marguerite commune
Matricaria chamomilla	Matricaire Camomille
Tripleurospermum inodorum	Matricaire inodore
Malva moschata	Mauve musquée
Malva sylvestris	Mauve sauvage
Melampyrum pratense	Mélampyre des prés
Melilotus albus	Méililot blanc
Melilotus altissimus	Méililot élevé
Melica uniflora	Mélique uniflore
Melittis melissophyllum	Mélitte à feuilles de Mélisse
Mentha suaveolens	Menthe à feuilles rondes
Mentha aquatica	Menthe aquatique
Mentha pulegium	Menthe pouliot
Mercurialis annua	Mercuriale annuelle
Mercurialis perennis	Mercuriale vivace

Noms latins	Noms communs
Hypericum tetrapterum	Millepertuis à quatre ailes
Hypericum montanum	Millepertuis des montagnes
Hypericum pulchrum	Millepertuis élégant
Hypericum perforatum	Millepertuis perforé
Hypericum hirsutum	Millepertuis velu
Verbascum thapsus	Molène bouillon-blanc
Molinia caerulea	Molinie bleue
Molinia arundinacea	Molinie roseau
Solanum nigrum	Morelle noire
Lysimachia arvensis	Mouron rouge
Sisymbrium officinale	Moutarde
Convallaria majalis	Muguet
Myriophyllum spicatum	Myriophylle à épis
Najas marina	Naïade majeure
Crataegus germanica	Néflier commun
Nuphar lutea	Nénuphar jaune
Rhamnus cathartica	Nerprun purgatif
Corylus avellana	Noisetier
Juglans regia	Noyer commun
Lychnis flos-cuculi	Oeil-de-perdrix
Petrorhagia prolifera	Oeillet prolifère
Dianthus armeria	Oeillet velu
Oenanthe aquatica	Oenanthe aquatique
Oenanthe fistulosa	Oenanthe fistuleuse
Hordeum secalinum	Orge faux seigle
Hordeum murinum	Orge sauvage
Origanum vulgare	Origan commun
Loncomelos pyrenaicus	Ornithogale des Pyrénées
Sedum album	Orpin blanc
Sedum rubens	Orpin rougeâtre
Urtica dioica	Ortie dioïque
Rumex acetosa	Oseille des prés
Oxalis stricta	Oxalide droit
Pastinaca sativa subsp. urens	Panais brûlant
Pastinaca sativa	Panais cultivé
Panicum dichotomiflorum	Panic à fleurs dichotomes
Panicum capillare	Panic capillaire
Bellis perennis	Pâquerette
Lepidium campestre	Passerage champêtre
Rumex obtusifolius	Patience à feuilles obtuses
Rumex conglomeratus	Patience agglomérée

Noms latins	Noms communs
Rumex sanguineus	Patience sanguine
Poa pratensis subsp. angustifolia	Pâturin à feuilles étroites
Poa annua	Pâturin annuel
Poa trivialis	Pâturin commun
Poa nemoralis	Pâturin des bois
Poa pratensis	Pâturin des prés
Papaver dubium	Pavot douteux
Persicaria amphibia	Persicaire flottante
Pimpinella saxifraga	Petit boucage
Rhinanthus minor	Petit cocriste
Ulmus minor	Petit orme
Centaurium erythraea	Petite centaurée commune
Lemna minor	Petite lentille d'eau
Chaenorhinum minus	Petite linaire
Malva neglecta	Petite mauve
Vinca minor	Petite pervenche
Populus x canadensis	Peuplier du Canada
Populus tremula	Peuplier Tremble
Picris hieracioides	Picride éperviaire
Helminthotheca echioides	Picride fausse Vipérine
Thalictrum flavum	Pigamon jaune
Pilosella officinarum	Piloselle
Poterium sanguisorba	Pimprenelle à fruits réticulés
Pinus nigra subsp. nigra	Pin noir d'Autriche
Taraxacum officinale	Pissenlit
Alisma lanceolatum	Plantain d'eau à feuilles lancéolées
Plantago lanceolata	Plantain lancéolé
Plantago major	Plantain majeur
Plantago media	Plantain moyen
Sedum acre	Poivre de muraille
Polycarpon tetraphyllum	Polycarpon à quatre feuilles
Polygala vulgaris	Polygala commun
Polypodium cambricum	Polypode austral
Solanum lycopersicum	Pomme d'amour
Malus sylvestris	Pommier sauvage
Hypochaeris radicata	Porcelle enracinée
Stuckenia pectinata	Potamot de Suisse
Potamogeton nodosus	Potamot noueux
Potentilla argentea	Potentille argentée
Argentina anserina	Potentille des oies
Potentilla sterilis	Potentille faux fraisier

Noms latins	Noms communs
Potentilla reptans	Potentille rampante
Portulaca oleracea	Pourpier potager
Equisetum arvense	Prêle des champs
Equisetum fluviatile	Prêle des eaux
Equisetum palustre	Prêle des marais
Prenanthes purpurea	Prénanthe pourpre
Primula elatior	Primevère élevée
Prunus avium	Prunier merisier
Pteridium aquilinum	Ptérédion aigle
Pulicaria dysenterica	Pulicaire dysentérique
Phyteuma spicatum	Raiponce en épi
Arrhenatherum elatius subsp. elatius	Ray-grass français
Ranunculus penicillatus	Renoncule à pinceau
Ranunculus acris subsp. friesianus	Renoncule âcre
Ranunculus bulbosus	Renoncule bulbeuse
Ranunculus repens	Renoncule rampante
Ranunculus repens	Renoncule rampante
Fallopia dumetorum	Renouée des haies
Polygonum aviculare	Renouée des oiseaux
Persicaria mitis	Renouée douce
Fallopia convolvulus	Renouée liseron
Persicaria maculosa	Renouée Persicaire
Persicaria hydropiper	Renouée Poivre d'eau
Reseda luteola	Réséda jaunâtre
Reseda lutea	Réséda jaune
Robinia pseudoacacia	Robinier faux-acacia
Rubus rhamnifolius	Ronce
Rubus pruinosis	Ronce à feuilles de Noisetier
Rubus fruticosus	Ronce de Bertram
Rubus silvaticus	Ronce des bois
Rorippa amphibia	Rorippe amphibie
Rorippa sylvestris	Rorippe des forêts
Phragmites australis	Roseau
Rosa corymbifera	Rosier à fleurs en corymbe
Rubus caesius	Rosier bleue
Rosa arvensis	Rosier des champs
Rosa canina	Rosier des chiens
Rosa x nitidula	Rosier luisant
Rosa squarrosa	Rosier rude
Sparganium erectum	Rubanier dressé
Rumex crispus	Rumex crépu

Noms latins	Noms communs
<i>Moehringia trinervia</i>	Sabline à trois nervures
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune
<i>Tragopogon pratensis</i>	Salsifis des prés
<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Sapin de Douglas
<i>Abies alba</i>	Sapin pectiné
<i>Saponaria officinalis</i>	Saponaire officinale
<i>Salix alba</i>	Saule blanc
<i>Salix fragilis</i>	Saule fragile
<i>Salix caprea</i>	Saule marsault
<i>Dioscorea communis</i>	Sceau de Notre Dame
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Sceau de Salomon multiflore
<i>Polygonatum odoratum</i>	Sceau de salomon odorant
<i>Scilla bifolia</i>	Scille à deux feuilles
<i>Eleocharis palustris</i>	Scirpe des marais
<i>Scrophularia auriculata</i>	Scrofulaire aquatique
<i>Scrophularia nodosa</i>	Scrophulaire noueuse
<i>Scutellaria galericulata</i>	Scutellaire casquée
<i>Selinum carvifolia</i>	Sélin à feuilles de carvi
<i>Jacobaea erucifolia</i>	Séneçon à feuilles de Roquette
<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon commun
<i>Senecio ovatus</i>	Séneçon de Fuchs
<i>Senecio sylvaticus</i>	Séneçon des bois
<i>Jacobaea paludosa</i>	Séneçon des marais
<i>Setaria pumila</i>	Sétaire glauque
<i>Setaria italica subsp. viridis</i>	Sétaire verte
<i>Setaria verticillata</i>	Sétaire verticillée
<i>Silaum silaus</i>	Silaüs des prés
<i>Silene vulgaris</i>	Silène enflé
<i>Solidago virgaurea</i>	Solidage verge d'or
<i>Cyperus fuscus</i>	Souchet brun
<i>Spirodela polyrhiza</i>	Spirodèle à plusieurs racines
<i>Stellaria graminea</i>	Stellaire graminée
<i>Stellaria media</i>	Stellaire intermédiaire
<i>Succisa pratensis</i>	Succise des prés
<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir
<i>Symphoricarpos albus</i>	Symphorine à fruits blancs
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie commune
<i>Silene vulgaris subsp. vulgaris</i>	Tapotte
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tilleul à grandes feuilles
<i>Helianthus tuberosus</i>	Topinambour
<i>Torilis arvensis</i>	Torilis des champs

Noms latins	Noms communs
Torilis japonica	Torilis faux-cerfeuil
Trifolium campestre	Trèfle champêtre
Trifolium arvense	Trèfle des champs
Trifolium pratense	Trèfle des prés
Trifolium dubium	Trèfle douteux
Trifolium hybridum var. elegans	Trèfle élégant
Trifolium medium	Trèfle intermédiaire
Trifolium fragiferum	Trèfle Porte-fraises
Trifolium repens	Trèfle rampant
Trifolium striatum	Trèfle strié
Trisetum flavescens	Trisetè commune
Ligustrum vulgare	Troëne
Valeriana officinalis	Valériane officinale
Vallisneria spiralis	Vallisnérie en spirale
Erigeron annuus	Vergerette annuelle
Erigeron sumatrensis	Vergerette de Barcelone
Veronica persica	Véronique de Perse
Veronica arvensis	Véronique des champs
Veronica officinalis	Véronique officinale
Veronica chamaedrys	Véronique petit chêne
Verbena officinalis	Verveine officinale
Vicia cracca	Vesce cracca
Vicia sativa	Vesce cultivée
Vicia sepium	Vesce des haies
Ervilia hirsuta	Vesce hérissée
Vitis vinifera	Vigne cultivée
Parthenocissus inserta	Vigne-vierge commune
Viola reichenbachiana	Violette des bois
Viola hirta	Violette hérissée
Viola odorata	Violette odorante
Viburnum lantana	Viorne mancienne
Viburnum opulus	Viorne obier
Echium vulgare	Vipérine commune
Vulpia myuros	Vulpie queue-de-rat
Alopecurus pratensis	Vulpin des prés
Crataegus rhipidophylla	Aubépine à grand calice
Cornus sanguinea	Cornouiller sanguin
Hedera hibernica	Lierre d'Irlande
Rubus pruinosis	Ronce à feuilles de Noisetier
Ligustrum vulgare	Troëne
Fraxinus excelsior	Frêne élevé

Noms latins	Noms communs
<i>Acer saccharum</i>	Érable à sucre
<i>Ranunculus lanuginosus</i>	Renoncule laineuse
<i>Echinochloa crus-galli</i>	Échinochloé Pied-de-coq
<i>Setaria pumila</i>	Sétaire glauque
<i>Plantago major</i>	Plantain majeur
<i>Lotus tenuis</i>	Lotier à feuilles étroites
<i>Potentilla anglica</i>	Potentille d'Angleterre
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés
<i>Calystegia silvatica</i>	Liseron des bois
<i>Erigeron strigosus</i>	Vergerette maigre
<i>Erigeron sumatrensis</i>	Vergerette de Barcelone
<i>Populus tremula</i>	Peuplier Tremble
<i>Prunus x fruticans</i>	Prunier arbustif
<i>Rubus elegantispinosus</i>	Ronce à épines élégantes
<i>Corylus cornuta</i>	Noisetier à long bec
<i>Pyrus cordata</i>	Poirier à feuilles en cœur
<i>Quercus petraea</i>	Chêne sessile
<i>Acer campestre</i>	Érable champêtre
<i>Daucus carota</i>	Carotte sauvage
<i>Epilobium parviflorum</i>	Épilobe à petites fleurs
<i>Juncus effusus</i>	Jonc épars
<i>Alnus glutinosa</i>	Aulne glutineux
<i>Convolvulus sepium</i>	Liset
<i>Mentha aquatica</i>	Menthe aquatique
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune
<i>Typha ssp.</i>	—
<i>Persicaria maculosa</i>	Renouée persicaire

Liste des espèces d'oiseaux relevées dans la bibliographie et sur le terrain

Noms latins	Noms communs
<i>Egretta garzetta</i>	Aigrette garzette
<i>Lullula arborea</i>	Alouette lulu
<i>Motacilla cinerea</i>	Bergeronnette des ruisseaux
<i>Motacilla alba</i>	Bergeronnette grise
<i>Pernis apivorus</i>	Bondrée apivore
<i>Emberiza citrinella</i>	Bruant jaune
<i>Emberiza calandra</i>	Bruant proyer
<i>Emberiza cirrus</i>	Bruant zizi
<i>Buteo buteo</i>	Buse variable
<i>Anas platyrhynchos</i>	Canard colvert
<i>Aythya ferina</i>	Canard souchet
<i>Carduelis carduelis</i>	Chardonneret élégant
<i>Tringa ochropus</i>	Chevalier cul-blanc
<i>Corvus monedula</i>	Choucas des tours
<i>Strix aluco</i>	Chouette hulotte
<i>Ciconia ciconia</i>	Cigogne blanche
<i>Cisticola juncidis</i>	Cisticole des joncs
<i>Corvus corone</i>	Corbeau freux
<i>Corvus frugilegus</i>	Corneille noire
<i>Numenius arquata</i>	Courlis cendré
<i>Cygnus olor</i>	Cygne tuberculé
<i>Tyto alba</i>	Effraie des clochers
<i>Accipiter nisus</i>	Épervier d'Europe
<i>Sturnus vulgaris</i>	Étourneau sansonnet
<i>Phasianus colchicus</i>	Faisan de Colchide
<i>Falco tinnunculus</i>	Faucon crécerelle
<i>Sylvia atricapilla</i>	Fauvette à tête noire
<i>Sylvia borin</i>	Fauvette des jardins
<i>Sylvia communis</i>	Fauvette grisette
<i>Fulica atra</i>	Foulque macroule
<i>Aythya fuligula</i>	Fuligule milouin
<i>Garrulus glandarius</i>	Geai des chênes
<i>Muscicapa striata</i>	Gobemouche gris
<i>Larus fuscus</i>	Goéland brun
<i>Larus michahellis</i>	Goéland michahellis
<i>Ardea alba</i>	Grande Aigrette
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Grèbe castagneux
<i>Podiceps cristatus</i>	Grèbe huppé
<i>Certhia brachydactyla</i>	Grimpereau des jardins
<i>Turdus viscivorus</i>	Grive draine

Noms latins	Noms communs
Turdus philomelos	Grive musicienne
Coccothraustes coccothraustes	Grosbec casse-noyaux
Merops apiaster	Guêpier d'Europe
Ardea cinerea	Héron cendré
Bubulcus ibis	Héron garde-boeufs
Ardea purpurea	Héron pourpré
Asio otus	Hibou moyen-duc
Delichon urbicum	Hirondelle de fenêtre
Hirundo rustica	Hirondelle rustique
Upupa epops	Huppe fasciée
Hippolais polyglotta	Hypolaïs polyglotte
Linaria cannabina	Linotte mélodieuse
Oriolus oriolus	Loriot d'Europe
Tachymarptis melba	Martinet à ventre blanc
Apus apus	Martinet noir
Alcedo atthis	Martin-pêcheur d'Europe
Turdus merula	Merle noir
Aegithalos caudatus	Mésange à longue queue
Cyanistes caeruleus	Mésange bleue
Parus major	Mésange charbonnière
Periparus ater	Mésange noire
Poecile palustris	Mésange paludicole
Milvus migrans	Milan noir
Milvus milvus	Milan royal
Passer domesticus	Moineau domestique
Passer montanus	Moineau friquet
Chroicocephalus ridibundus	Mouette rieuse
Burhinus oedicnemus	Oedicnème criard
Charadrius dubius	Petit Gravelot
Dendrocopos major	Pic épeiche
Dendrocopos minor	Pic épeichette
Dryocopus martius	Pic noir
Picus viridis	Pic vert
Pica pica	Pie bavarde
Columba livia	Pigeon biset
Columba oenas	Pigeon colombin
Columba palumbus	Pigeon ramier
Fringilla coelebs	Pinson des arbres
Fringilla montifringilla	Pinson du Nord
Anthus pratensis	Pipit farlouse
Anthus spinoletta	Pipit spioncelle

Noms latins	Noms communs
<i>Phylloscopus collybita</i>	Pouillot véloce
<i>Gallinula chloropus</i>	Poule d'eau
<i>Regulus regulus</i>	Roitelet huppé
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Rossignol philomèle
<i>Erithacus rubecula</i>	Rougegorge familier
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Rougequeue à front blanc
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Rougequeue noir
<i>Serinus serinus</i>	Serin cini
<i>Sitta europaea</i>	Sittelle torchepot
<i>Acanthis flammea</i>	Sizerin flammé
<i>Saxicola rubicola</i>	Tarier pâtre
<i>Spinus spinus</i>	Tarin des aulnes
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Troglodyte mignon
<i>Vanellus vanellus</i>	Vanneau huppé
<i>Chloris chloris</i>	Verdier d'Europe

Liste des espèces de reptiles relevées dans la bibliographie

Noms latins	Noms communs
<i>Zamenis longissimus</i>	Couleuvre d'Esculape
<i>Podarcis muralis</i>	Lézard des murailles
<i>Hierophis viridiflavus</i>	Couleuvre verte et jaune

Liste des espèces d'amphibiens relevées dans la bibliographie et sur le terrain (surlignée en bleu)

Noms latins	Noms communs
<i>Salamandra salamandra</i>	Salamandre tachetée
<i>Bufo bufo</i>	Crapaud commun
<i>Pelophylax kl. esculentus</i>	Grenouille verte

Liste des espèces de mammifères (hors chiroptères) relevées dans la bibliographie et sur le terrain (surlignée en bleu)

Noms latins	Noms communs
<i>Sciurus vulgaris</i>	Ecureuil roux
<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Lapin de garenne
<i>Vulpes vulpes</i>	Renard roux
<i>Sus scrofa</i>	Sanglier
<i>Capreolus capreolus</i>	Chevreuil
<i>Lepus europaeus</i>	Lièvre d'Europe
<i>Eliomys quercinus</i>	Lérot

Noms latins	Noms communs
Meles meles	Blaireau
Rattus norvegicus	Rat surmulot

Liste des espèces de chiroptères relevées dans la bibliographie

Noms latins	Noms communs
Myotis nattereri	Murin de Natterer
Rhinolophus hipposideros	Petit rhinolophe
Barbastella barbastellus	Barbastelle d'Europe
Eptesicus serotinus	Sérotine commune
Nyctalus leisleri	Noctule de Leisler
Nyctalus noctula	Noctule commune
Pipistrellus pipistrellus	Pipistrelle commune
Pipistrellus kuhlii	Pipistrelle de Kuhl
Plecotus auritus	Oreillard roux
Myotis daubentonii	Murin de Daubenton

Liste des espèces d'insectes relevées dans la bibliographie

Noms latins	Noms communs
Aeshna cyanea	Aesche bleue
Aglais io	Paon-du-jour
Aglais urticae	Petite Tortue
Anthocharis cardamines	Aurore
Aporia crataegi	Gazé
Araschnia levana	Carte géographique
Aricia agestis	Collier-de-corail
Boloria dia	Petite Violette
Brenthis daphne	Nacré de la ronce
Cacyreus marshalli	Argus des pélargoniums
Callophrys rubi	Thécla de la ronce
Calopteryx virgo	Caloptéryx vierge
Carcharodus alceae	Hespérie de l'alcée
Carterocephalus palaemon	Hespérie du brome
Celastrina argiolus	Azuré des nerpruns
Chorthippus dorsatus	Criquet verte-échine
Coenagrion scitulum	Agrion mignon
Coenonympha arcania	Céphale
Coenonympha pamphilus	Fadet commun
Conocephalus fuscus	Conocéphale bigarré
Cupido minimus	Argus frêle

Noms latins	Noms communs
Euchorthippus declivus	Criquet des mouillères
Eumodicogryllus bordigalensis	Grillon bordelais
Glaucopteryx alexis	Azuré des cytises
Gomphocerippus biguttulus	Criquet mélodieux, Oedipode bimouchetée
Gomphocerippus brunneus	Criquet duettiste, Sauteriot
Gonepteryx rhamni	Citron
Hamearis lucina	Lucine
Iphiclides podalirius	Flambé
Ischnura elegans	Agrion élégant
Lasiommata megera	Mégère
Leptidea sinapis	Piérade du lotier
Leptophyes punctatissima	Leptophye ponctuée
Lycaena phlaeas	Cuivré commun
Lysandra bellargus	Azuré bleu-céleste
Maniola jurtina	Myrtil
Melanargia galathea	Demi-deuil
Melitaea athalia	Mélitée du mélampyre
Melitaea cinxia	Mélitée du plantain
Melitaea didyma	Mélitée orangée
Melitaea phoebe	Mélitée des centaurees
Ochlodes sylvanus	Sylvaine
Oecanthus pellucens	Grillon d'Italie
Orthetrum albistylum	Orthétrum à stylets blancs
Orthetrum cancellatum	Orthétrum réticulé
Papilio machaon	Machaon
Pararge aegeria	Tircis
Pholidoptera griseoptera	Decticelle cendrée
Pieris brassicae	Piérade du chou
Pieris napi	Piérade du navet
Pieris rapae	Piérade de la rave
Platycnemis pennipes	Agrion à larges pattes
Plebejus argyrognomon	Azuré des coronilles
Polyommatus icarus	Azuré de la bugrane
Pyrrhosoma nymphula	Petite nymphe au corps de feu
Sympecma fusca	Leste brun
Tettigonia viridissima	Grande Sauterelle verte
Thymelicus lineola	Hespérie du dactyle
Thymelicus sylvestris	Hespérie de la houque
Vanessa atalanta	Vulcain
Vanessa cardui	Belle Dame
Zygaena filipendulae	Zygène du Pied-de-Poule

Noms latins	Noms communs
Zygaena loti	Zygène du Lotier
Zygaena transalpina	Zygène transalpine
Zygaena trifolii	Zygène Des près