

Rapport de Prédiagnostic écologique bibliographique :

Département de la Dordogne – Commune de Saint-Cernin-de-Labarde



Source : Aedes Énergies, 2026

Sommaire

I.	INTRODUCTION.....	5
II.	METHODOLOGIE	6
1.	DELIMITATION DES AIRES D'ETUDES.....	6
2.	BIBLIOGRAPHIE CONSULTEE.....	7
III.	CONTEXTE ECOLOGIQUE.....	8
1.	ZONAGES DU PATRIMOINE NATUREL : ZONES NATURELLES D'INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE 9	
2.	PROTECTIONS REGLEMENTAIRES : SCHEMA DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE)	11
3.	PROTECTION AU TITRE D'UN TEXTE INTERNATIONAL : RESERVE DE BIOSPHERE.....	13
4.	OUTIL DE CONSERVATION DES ESPECES : PLAN NATIONAUX D'ACTION.....	15
5.	SYNTHESE DES ENJEUX DU CONTEXTE ECOLOGIQUE	16
IV.	RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LA COMMUNE DE SAINT-CERNIN-DE-LABARDE (24).....	18
1.	FLORE.....	18
1.	<i>Flore à enjeu de conservation</i>	<i>18</i>
2.	<i>Espèces exotiques envahissantes</i>	<i>22</i>
2.	FAUNE.....	23
1.	<i>Synthèse.....</i>	<i>23</i>
2.	<i>Méthodologie de hiérarchisation des enjeux</i>	<i>23</i>
3.	<i>Avifaune</i>	<i>24</i>
4.	<i>Mammifères (hors chiroptères).....</i>	<i>27</i>
5.	<i>Chiroptères</i>	<i>28</i>
6.	<i>Herpétofaune</i>	<i>29</i>
7.	<i>Entomofaune.....</i>	<i>29</i>
V.	SYNTHESE DES ENJEUX	31
VI.	CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS	32

Glossaire

AEE : Aire d'étude élargie

AEI : Aire d'étude immédiate

AER : Aire d'étude rapprochée

APPB : Arrêté préfectoral de protection de biotope

CNB : Conservatoire botanique national

ENS : Espace naturel sensible

INPN : Inventaire national du patrimoine naturel

LPO : Ligue pour la protection des oiseaux

LR : Liste rouge

PLU(i) : Plan local d'urbanisme (intercommunal)

PN : Protection nationale

PNA : Plan national d'action

PNR : Parc naturel régional

SRCE : Schéma régional de cohérence écologique

ZIP : Zone d'implantation potentielle

ZPS : Zone de protection spéciale

ZSC : Zone spéciale de conservation

Cortège d'espèce : Ensemble d'espèces partageant des caractéristiques écologiques ou biologiques communes dans un habitat donné.

Directive Habitat-Faune-Flore : La directive de l'Union européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de la faune et de la flore sauvages. Elle a pour but de maintenir ou de rétablir la biodiversité de l'Union européenne. Pour cela elle vise à recenser, protéger et gérer les sites d'intérêt communautaire présents sur le territoire de l'Union.

Directive Oiseaux : La directive 2009/147/CE (appelée plus généralement directive Oiseaux) du 30 novembre 2009 est une directive prise par l'Union européenne afin de promouvoir la protection et la gestion des populations d'espèces d'oiseaux sauvages du territoire européen. Elle s'applique aux oiseaux eux-mêmes ainsi qu'à leurs nids, leurs œufs et leurs habitats.

Messicole : Plantes « habitant les moissons ». Ces plantes vivent de façon stricte ou préférentielle dans les cultures.

Plans nationaux d'action en faveur des espèces menacées (PNA) : Outils stratégiques opérationnels qui visent à assurer la conservation ou le rétablissement dans un état de conservation favorable d'espèces de faune et de flore sauvages menacées ou faisant l'objet d'un intérêt particulier

Tables des Figures

Figure 1 : Zone d'implantation potentielle du site d'étude (terÉCO, 2026)	5
Figure 2 : Localisation des aires d'études du projet (terÉCO, 2026).....	6
Figure 3 : Localisation des ZNIEFF comprises dans l'AEE (terÉCO, 2026)	10
Figure 4 : Trame verte et bleue au sein de l'AER (terÉCO, 2026)	11
Figure 5 : Trame verte et bleue au sein de l'AEE (terÉCO, 2026).....	12
Figure 6 : Localisation de la Réserve de Biosphère comprise dans l'AEE (terÉCO, 2026)	14
Figure 7 : Zonages liés au patrimoine naturel dans les aires d'études de la zone de projet de Saint-Cernin-de-Labarde (terÉCO, 2026).....	17

Table des Tableaux

Tableau 1 : Localisation du projet par rapport aux périmètres de protection et aux zones d'inventaires déterminants (terÉCO, 2026)	8
Tableau 2 : Caractéristiques des ZNIEFF de l'AEE (terÉCO, 2026).....	9
Tableau 3 : Caractéristiques de la Réserve de biosphère présente au sein de l'AEE (terÉCO, 2026)	13
Tableau 4 : Synthèse du contexte écologique (terÉCO, 2026)	16
Tableau 5 : Espèces floristiques à enjeux présentes dans la maille 5x5 km dans laquelle se trouve le projet de Saint-Cernin-de-Labarde (terÉCO, 2026)	19
Tableau 6 : Espèces exotiques envahissantes présentes dans la maille 5x5 km dans laquelle se trouve le projet de Saint-Cernin-de-Labarde	22
Tableau 7 : Tableau de synthèse de la bibliographie relative à la faune (terÉCO, 2026).....	23
Tableau 8 : Résultats de hiérarchisation des enjeux de conservation (source : Note de résultats – référentiels et bio-évaluation – Hiérarchisation des enjeux de conservation régionaux, Observatoire de la Faune Sauvage de Nouvelle-Aquitaine (FAUNA).....	24
Tableau 9 : Avifaune à enjeux à minima notable présents dans la commune d'étude selon la bibliographie (terÉCO, 2026)	25
Tableau 10 : Mammifères à enjeux de conservation à minima notable présents dans la commune de projet selon la bibliographie (terÉCO, 2026).....	27
Tableau 11 : Chiroptères à enjeux de conservation à minima notable présents dans la commune de projet selon la bibliographie (terÉCO, 2026).....	28
Tableau 12 : Entomofaune à enjeux de conservation à minima notable présente dans la commune de projet selon la bibliographie (terÉCO, 2026).....	29
Tableau 13 : Synthèse des enjeux sur site (terÉCO, 2026)	31

I. Introduction

La société française Aedes Énergies, spécialisée dans la production d'énergie issue de ressources renouvelables, souhaite implanter une centrale agrivoltaïque, sur la commune de Saint-Cernin-de-Labarde, au sein du département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine. Le projet concerne 14 ha, dont 11 ha de prairies, 1,8 ha de protéagineux et 1,2 ha d'autres céréales, selon le RPG 2024. Des boisements sont présents à l'ouest, au nord et au centre de la ZIP. De plus, un cours d'eau se trouve à proximité directe (entre 75m et 150m) de l'ouest de la ZIP.




Figure 1 : Zone d'implantation potentielle du site d'étude (terÉCO, 2026)

L'objectif du présent rapport est d'évaluer et de présenter les sensibilités écologiques de la zone de projet. L'étude mettra en avant les enjeux liés au patrimoine naturel, en s'appuyant sur les données bibliographiques disponibles.

II. Méthodologie

1. Délimitation des aires d'études

Dans le cadre du Prédiagnostic écologique bibliographique, les trois aires d'études suivantes ont été définies :

- **L'aire d'étude immédiate** : correspondant à l'emprise du projet, d'une surface de 14 ha, et susceptible de percevoir les éventuelles nuisances directes liées au projet en phase de travaux et/ou phase d'exploitation pour les espèces peu mobiles.
- **L'aire d'étude rapprochée** : correspondant à une zone de 100 m autour de l'emprise du projet, et susceptible de percevoir les éventuelles nuisances liées au projet en phase de travaux et/ou phase d'exploitation pour les espèces mobiles.
- **L'aire d'étude éloignée** : correspondant à une zone tampon de 5 km autour de l'aire d'étude immédiate. Cette zone correspond à l'environnement écologique dans lequel s'insère le projet. C'est l'aire d'étude permettant une analyse globale du contexte écologique de l'aire d'étude immédiate.




Figure 2 : Localisation des aires d'études du projet (terÉCO, 2026)

2. Bibliographie consultée

La bibliographie disponible a été consultée afin de collecter les informations existantes sur la zone de projet et ses alentours. Les bases de données suivantes ont été consultées :

- LPO Nouvelle-Aquitaine ;
- Faune Nouvelle-Aquitaine ;
- Portail FAUNA ;
- Observatoire de la Biodiversité Végétale (OBV) Nouvelle-Aquitaine ;
- Observatoire National des Mammifères - SFEPM
- INPN
- UICN ;
- Listes rouges nationales et régionales ;
- Listes rouges de la flore vasculaire de France métropolitaine (2019) ;
- Listes rouges de la flore vasculaire départementale et régionale ;
- Annexe II de la Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ;
- Arrêté du 20 janvier 1982 et Arrêté modificatif du 23 mai 2013 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national ;
- Arrêtés relatifs aux listes des espèces végétales protégées dans le département et en région complétant la liste nationale ;
- Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Flore vasculaire de France métropolitaine : premiers résultats pour 1 000 espèces, sous-espèces et variétés - UICN France, FCBN & MNHN (2012) ;
- Liste rouge des orchidées de France métropolitaine – Chapitre Orchidées de France métropolitaine - UICN France, FCBN et MNHN & SFO (2009) ;

III. Contexte écologique

Le contexte écologique permet d'identifier les périmètres écologiques aux abords de la zone de projet. L'aire d'étude éloignée, c'est-à-dire un rayon de 5 kilomètres autour de la zone de projet, a été considérée pour présenter ce contexte écologique.

Le tableau suivant présente la localisation du site vis-à-vis des zonages du patrimoine naturel et des périmètres de protection réglementaire, contractuelle et foncière.

Tableau 1 : Localisation du projet par rapport aux périmètres de protection et aux zones d'inventaires déterminants (terÉCO, 2026)

Type	Statut	Présence au sein de l'AEE	Présence au sein de l'AER
Zonage du patrimoine naturel	Zones Natura 2000	NON	NON
	Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)	OUI	NON
Protections réglementaires	Arrêté de Protection de Biotope (APPB)	NON	NON
	Réserve Naturelle Nationale	NON	NON
	Réserve Naturelle Régionale	NON	NON
	Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)	OUI	OUI
Protections contractuelles	Parc Naturel National	NON	NON
	Parc Naturel Régional (PNR)	NON	NON
Protections par la maîtrise foncière	Espaces Naturels Sensibles (ENS)	NON	NON
	Terrain acquis par un conservatoire d'Espaces Naturels	NON	NON
Protection au titre d'un texte international	Réserve de biosphère	OUI	OUI
	Zones humides d'importance internationale (RAMSAR)	NON	NON
Outil de conservation des espèces	Plan Nationaux d'action (PNA)	OUI	OUI

Seuls les zonages, protections et outils de conservations recensés dans les aires d'études (jusqu'à 5km autour de la ZIP) du projet sont décrits et analysés dans les parties suivantes.

1. Zonages du patrimoine naturel : Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

Selon l'INPN, l'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d'identifier et de décrire, sur l'ensemble du territoire national, des secteurs de plus grand intérêt écologique abritant la biodiversité patrimoniale dans la perspective de créer un socle de connaissance, mais aussi un outil d'aide à la décision (protection de l'espace, aménagement du territoire).

On distingue deux types de ZNIEFF :

- ZNIEFF de type I : espaces homogènes écologiquement, définis par la présence d'espèces, d'associations d'espèces ou d'habitats rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel régional. Ce sont les zones les plus remarquables du territoire (INPN) ;
- ZNIEFF de type II : espaces qui intègrent des ensembles naturels fonctionnels et paysagers, possédant une cohésion élevée et plus riche que les milieux alentour (INPN)

Le tableau ci-après liste les ZNIEFF présentes au sein de l'aire d'étude éloignée :

Tableau 2 : Caractéristiques des ZNIEFF de l'AEE (terÉCO, 2026)

Identifiant	Intitulé	Surface (ha)	Distance à l'AEI	Contrainte règlementaire
ZNIEFF de type I				
720014244	FRICHE CALCAIRE DE LA BECQUERIE	14,3	1,4 km	Non
720014240	FRICHE CALCAIRE DU CALCADOU	14,9	2 km	
720014246	FRICHE CALCAIRE DE SAINT-CYPRIEN	22,4	2,2 km	
720014289	COTEAU CALCAIRE DU PETIT COUSSIÈRE	20,2	3,8 km	
720012872	COTEAUX ET PLATEAU DU MAYNE CHEVALIER	67,3	4,2 km	
720014247	FRICHE CALCAIRE DE L'ANCIENNE CARRIÈRE DE PLAISANCE	2,6	4,7 km	
ZNIEFF de type II				
720012946	PLATEAU CEREALIER D'ISSIGEAC	2827	2 km	Non

Au total, six ZNIEFF de type I et une ZNIEFF de type II sont présentes dans l'Aire d'étude éloignée. Cependant le site d'étude n'est compris dans aucun de ces zonages. Les deux ZNIEFF de type I les plus proches (720014244, 720014240) sont des coteaux calcaires comprenant de nombreuses espèces floristiques rares (Aspérule à l'esquinancie, Cardoncelle molle, Stéhéline douteuse) qui ne devraient pas être impactées par le projet au vu de la différence d'habitat avec le site d'étude.

La ZNIEFF de type II comprise dans l'AEE (720012946) est composée d'ensembles de cultures, de prairies et de coteaux comprenant de nombreuses espèces avifaunistiques (Outarde canepetière, Pie-grièche écorcheur, Busard cendré) et floristiques (Stéhéline douteuse) d'intérêt. Une attention particulière à la présence de ces espèces sur le ZIP devra être faite.



Figure 3 : Localisation des ZNIEFF comprises dans l'AEE (terÉCO, 2026)

2. Protections réglementaires : Schéma de Cohérence Ecologique (SRCE)

Conformément à l'article L371-3 du Code de l'environnement, le Schéma Régional de Cohérence Écologique constitue un document cadre régional qui vise à l'identification et à la mise en œuvre de la Trame verte et bleue régionale (DREAL Nouvelle-Aquitaine).

Il comporte les informations suivantes :

- La présentation des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la restauration des continuités écologiques
- Un volet identifiant l'ensemble des composantes de la Trame Verte et Bleue
- Une cartographie de la Trame Verte et Bleue à l'échelle de la région
- Les mesures contractuelles mobilisables pour la préservation ou la restauration des continuités écologiques
- Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques.

Les cartographies des trames vertes et bleues de l'Aire d'étude éloignée sont présentées ci-dessous :




Figure 4 : Trame verte et bleue au sein de l'AER (terÉCO, 2026)




Figure 5 : Trame verte et bleue au sein de l'AEE (terÉCO, 2026)

La zone de projet est intégralement incluse dans un corridor boisé. Ainsi, la zone d'étude est susceptible d'abriter de façon ponctuelle ou permanente des espèces inféodées aux milieux boisés. De plus, un cours d'eau de faible envergure se trouve à proximité directe (entre 75m et 150m) de l'ouest de la ZIP.

L'AEE est également majoritairement concernée par un corridor boisé.

3. Protection au titre d'un texte international : Réserve de Biosphère

Une Réserve de biosphère est un lieu d'apprentissage et d'expérimentation du développement durable. C'est aussi un territoire engagé pour la préservation des paysages, des écosystèmes et des espèces, dans lequel un équilibre entre la nature et les activités humaines souhaite être conservé. Ainsi, chaque réserve favorise des solutions conciliant la conservation de la biodiversité et son utilisation durable (Réserve de Biosphère du Bassin de la Dordogne).

Les réserves de biosphère se composent de trois zones interdépendantes :

- **L'aire centrale** comprend une zone strictement protégée qui contribue à la conservation des paysages, des écosystèmes, des espèces et de la variation génétique.
- **La zone tampon** entoure ou jouxte l'aire centrale et est utilisée pour des activités compatibles avec des pratiques écologiquement viables susceptibles de renforcer la recherche, le suivi, la formation et l'éducation scientifiques.
- **L'aire de transition** est la zone où les communautés encouragent des activités économiques et humaines durables des points de vue socioculturel et écologique.

Le tableau ci-après liste la réserve de biosphère présente au sein de l'aire d'étude éloignée :

Tableau 3 : Caractéristiques de la Réserve de biosphère présente au sein de l'AEE (terÉCO, 2026)

Identifiant	Intitulé	Surface (km ²)	Distance à l'AEI	Probable contrainte réglementaire
FR6500011	Bassin de la Dordogne (Zone de transition)	23 870	0 km	Non

L'aire d'étude est comprise dans la zone de transition de la réserve de biosphère du Bassin de la Dordogne. Cette zone « se veut le lieu privilégié de mise en œuvre et de valorisation des projets de développement durable et de sensibilisation à l'environnement » (Biosphère Bassin de la Dordogne). Le projet agrivoltaïque de Saint-Cernin-de-Labarde étant un projet d'énergie renouvelable s'inscrit donc dans cette volonté de développement durable. Une attention particulière à la préservation de la biodiversité riche de cette zone devra néanmoins être faite.




Figure 6 : Localisation de la Réserve de Biosphère comprise dans l'AEE (terÉCO, 2026)

4. Outil de conservation des Espèces : Plan Nationaux d'action

Les plans nationaux d'actions (PNA) sont des outils stratégiques et opérationnels visant à renforcer la conservation ou le rétablissement d'espèces de faune et de flore sauvages menacées.

La DREAL Nouvelle-Aquitaine est fortement engagée dans la protection des espèces menacées à travers la coordination de plusieurs PNA. Sur l'ensemble des PNA lancés par le ministère, la DREAL Nouvelle-Aquitaine coordonne au niveau national 9 PNA faune concernant : le Gypaète barbu, le Vautour percnoptère, le Vautour fauve, l'Outarde canepetière, le Vison d'Europe, la Loutre d'Europe, le Lézard ocellé et le Calotriton des Pyrénées et la Grenouille des Pyrénées. De plus, la région coordonne 1 PNA Flore/ milieux naturels concernant : la végétation des bords d'étangs arrière-littoraux des Landes et de la Gironde (DREAL Nouvelle-Aquitaine).

De plus, 35 espèces ou groupes d'espèces à PNA peuvent être rencontrés sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine coordonnés par d'autres DREAL concernant (DREAL Nouvelle-Aquitaine) :

- Les amphibiens et reptiles (Sonneur à ventre jaune et Cistude d'Europe),
- Les insectes (papillons de jour, pollinisateurs et odonates)
- Les mammifères (Loup gris, Ours brun, chiroptères, Desman des Pyrénées et Bouquetin ibérique)
- Les oiseaux (Milan Royal)
- Les mollusques (Mulette perlière)
- Flore et habitats naturels (Aster des Pyrénées, plantes messicoles)

Ainsi, bien que les PNA n'aient pas de portée réglementaire, les espèces dont ils font l'objet sont protégées au niveau national, il conviendra donc d'avoir une attention particulière vis-à-vis des espèces de ces PNA.

5. Synthèse des enjeux du contexte écologique

Ci-dessous est présenté le tableau récapitulant les enjeux issus de la bibliographie du contexte écologique.

Tableau 4 : Synthèse du contexte écologique (terÉCO, 2026)

Identifiant	Intitulé	Distance par rapport au site d'étude
ZNIEFF de type I		
720014244	FRICHE CALCAIRE DE LA BECQUERIE	1,4 km
720014240	FRICHE CALCAIRE DU CALCADOU	2 km
720014246	FRICHE CALCAIRE DE SAINT-CYPRIEN	2,2 km
720014289	COTEAU CALCAIRE DU PETIT COUSSIÈRE	3,8 km
720012872	COTEAUX ET PLATEAU DU MAYNE CHEVALIER	4,2 km
720014247	FRICHE CALCAIRE DE L'ANCIENNE CARRIÈRE DE PLAISANCE	4,7 km
ZNIEFF de type II		
720012946	PLATEAU CEREALIER D'ISSIGEAC	2 km
Réserve de Biosphère		
FR6500011	Bassin de la Dordogne (Zone de transition)	0 km

La zone d'étude est comprise au sein de la réserve de Biosphère du bassin de la Dordogne. Les communes de cette zone valorisent des projets de développement durable et de sensibilisation à l'environnement dont font partie les projets d'énergies renouvelables. Une attention particulière à la préservation de la biodiversité riche de cette zone devra néanmoins être faite.

Le site d'étude est également compris au sein de plans nationaux d'actions qui n'ont pas de portée réglementaire. Néanmoins, les espèces dont ils font l'objet sont protégées au niveau national. De plus, la proximité de l'AEI avec la ZNIEFF de type II : (720012946) « PLATEAU CEREALIER D'ISSIGEAC » implique que l'avifaune déterminante de cette ZNIEFF peut utiliser le site d'étude si celle-ci comporte un intérêt pour ces espèces.

La carte suivante récapitule l'ensemble des zonages aux alentours de la zone de projet.




Figure 7 : Zonages liés au patrimoine naturel dans les aires d'études de la zone de projet de Saint-Cernin-de-Labarde (terÉCO, 2026)

IV. Recherche bibliographique sur la commune de Saint-Cernin-de-Labarde (24)

1. Flore

La bibliographie a été réalisée à partir de la base de données de l'Observatoire de la Biodiversité Végétale (OBV) de Nouvelle-Aquitaine, sur la maille 5x5km dans laquelle se trouve le projet de Saint-Cernin-de-Labarde.

1. Flore à enjeu de conservation

D'après la bibliographie, au moins 575 espèces, sont présentes dans la maille 5x5 km dans laquelle se trouve le projet. La liste de ces espèces est disponible en annexe.

Selon la bibliographie disponible, parmi ces 575 espèces, 70 espèces végétales comportent un enjeu de conservation notable. Il conviendra donc de vérifier la présence de ces espèces et d'éviter toute destruction en phase de travaux comme en phase d'exploitation en adaptant le plan de masse du projet. Parmi ces espèces, 2 taxons sensibles ont été identifiés. Cependant, la base de données de l'OBV ne contient ni le genre ni le nom vernaculaire de ces espèces. En effet, il s'agit de données « dont la consultation ou la communication [est susceptible de porter atteinte] à la protection de l'environnement auquel elles se rapportent », conformément à l'article L124-4 (I, alinéa 2°) du Code de l'environnement.

La liste des espèces floristiques à enjeux est présentée dans le tableau suivant :

Tableau 5 : Espèces floristiques à enjeux présentes dans la maille 5x5 km dans laquelle se trouve le projet de Saint-Cernin-de-Labarde (terECO, 2026)

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Déterminant ZNIEFF	Plan national	Réglementation	Protection	Messicoles	LR France	LR NA
Ophrys abeille	<i>Ophrys apifera</i>				PD		LC	LC
Ophrys jaune	<i>Ophrys lutea</i>	Oui					LC	LC
Ophrys jaune	<i>Ophrys lutea subsp. lutea</i>	Oui					LC	LC
Ophrys cilié	<i>Ophrys speculum</i>	Oui			PN1		EN	NA
/	Taxon sensible	Oui			PN1		NT	VU
Cytise de France	<i>Cytisus lotoides</i>	Oui					LC	LC
Avoine des prés	<i>Helictochloa pratensis subsp. pratensis</i>	Oui					LC	LC
Thésium divariqué	<i>Thesium humifusum subsp. divaricatum</i>	Oui					LC	NT
Lin droit	<i>Linum strictum</i>	Oui					LC	LC
Cardoncelle molle	<i>Carthamus mitissimus</i>	Oui					LC	LC
Anthéricum à fleurs de lis	<i>Anthericum liliago</i>	Oui					LC	LC
Corroyère à feuilles de myrte	<i>Coriaria myrtifolia</i>	Oui					LC	LC
Stéhéline	<i>Staezelina dubia</i>	Oui					LC	LC
Buplèvre en faux	<i>Bupleurum falcatum</i>	Oui					LC	LC
Lâche	<i>Lactuca perennis</i>	Oui			PR		LC	LC
Gesse à graines sphériques	<i>Lathyrus sphaericus</i>	Oui					LC	LC
Orchis à fleurs lâches	<i>Anacamptis laxiflora</i>	Oui		INT_INTRO			LC	NT
Ophioglosse commun	<i>Ophioglossum vulgatum</i>	Oui					LC	NT
Euphorbe verruqueuse	<i>Euphorbia verrucosa</i>						VU	LC
Seslérie bleuâtre	<i>Sesleria caerulea subsp. caerulea</i>	Oui					NA	LC

Orphys miroir	<i>Ophrys speculum subsp. speculum</i>	Oui			PN1		EN	NA
Orobanche blanche	<i>Orobanche alba</i>	Oui					LC	LC
/	Taxon sensible	Oui		REG_PREF	PR		LC	NT
Orpin à feuilles épaisses	<i>Sedum dasyphyllum</i>	Oui					LC	LC
Raiponce orbiculaire	<i>Phyteuma orbiculare</i>	Oui					LC	LC
Raiponce délicate	<i>Phyteuma orbiculare subsp. tenerum</i>	Oui					LC	LC
Linomyris à feuilles de Lin	<i>Galatella linomyris</i>	Oui					LC	NT
Scille à deux feuilles	<i>Scilla bifolia</i>	Oui			PR		LC	LC
Laîche basse	<i>Carex humilis</i>	Oui			PD		LC	LC
Vulpin des champs	<i>Alopecurus myosuroides</i>					MESS_REG	LC	LC
Glaïeul d'Italie	<i>Gladiolus italicus</i>	Oui	PNA_MESS		PR	MESS_REG	LC	LC
Avoine des prés	<i>Helictochloa pratensis</i>	Oui					LC	LC
Orchis casqué	<i>Orchis militaris</i>	Oui					LC	LC
Tulipe des bois	<i>Tulipa sylvestris subsp. sylvestris</i>	Oui	PNA_MESS		PN1	MESS_REG	LC	NT
Zannichellie des marais	<i>Zannichellia palustris</i>	Oui			PR		LC	NT
Anthémis fétide	<i>Anthemis cotula</i>	Oui	PNA_MESS			MESS_REG	LC	LC
Anthéricum ramifié	<i>Anthericum ramosum</i>	Oui					LC	LC
Folle-avoine	<i>Avena fatua</i>					MESS_REG	LC	LC
Berle à feuilles étroites	<i>Berula erecta</i>	Oui					LC	LC
Brachypode à deux épis	<i>Brachypodium distachyon</i>	Oui					LC	LC
Brome des champs	<i>Bromus arvensis</i>		PNA_MESS			MESS_REG	LC	LC
Laîche brune	<i>Carex nigra</i>	Oui					LC	LC
Cirse tubéreux	<i>Cirsium tuberosum</i>	Oui					LC	NT
Liseron de Biscaye	<i>Convolvulus cantabrica</i>	Oui					LC	LC
Scirpe à nombreuses tiges	<i>Eleocharis multicaulis</i>	Oui					LC	LC

Euphorbe à cornes en faucille	<i>Euphorbia falcata</i>					MESS_REG	LC	LC
Géranium rouge sang	<i>Geranium sanguineum</i>	Oui					LC	LC
Ibérus amer	<i>Iberis amara</i>	Oui			PR		LC	LC
Jonc à tiges aplaties	<i>Juncus compressus</i>	Oui					LC	LC
Grande Lavande	<i>Lavandula latifolia</i>	Oui					LC	LC
Miroir-de-Vénus	<i>Legousia speculum-veneris</i>		PNA_MESS			MESS_REG	LC	LC
Chèvrefeuille d'Étrurie	<i>Lonicera etrusca</i>	Oui					LC	LC
Mouron bleu	<i>Lysimachia foemina</i>					MESS_REG	LC	LC
Luzerne raide	<i>Medicago rigidula</i>	Oui					LC	VU
Luzerne cultivée	<i>Medicago sativa</i>						LC	CR*
Grande Naïade	<i>Najas marina</i>				PR		LC	LC
Bugrane striée	<i>Ononis striata</i>	Oui					LC	LC
Coquelicot	<i>Papaver rhoeas</i>					MESS_REG	LC	LC
Scille d'automne	<i>Prospero autumnale</i>	Oui					LC	LC
Pulmonaire semblable	<i>Pulmonaria affinis</i>	Oui					LC	LC
Peigne-de-Vénus	<i>Scandix pecten-veneris</i>		PNA_MESS			MESS_REG	LC	LC
Épiaire annuelle	<i>Stachys annua</i>		PNA_MESS			MESS_REG	LC	LC
Épiaire d'Allemagne	<i>Stachys germanica</i>	Oui					LC	NT
Germandrée d'eau	<i>Teucrium scordium</i>	Oui			PR		LC	NT
Doucette dentée	<i>Valerianella dentata</i>		PNA_MESS			MESS_REG	LC	LC
Véronique faux mouron	<i>Veronica anagalloides</i>	Oui					LC	DD
Pensée des champs	<i>Viola arvensis</i>		PNA_MESS			MESS_REG	LC	LC
Bruyère vagabonde	<i>Erica vagans</i>	Oui					LC	LC
Fumeterre à petites fleurs	<i>Fumaria parviflora</i>	Oui	PNA_MESS			MESS_REG	LC	NT
Chausse-trappe des blés	<i>Ranunculus arvensis</i>	Oui	PNA_MESS			MESS_REG	LC	LC

LR : Liste Rouge, **PR** : Taxon protégé au niveau régional, **INT_INTRO** : Interdiction d'introduction en Europe, **REG_PREF** : Réglementation préfectorale **PN1** : Taxon protégé au niveau national : Article 1, **MESS-REG** : Messicole régionale, **DD** : Données insuffisantes **NA** : Non applicable **LC** : Préoccupation mineure, **NT** : Quasi menacé, **VU** : Vulnérable, **EN** : En Danger, **CR*** : Espèce probablement disparue

2. Espèces exotiques envahissantes

Certaines plantes exotiques introduites accidentellement ou volontairement ont d'excellentes capacités d'adaptation et s'installent souvent sur les zones dégradées et les terres remaniées. Ces espèces provoquent des déséquilibres importants lors de la reconquête végétale des zones dégradées et remaniées, mais aussi parfois au sein d'écosystèmes naturels. Ils sont une des principales causes de déclin de la biodiversité, avec la destruction des habitats naturels, c'est pourquoi il est important d'inventorier ces espèces avant et après la phase travaux des projets afin d'éviter toute propagation de ces espèces.

Parmi les espèces inventoriées dans la bibliographie, 15 Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) étaient présentes dans la maille 5x5 km dans laquelle se trouve la zone de projet entre août 2000 et août 2021 (OBV). Elles sont présentées dans le tableau suivant :

Tableau 6 : Espèces exotiques envahissantes présentes dans la maille 5x5 km dans laquelle se trouve le projet de Saint-Cernin-de-Labarde

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Impact
Amarante hybride	<i>Amaranthus hybridus</i>	Impact modéré
Amarante réfléchie	<i>Amaranthus retroflexus</i>	Impact modéré
Ambroisie commune	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	Impact majeur
Crépis saint	<i>Crepis sancta</i>	Impact modéré
Vergerette du Canada	<i>Erigeron canadensis</i>	Impact majeur
Cytise à grappes	<i>Laburnum anagyroides</i>	Impact modéré
Luzerne cultivée	<i>Medicago sativa subsp. sativa</i>	Impact modéré
Mélilot blanc	<i>Melilotus albus</i>	Impact modéré
Vigne-vierge	<i>Parthenocissus inserta</i>	Impact majeur
Laurier-cerise	<i>Prunus laurocerasus</i>	Impact majeur
Robinier faux acacia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Impact majeur
Romarin officinal	<i>Salvia rosmarinus</i>	Impact modéré
Sporobole tenace	<i>Sporobolus indicus</i>	Impact majeur
Véronique de Perse	<i>Veronica persica</i>	Impact modéré
Viorne-tin	<i>Viburnum tinus</i>	Impact majeur

Ces 15 espèces devront donc faire l'objet d'une attention particulière, notamment lors de la phase travaux, afin d'éviter toute dispersion accidentelle de ces espèces. Un plan de gestion des espèces envahissantes en phase chantier et exploitation pourra être mis en place.

2. Faune

1. Synthèse

La bibliographie a été réalisée à partir de la base de données de l'Observatoire FAUNA sur la commune de Saint-Cernin-de-Labarde. Toutes les espèces recensées sont disponibles en annexe.

Le tableau suivant synthétise le résultat de la recherche bibliographique :

Tableau 7 : Tableau de synthèse de la bibliographie relative à la faune (terÉCO, 2026)

Taxon	Nombre d'espèces total	Nombre d'espèces à enjeu Notable*	Nombre d'espèces à enjeu fort ou très fort*	Plan national d'action
Avifaune	57	11	14	Espèce PNA : 1
Mammifères (hors chiroptères)	3	1	0	/
Chiroptères	2	2	0	Espèces prioritaires France : 1
Reptiles	0	/	/	/
Amphibiens	0	/	/	/
Entomofaune (lépidoptère, odonate, coléoptère, orthoptère, hémiptère, mante)	28	8	0	/
Total	90	22	14	Espèces PNA : 1 Espèces prioritaires : 1

**selon la hiérarchisation des enjeux de conservation de l'observatoire FAUNA*

2. Méthodologie de hiérarchisation des enjeux

La DREAL Nouvelle-Aquitaine a « identifié le besoin de disposer d'une méthodologie harmonisée permettant de suivre et d'évaluer les enjeux régionaux de conservation de la faune sauvage, protégée ou non. L'identification des enjeux de conservation offre un cadre scientifique indiquant le niveau de vigilance à porter à chaque espèce. » (Observatoire FAUNA). Ainsi, la DREAL a sollicité l'Observatoire FAUNA pour coordonner le projet de hiérarchisation des enjeux de conservation des taxons de la faune de Nouvelle-Aquitaine avec l'appui d'un collectif d'expertise.

Le principe général de cette hiérarchisation est décrit selon l'équation suivante (d'après Barneix et Gigot, 2013) :

*Enjeux de conservation **bruts** = indice de **responsabilité** * indice de **vulnérabilité***

Avec : indice de vulnérabilité = vulnérabilité établie à partir des listes rouges UICN. Le croisement de l'évaluation nationale et régionale donne un indice allant de 1 (vulnérabilité faible) à 5 (vulnérabilité alarmante).

Avec indice de responsabilité = part de la distribution d'une espèce en région par rapport à sa distribution au niveau national

Les enjeux de conservation bruts sont par la suite analysés par expertise pour chaque espèce et peuvent être ajustés en fonction de paramètres additionnels, permettant de considérer des éléments non pris en compte par la méthode (PNA, habitat menacé, isolat, particularité génétique, etc.). **Cette méthodologie concerne uniquement la faune.**

Les différents niveaux de conservation possibles sont :

Tableau 8 : Résultats de hiérarchisation des enjeux de conservation (source : Note de résultats – référentiels et bio-évaluation – Hiérarchisation des enjeux de conservation régionaux, Observatoire de la Faune Sauvage de Nouvelle-Aquitaine (FAUNA))

Hiérarchisation des enjeux de conservation	Référence du rapport à venir : PERRODIN J. & BARNEIX. M. (en prep.) : Hiérarchisation des enjeux de conservation de la faune sauvage de Nouvelle-Aquitaine.
Majeur	Espèce présentant des niveaux de menace et de responsabilité régionale majeurs.
Très fort	Espèce présentant des niveaux de menace ou de responsabilité régionale très élevés.
Fort	Espèce présentant des niveaux de menace et/ou de responsabilité régionale élevés.
Notable	Espèce présentant des niveaux de menace ou de responsabilité régionale notables.
Modéré	Espèce présentant des niveaux de menace et de responsabilité régionale modérés
Autre	Espèce considérée en déficit de connaissance, pour laquelle le niveau d'enjeu de conservation ne peut être évalué à ce jour. Il est donc possible que les espèces concernées par ce statut présentent des enjeux de conservation majeurs comme modérés.
Non applicable	Espèce pour laquelle le niveau d'enjeu de conservation n'est pas applicable (espèce introduite, occasionnelle, accidentelle, disparue...).

3. Avifaune

D'après l'Observatoire FAUNA, 57 espèces d'oiseaux sont présentes sur la commune de Saint-Cernin-de-Labarde. Sur ces 57 espèces, 11 espèces ont un enjeu de conservation notable et 14 espèces ont un enjeu de conservation fort à très fort, d'après la hiérarchisation des enjeux de conservation de l'Observatoire FAUNA.

Le tableau suivant recense les différentes espèces d'oiseaux à enjeux à minima notable recensés dans la bibliographie :

Tableau 9 : Avifaune à enjeux à minima notable présents dans la commune d'étude selon la bibliographie (terÉCO, 2026)

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Directive Oiseaux	Protection nationale	Convention Bern/Bonn	Rareté régionale	LR France (2016)	Enjeux de conservation local (FAUNA)
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	Annexe II-2	/	BERN (Ann. III)	Très commune	NT	Fort
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	Annexe I	A.3	BERN (Ann. III)	Très commune	LC	Notable
Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>	/	A.3	BERN (Ann. III)	Commune	NT	Notable
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>	/	A.3	BERN (Ann. III)	Très commune	LC	Notable
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>	Annexe I	A.3	BERN (Ann. III), BONN (Ann. II)	Assez commune	NT	Très fort
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	Annexe I	A.3	BERN (Ann. III), BONN (Ann. II)	Très commune	LC	Très fort
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>	Annexe II-2	/	BERN (Ann. III), BONN (Ann. II)	Très commune	LC	Notable
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	/	A.3	BERN (Ann. II)	Très commune	VU	Fort
Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>	/	A.3	BERN (Ann. II)	Très commune	LC	Notable
Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>	/	A.3	BERN (Ann. III)	Commune	VU	Fort
Elanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i>	Annexe I	A.3	BERN (Ann. III), BONN (Ann. II)	Assez commune	VU	Fort
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	/	A.3	BERN (Ann. II), BONN (Ann. II)	Très commune	NT	Notable
Grande aigrette	<i>Ardea alba</i>	Annexe I	A.3	BERN (Ann. II), BONN (AEWA, Ann. II)	Rare	NT	Fort
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>	/	A.3	BERN (Ann. II)	Commune	LC	Notable

Mésange noire	<i>Periparus ater</i>	/	A.3	BERN (Ann. II)	Assez commune	LC	Notable
Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>	/	A.3	BERN (Ann. II)	Très commune	LC	Notable
Milan Royal	<i>Milvus milvus</i>	Annexe I	A.3	BERN (Ann. III), BONN (Ann. II)	Assez commune	VU	Très fort
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	/	A.3	/	Très commune	LC	Notable
Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i>	Annexe I	A.3	BERN (Ann. II), BONN (Ann. II)	Commune	LC	Très fort
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	Annexe I	A.3	BERN (Ann. II)	Très commune	NT	Fort
Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>	/	A.3	BERN (Ann. II), BONN (Ann. II)	Peu commune	VU	Fort
Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>	/	A.3	BERN (Ann. II), BONN (Ann. II)	Très commune	NA	Fort
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	Annexe II-2	/	BERN (Ann. III), BONN (Ann. II)	Très commune	VU	Fort
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	/	A.3	BERN (Ann. II), BONN (Ann. II)	Peu commune	NT	Notable
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	Annexe II-2	/	BERN (Ann. III), BONN (AEWA, Ann. II)	Très commune	NT	Très fort

A.3 : Article 3 ; **AEWA** : Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie, **Ann.** : Annexe, **NE** : Non évalué ; **DD** : Données insuffisantes ; **LC** : Non concerné ; **NT** : Quasi menacé ; **VU** : Vulnérable ; **EN** : En danger ; **CR** : En danger critique

57 espèces d'oiseaux ont été recensées dans la bibliographie, dont 25 espèces à enjeu de conservation à minima notable. On retrouve des espèces liées aux milieux agricoles, mais aussi des espèces des strates arbustives et buissonnantes, des espèces liées aux milieux humides ou des espèces inféodées aux boisements. L'enjeu de conservation local de ces espèces étant à minima notable d'après l'observatoire FAUNA, l'utilisation du site d'étude par ces espèces devra être vérifiée et, le cas échéant, leur habitat (ronciers, arbustes, boisement, etc.) devra être sauvegardé et évité. Parmi les espèces à enjeux locaux de conservation très forte, le Busard-Saint-Martin (*Circus cyaneus*), le Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*) et le Mila royal (*Milvus milvus*) sont susceptibles d'utiliser ponctuellement les zones agricoles du site d'étude.

Le Milan Royal (*Milvus milvus*) fait également partie d'un Plan National d'Action (PNA). Cette espèce est typique des zones agricoles de polyculture et élevage. Elle fréquente des milieux composés de zones ouvertes pour son alimentation et de zones boisées pour la nidification. Le site d'étude peut présenter un intérêt pour cette espèce, il conviendra donc de vérifier sa présence et préserver son habitat.

De plus, il sera nécessaire d'adapter les périodes de travaux au calendrier écologique pour éviter toute la période de reproduction et de nidification des oiseaux. Les haies et arbres isolés devront également être conservés.

4. Mammifères (hors chiroptères)

D'après la bibliographie disponible, trois espèces de mammifères (hors chiroptères) sont présentes sur la commune du projet. Parmi ces espèces, une présente un enjeu de conservation notable d'après la hiérarchisation des enjeux de conservation de l'Observatoire FAUNA. Il s'agit du Lapin de garenne (*Oryctolagus cuniculus*). Les autres espèces sont des espèces communes du territoire français.

Le tableau suivant recense les différentes espèces de mammifères à enjeux recensés dans la bibliographie :

Tableau 10 : Mammifères à enjeux de conservation à minima notable présents dans la commune de projet selon la bibliographie (terÉCO, 2026)

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Directive Habitat	Protection nationale	LR France (2017)	Enjeux de conservation local (FAUNA)
Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	/	/	LC	Notable

A.2 : Article 2 ; **NE** : Non évalué ; **DD** : Données insuffisantes ; **LC** : Non concerné ; **NT** : Quasi menacé ; **VU** : Vulnérable ; **EN** : En danger ; **CR** : En danger critique

La zone d'étude étant incluse dans un corridor boisé, il est probable que d'autres espèces de mammifère communes utilisant les milieux forestiers et agricoles soient présentes dans l'AER, telles que le Chevreuil, le Renard roux, le Sanglier, etc. Trois espèces de mammifères ont été recensées sur la commune de projet d'après la bibliographie, dont une ayant de conservation notable.

5. Chiroptères

D'après la bibliographie disponible, deux espèces de chiroptère ayant un enjeu de conservation local notable sont présentes sur la commune du projet. De plus, une de ces espèces fait partie des espèces prioritaires en France. Il s'agit de la Pipistrelle commune (*Pipistrellus pipistrellus*).

Le tableau suivant recense les différentes espèces de chiroptères à enjeux recensés dans la bibliographie :

Tableau 11 : Chiroptères à enjeux de conservation à minima notable présents dans la commune de projet selon la bibliographie (terÉCO, 2026)

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Directive Habitat	Protection nationale	LR France (2017)	LR Aquitaine (2019)	Enjeux de conservation local (FAUNA)
Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Annexe IV	A.2	NT	LC	Notable
Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Annexe IV	A.2	LC	LC	Notable

A.2 : Article 2 ; **NE** : Non évalué ; **DD** : Données insuffisantes ; **LC** : Non concerné ; **NT** : Quasi menacé ; **VU** : Vulnérable ; **EN** : En danger ; **CR** : En danger critique

En termes de potentialité d'accueil, l'aire d'étude immédiate peut présenter un intérêt spécifique au vu du nombre important de boisements présents autour et au centre de la ZIP, ainsi que des bâtiments agricoles présents proches de celle-ci. La zone d'étude peut également représenter un habitat de chasse et de transit favorable pour certaines espèces des milieux ouverts, comme les Noctules et Pipistrelles. Il conviendra donc de vérifier la présence d'arbre mort, cavité à pic, décollement d'écorces, bâtiments abandonnés, etc., pouvant servir de gîte aux chiroptères.

Deux espèces de chiroptères présentant des enjeux de conservation notables ont été relevées sur la commune de projet d'après la bibliographie disponible, dont une espèce étant une espèce prioritaire en France. La zone d'étude peut présenter un habitat de chasse ou de gîte favorable pour les chiroptères.

Par précaution, il sera nécessaire d'éviter toute pollution lumineuse lors de la mise en place du projet (tant en phase de travaux que d'exploitation) et de proscrire tout éclairage nocturne. De plus, les gîtes favorables aux chiroptères présents au sein de l'AER devront être conservés.

6. Herpétofaune

D'après la bibliographie disponible, aucune espèce d'amphibien et de reptile n'est présente sur la commune de projet. Cependant, la base de données peut être lacunaire.

Aucun point d'eau ne semble être présent sur la ZIP. Cependant, un cours d'eau de faible envergure est présent à moins de 100m de la ZIP. De plus, les lisières arborées présentes à proximité et sur le site d'étude, peuvent présenter un gîte terrestre pour certaines espèces d'amphibien. Les lisières ensoleillées et tas de bois sont également des milieux appréciés de plusieurs espèces de reptiles. Ces milieux devront donc être au maximum évité.

7. Entomofaune

D'après la bibliographie disponible, 28 espèces d'insectes (lépidoptère, odonate, coléoptère, orthoptère, hémiptère, mante) sont présentes dans la commune de projet. Parmi ces espèces, 8 présentent des enjeux de conservation notable d'après la hiérarchisation des enjeux de conservation de l'Observatoire FAUNA. Il s'agit exclusivement de lépidoptères et d'odonates qui ne font pas partie d'un PNA. Les autres espèces de lépidoptères, odonates, coléoptères et orthoptères, sont des espèces communes en France et ne présentent pas d'enjeux particuliers. Le tableau suivant recense les différentes espèces de l'entomofaune à enjeux recensées dans la bibliographie :

Tableau 12 : Entomofaune à enjeux de conservation à minima notable présente dans la commune de projet selon la bibliographie (terÉCO, 2026)

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Protections	LR France (2016)	LR Aquitaine (2016)	Enjeux de conservation local (FAUNA)
Agrion de Vander Linden	<i>Erythromma lindenii</i>	/	LC	LC	Notable
Agrion porte-coupe	<i>Enallagma cyathigerum</i>	/	LC	LC	Notable
Crocothémis écarlate	<i>Crocothemis erythraea</i>	/	LC	LC	Notable
Damier de la Succise	<i>Euphydryas aurinia</i>	A.3 DHFF (Ann.II)	LC	LC	Notable
Gomphe à crochets	<i>Onychogomphus uncatus</i>		LC	LC	Notable
Naïade au corps vert	<i>Erythromma viridulum</i>	/	LC	LC	Notable
Thécla du Prunier	<i>Satyrrium pruni</i>	/	LC	DD	Notable
Trithémis annelé	<i>Trithemis annulata</i>	/	LC	LC	Notable

A.3 : Article 3 (protection nationale), **DHFF (Ann.II)** : Annexe II de la Directive Faune Flore Habitat, **NE** : Non évalué ; **DD** : Données insuffisantes ; **LC** : Non concerné ; **NT** : Quasi menacé ; **VU** : Vulnérable ; **EN** : En danger ; **CR** : En danger critique

Parmi les espèces présentes sur la commune de projet d'après la bibliographie, 6 odonates et 2 lépidoptères présentent un enjeu local de conservation notable. Ces odonates fréquentent les milieux aquatiques (rivières, mares, étangs, bras morts) riches en végétations. Les 2 lépidoptères à enjeu relevés dans la bibliographie affectionnent les fourrés de prunelier ainsi que les prairies et tourbières.

Les milieux semi-ouverts et les fossés de l'aire d'étude sont potentiellement favorables à l'accueil des lépidoptères, odonates et autres insectes. Il conviendra de vérifier la potentielle utilisation du site d'étude par les espèces à enjeux de conservation locale notable.

V. Synthèse des enjeux

Le tableau ci-dessous synthétise les enjeux du site sur la base des recherches bibliographiques :

Tableau 13 : Synthèse des enjeux sur site (terÉCO, 2026)

Thématique	Synthèse
Contexte écologique	Zone d'étude comprise dans la zone de transition d'une réserve de Biosphère. ZNIEFF de type II avec richesse avifaunistique à 2km de l'AEI. Zone d'étude comprise dans un corridor boisé.
Flore	70 espèces à enjeux et 15 EEE sont présentes sur la maille 5x5 km du projet.
Avifaune	25 espèces à enjeux de conservation minimum notable, de différents cortèges sont présents dans la commune de Saint-Cernin-de-Labarde d'après la bibliographie ainsi que 1 espèce faisant partie d'un PNA : Le Milan royal (<i>Milvus milvus</i>).
Mammifères	Une espèce à enjeux de conservation notable est présente sur la commune de projet selon la bibliographie.
Chiroptères	Deux espèces de chiroptères à enjeux de conservation notable sont présentes à Saint-Cernin-de-Labarde selon la bibliographie. La Pipistrelle commune (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>) fait partie des espèces prioritaires en France.
Herpétofaune	Aucune espèce de reptile ou d'amphibien n'est présente sur la commune de Saint-Cernin-de-Labarde d'après la bibliographie.
Entomofaune	8 espèces d'odonates et lépidoptères à enjeux de conservation notable sont présentes sur la commune de projet d'après la bibliographie.

VI. Conclusion et recommandations

La zone d'étude concerne 14 ha de parcelles agricoles sur la commune de Saint-Cernin-de-Labarde, dans le département de la Dordogne. Des boisements sont présents à l'ouest, au nord et au centre de la ZIP. De plus, un cours d'eau se trouve à proximité directe (entre 75m et 150m) de l'ouest de la ZIP.

La zone d'étude est comprise au sein de la réserve de Biosphère du bassin de la Dordogne. Les communes de cette zone valorisent des projets de développement durable et de sensibilisation à l'environnement dont font partie les projets d'énergies renouvelables. Une attention particulière à la préservation de la biodiversité riche de cette zone devra néanmoins être faite. De plus, la proximité de l'AEI avec la ZNIEFF de type II : (720012946) « PLATEAU CEREALIER D'ISSIGEAC » implique que l'avifaune déterminante de cette ZNIEFF peut utiliser le site d'étude si celle-ci comporte un intérêt pour ces espèces. Une attention particulière à l'utilisation du site par ces espèces devra être apportée.

Les principaux enjeux relevés sur la commune de Saint-Cernin-de-Labarde dans la bibliographie résident en la potentielle présence d'espèces protégées et à enjeux de conservation locale, notable, fort et très fort pour certains des taxons inventoriés. De plus, une espèce ciblée par un PNA (Milan royal) et une espèce de chiroptère prioritaire (Pipistrelle commune) ont été recensées sur la commune de projet d'après la bibliographie. La conservation des habitats permettant à la faune de réaliser au moins une partie de ses cycles biologiques est nécessaire. Ainsi, les haies, fourrés/roncières, les bandes enherbées, arbres isolés et arbres morts, fossés, empierrement, lisières de forêt et zones humides devront être préservés.

De plus, afin de préserver la trame noire et les chiroptères potentiellement présents dans la zone d'étude, il est préconisé d'éviter toute pollution lumineuse lors de la mise en place du projet (tant en phase de travaux que d'exploitation) et d'éviter tout éclairage nocturne.

Concernant la flore, une attention particulière devra être portée aux espèces présentant un enjeu de conservation notable recensée dans la bibliographie, dont il faudra éviter toute destruction en phase de travaux comme en phase d'exploitation en adaptant le plan de masse du projet. De plus, le site d'étude peut potentiellement présenter des Espèces exotiques envahissantes (EEE), susceptibles de se développer à la suite de travaux ou d'être propagées par les engins de chantier vers des secteurs aujourd'hui dépourvus de ces espèces. Il est donc préconisé de maintenir une vigilance particulière sur la zone d'emprise des travaux, car les zones remaniées et les zones de dépôt peuvent entraîner la prolifération des espèces végétales invasives. Un plan de gestion des espèces envahissantes en phase chantier pourra être réalisé.

Un calendrier écologique en phase travaux ou pendant la gestion du site pourra être mise en place avec un écologue. Ce calendrier devra tenir compte des périodes sensibles pour la faune

(printemps/été pour la floraison, la reproduction et l'élevage des jeunes ainsi que l'hiver pour l'hivernage et l'hibernation) et la flore (mars à septembre) pour éviter la destruction d'espèce et l'altération d'habitats. Les mois fortement défavorables aux travaux sont les mois de mars à septembre. Les travaux les plus impactant (terrassament, battage des pieux) devront donc être effectués dans la mesure du possible entre octobre et février. De plus, il conviendra de réduire à une vitesse maximale de 20 km/h les vitesses de déplacement des engins de chantier afin de limiter les collisions avec la microfaune. Le chantier pourra également bénéficier d'un suivi écologique par écologue.

Annexes

Annexe 1 : Liste des espèces de floristiques présentes dans la maille 5x5 où se trouve le projet d'après la bibliographie (Source : OBV Nouvelle-Aquitaine)

Nom scientifique	Groupe végétal
<i>Acer campestre</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Acer monspessulanum</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Aegonychon purpureocaeruleum</i> (L.) Holub, 1973	Plantes à fleurs
<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Agrimonia eupatoria</i> subsp. <i>eupatoria</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796	Plantes à fleurs
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913	Plantes à fleurs
<i>Allium oleraceum</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Allium polyanthum</i> Schult. & Schult.f., 1830	Plantes à fleurs
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds., 1762	Plantes à fleurs
<i>Althaea officinalis</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Amaranthus hybridus</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Amaranthus retroflexus</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Plantes à fleurs
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817	Plantes à fleurs
<i>Anacamptis pyramidalis</i> var. <i>pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817	Plantes à fleurs
<i>Anacamptis x alata</i> (Fleury) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr., 2007	Plantes à fleurs
<i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski, 1934	Plantes à fleurs
<i>Anthemis cotula</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Anthericum liliago</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Anthericum ramosum</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814	Plantes à fleurs
<i>Aphanes arvensis</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842	Plantes à fleurs
<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800	Plantes à fleurs
<i>Arenaria leptoclados</i> (Rchb.) Guss., 1844	Plantes à fleurs
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	Plantes à fleurs
<i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	Plantes à fleurs
<i>Arum italicum</i> Mill., 1768	Plantes à fleurs
<i>Asparagus officinalis</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Asperula cynanchica</i> f. <i>cynanchica</i> L., 1753 [déprécié]	Plantes à fleurs
<i>Asperula cynanchica</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Asplenium ceterach</i> L., 1753	Fougères et affines

<i>Atriplex patula</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link, 1799	Plantes à fleurs
<i>Avena fatua</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Avena sterilis</i> L., 1762	Plantes à fleurs
<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort., 1868	Plantes à fleurs
<i>Barbarea vulgaris</i> W.T.Aiton, 1812	Plantes à fleurs
<i>Bellis perennis</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville, 1893	Plantes à fleurs
<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	Plantes à fleurs
<i>Blackstonia perfoliata</i> subsp. <i>perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	Plantes à fleurs
<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng, 1936	Plantes à fleurs
<i>Brachypodium distachyon</i> (L.) P.Beauv., 1812	Plantes à fleurs
<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult., 1817	Plantes à fleurs
<i>Brachypodium rupestre</i> subsp. <i>rupestre</i> (Host) Roem. & Schult., 1817	Plantes à fleurs
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	Plantes à fleurs
<i>Brassica napus</i> var. <i>napus</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Briza media</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Briza media</i> subsp. <i>media</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr., 1869	Plantes à fleurs
<i>Bromopsis erecta</i> subsp. <i>erecta</i> (Huds.) Fourr., 1869	Plantes à fleurs
<i>Bromus arvensis</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Bromus commutatus</i> Schrad., 1806	Plantes à fleurs
<i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Bromus</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Bromus racemosus</i> L., 1762	Plantes à fleurs
<i>Bryonia dioica</i> Jacq., 1774	Plantes à fleurs
<i>Bupleurum falcatum</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth, 1788	Plantes à fleurs
<i>Callitriche platycarpa</i> Kütz., 1842	Plantes à fleurs
<i>Campanula glomerata</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Campanula rotundifolia</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Cardamine flexuosa</i> With., 1796	Plantes à fleurs
<i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Cardamine hirsuta</i> L., 1754 [déprécié]	Plantes à fleurs
<i>Cardamine pratensis</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Carduus nutans</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789	Plantes à fleurs
<i>Carex distans</i> L., 1759	Plantes à fleurs
<i>Carex divulsa</i> Stokes, 1787	Plantes à fleurs
<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	Plantes à fleurs
<i>Carex flacca</i> subsp. <i>flacca</i> Schreb., 1771	Plantes à fleurs
<i>Carex halleriana</i> Asso, 1779	Plantes à fleurs
<i>Carex hirta</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Carex humilis</i> Leyss., 1758	Plantes à fleurs
<i>Carex</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778	Plantes à fleurs

Carex otrubae Podp., 1922	Plantes à fleurs
Carex panicea L., 1753	Plantes à fleurs
Carex pendula Huds., 1762	Plantes à fleurs
Carex remota L., 1755	Plantes à fleurs
Carex riparia Curtis, 1783	Plantes à fleurs
Carex spicata Huds., 1762	Plantes à fleurs
Carex tomentosa L., 1767	Plantes à fleurs
Carlina vulgaris L., 1753	Plantes à fleurs
Carpinus betulus L., 1753	Plantes à fleurs
Carthamus lanatus L., 1753	Plantes à fleurs
Carthamus mitissimus L., 1753	Plantes à fleurs
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953	Plantes à fleurs
Centaurea decipiens Thuill., 1799	Plantes à fleurs
Centaurea jacea L., 1753	Plantes à fleurs
Centaurea L., 1753	Plantes à fleurs
Centaurea scabiosa L., 1753	Plantes à fleurs
Centaurea scabiosa subsp. scabiosa L., 1753	Plantes à fleurs
Centaurium erythraea Rafn, 1800	Plantes à fleurs
Cerastium brachypetalum Pers., 1805	Plantes à fleurs
Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982	Plantes à fleurs
Cerastium glomeratum Thuill., 1799	Plantes à fleurs
Cercis siliquastrum L., 1753	Plantes à fleurs
Cervaria rivini Gaertn., 1788	Plantes à fleurs
Chaenorhinum minus (L.) Lange, 1870	Plantes à fleurs
Chaerophyllum temulum L., 1753	Plantes à fleurs
Chara vulgaris L., 1753	Charophytes
Chara vulgaris var. longibracteata (Kütz.) J.Groves & Bullock-Webster, 1924	Charophytes
Chenopodium album L., 1753	Plantes à fleurs
Cichorium intybus L., 1753	Plantes à fleurs
Cirsium acaulon (L.) Scop., 1769	Plantes à fleurs
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772	Plantes à fleurs
Cirsium dissectum (L.) Hill, 1768	Plantes à fleurs
Cirsium tuberosum (L.) All., 1785	Plantes à fleurs
Clematis vitalba L., 1753	Plantes à fleurs
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze, 1891	Plantes à fleurs
Clinopodium nepeta subsp. sylvaticum (Bromf.) Peruzzi & F.Conti, 2008	Plantes à fleurs
Clinopodium vulgare L., 1753	Plantes à fleurs
Convolvulus arvensis L., 1753	Plantes à fleurs
Convolvulus cantabrica L., 1753	Plantes à fleurs
Convolvulus sepium L., 1753	Plantes à fleurs
Coriaria myrtifolia L., 1753	Plantes à fleurs
Cormus domestica (L.) Spach, 1834	Plantes à fleurs
Cornus sanguinea L., 1753	Plantes à fleurs
Cornus sanguinea subsp. sanguinea L., 1753	Plantes à fleurs
Coronilla minima L., 1756	Plantes à fleurs
Coronilla minima subsp. minima L., 1756	Plantes à fleurs

Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch, 1837	Plantes à fleurs
Corylus avellana L., 1753	Plantes à fleurs
Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825	Plantes à fleurs
Crataegus monogyna Jacq., 1775	Plantes à fleurs
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840	Plantes à fleurs
Crepis sancta (L.) Bornm., 1913	Plantes à fleurs
Crepis setosa Haller f., 1797	Plantes à fleurs
Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell., 1914	Plantes à fleurs
Cruciata laevipes Opiz, 1852	Plantes à fleurs
Cuscuta epithymum (L.) L., 1774	Plantes à fleurs
Cuscuta epithymum subsp. epithymum (L.) L., 1774	Plantes à fleurs
Cuscuta L., 1753	Plantes à fleurs
Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805	Plantes à fleurs
Cynosurus cristatus L., 1753	Plantes à fleurs
Cyperus fuscus L., 1753	Plantes à fleurs
Cytisus lotoides Pourr., 1788	Plantes à fleurs
Dactylis glomerata L., 1753	Plantes à fleurs
Dactylis glomerata subsp. glomerata L., 1753	Plantes à fleurs
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, 1962	Plantes à fleurs
Danthonia decumbens (L.) DC., 1805	Plantes à fleurs
Daucus carota L., 1753	Plantes à fleurs
Daucus carota subsp. carota L., 1753	Plantes à fleurs
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771	Plantes à fleurs
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002	Plantes à fleurs
Dipsacus fullonum L., 1753	Plantes à fleurs
Draba muralis L., 1753	Plantes à fleurs
Draba verna L., 1753	Plantes à fleurs
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812	Plantes à fleurs
Echium vulgare L., 1753	Plantes à fleurs
Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., 1818	Plantes à fleurs
Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen, 1987	Plantes à fleurs
Epilobium hirsutum L., 1753	Plantes à fleurs
Epilobium parviflorum Schreb., 1771	Plantes à fleurs
Epilobium tetragonum L., 1753	Plantes à fleurs
Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769	Plantes à fleurs
Equisetum arvense L., 1753	Fougères et affines
Equisetum telmateia Ehrh., 1783	Fougères et affines
Erica scoparia L., 1753	Plantes à fleurs
Erica scoparia subsp. scoparia L., 1753	Plantes à fleurs
Erica vagans L., 1770	Plantes à fleurs
Erigeron canadensis L., 1753	Plantes à fleurs
Erodium cicutarium subsp. cicutarium (L.) L'Hér., 1789	Plantes à fleurs
Eruca vesicaria (L.) Cav., 1802	Plantes à fleurs
Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852	Plantes à fleurs
Eryngium campestre L., 1753	Plantes à fleurs
Euonymus europaeus L., 1753	Plantes à fleurs

<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Euphorbia exigua</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Euphorbia falcata</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Euphorbia helioscopia</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Euphorbia helioscopia</i> subsp. <i>helioscopia</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Euphorbia illirica</i> Lam., 1788	Plantes à fleurs
<i>Euphorbia platyphyllos</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Euphorbia stricta</i> L., 1759	Plantes à fleurs
<i>Euphorbia verrucosa</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Euphrasia nemorosa</i> (Pers.) Wallr., 1815	Plantes à fleurs
<i>Euphrasia stricta</i> D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809	Plantes à fleurs
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á.Löve, 1970	Plantes à fleurs
<i>Festuca auquieri</i> Kerguélen, 1979	Plantes à fleurs
<i>Festuca lemanii</i> Bastard, 1809	Plantes à fleurs
<i>Festuca rubra</i> subsp. <i>rubra</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Festuca</i> sect. <i>Festuca</i> Hackel, 1882	Plantes à fleurs
<i>Ficaria verna</i> Huds., 1762	Plantes à fleurs
<i>Fragaria vesca</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl, 1804	Plantes à fleurs
<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847	Plantes à fleurs
<i>Fumaria parviflora</i> Lam., 1788	Plantes à fleurs
<i>Galatella inosyris</i> (L.) Rchb.f., 1854	Plantes à fleurs
<i>Galium album</i> Mill., 1768	Plantes à fleurs
<i>Galium aparine</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Galium</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Galium mollugo</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Galium palustre</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Galium pumilum</i> Murray, 1770	Plantes à fleurs
<i>Galium timeroi</i> Jord., 1846	Plantes à fleurs
<i>Galium verum</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv., 1812	Plantes à fleurs
<i>Genista pilosa</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Genista pilosa</i> subsp. <i>pilosa</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Genista tinctoria</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Geranium columbinum</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	Plantes à fleurs
<i>Geranium molle</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Geranium robertianum</i> subsp. <i>robertianum</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Geranium sanguineum</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Geum urbanum</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Gladiolus italicus</i> Mill., 1768	Plantes à fleurs
<i>Gladiolus</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	Plantes à fleurs

Globularia bisnagarica L., 1753	Plantes à fleurs
Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810	Plantes à fleurs
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813	Plantes à fleurs
Hedera helix L., 1753	Plantes à fleurs
Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768	Plantes à fleurs
Helianthemum apenninum subsp. apenninum (L.) Mill., 1768	Plantes à fleurs
Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768	Plantes à fleurs
Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794	Plantes à fleurs
Helichrysum stoechas subsp. stoechas (L.) Moench, 1794	Plantes à fleurs
Helictochloa pratensis (L.) Romero Zarco, 2011	Plantes à fleurs
Helictochloa pratensis subsp. pratensis (L.) Romero Zarco, 2011	Plantes à fleurs
Heliotropium europaeum L., 1753	Plantes à fleurs
Helleborus foetidus L., 1753	Plantes à fleurs
Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973	Plantes à fleurs
Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 1824	Plantes à fleurs
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826	Plantes à fleurs
Hippocrepis comosa L., 1753	Plantes à fleurs
Holcus lanatus L., 1753	Plantes à fleurs
Hordeum secalinum Schreb., 1771	Plantes à fleurs
Hypericum perforatum L., 1753	Plantes à fleurs
Hypericum perforatum subsp. perforatum L., 1753	Plantes à fleurs
Hypericum tetrapterum Fr., 1823	Plantes à fleurs
Hypochaeris radicata L., 1753	Plantes à fleurs
Iberis amara L., 1753	Plantes à fleurs
Inula conyzae (Greiss.) DC., 1836	Plantes à fleurs
Inula montana L., 1753	Plantes à fleurs
Inula salicina L., 1753	Plantes à fleurs
Iris pseudacorus L., 1753	Plantes à fleurs
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801	Plantes à fleurs
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791	Plantes à fleurs
Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris Gaertn., 1791	Plantes à fleurs
Juglans regia L., 1753	Plantes à fleurs
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791	Plantes à fleurs
Juncus articulatus L., 1753	Plantes à fleurs
Juncus compressus Jacq., 1762	Plantes à fleurs
Juncus inflexus L., 1753	Plantes à fleurs
Juncus L., 1753	Plantes à fleurs
Juniperus communis L., 1753	Plantes à fleurs
Juniperus communis var. communis L., 1753	Plantes à fleurs
Kickxia spuria (L.) Dumort., 1827	Plantes à fleurs
Knautia arvensis (L.) Coult., 1828	Plantes à fleurs
Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin, 1808	Plantes à fleurs
Koeleria vallesiana subsp. vallesiana (Honck.) Gaudin, 1808	Plantes à fleurs
Laburnum anagyroides Medik., 1787	Plantes à fleurs
Lactuca perennis L., 1753	Plantes à fleurs
Lactuca serriola L., 1756	Plantes à fleurs

<i>Lactuca virosa</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Lamium purpureum</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Lapsana communis</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Lapsana communis</i> subsp. <i>communis</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Lathyrus aphaca</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Lathyrus hirsutus</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Lathyrus latifolius</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz., 1783	Plantes à fleurs
<i>Lavandula latifolia</i> Medik., 1784	Plantes à fleurs
<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix, 1785	Plantes à fleurs
<i>Lemna minor</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Leontodon hispidus</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Lepidium campestre</i> (L.) W.T.Aiton, 1812	Plantes à fleurs
<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC., 1838	Plantes à fleurs
<i>Leucanthemum</i> Mill., 1754	Plantes à fleurs
<i>Leucanthemum vulgare</i> [groupe]	Plantes à fleurs
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	Plantes à fleurs
<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799	Plantes à fleurs
<i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768	Plantes à fleurs
<i>Linum appressum</i> Caball., 1944	Plantes à fleurs
<i>Linum catharticum</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Linum</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Linum strictum</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Linum tenuifolium</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Linum tenuifolium</i> L., 1754 [déprécié]	Plantes à fleurs
<i>Linum usitatissimum</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Lolium multiflorum</i> Lam., 1779	Plantes à fleurs
<i>Lolium perenne</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Loncomelos pyrenaicum</i> (L.) L.D.Hrouda, 1988	Plantes à fleurs
<i>Loncomelos pyrenaicum</i> subsp. <i>pyrenaicum</i> (L.) L.D.Hrouda, 1988	Plantes à fleurs
<i>Lonicera etrusca</i> Santi, 1795	Plantes à fleurs
<i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Lotus tenuis</i> Waldst. & Kit. ex Willd., 1809	Plantes à fleurs
<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC., 1806	Plantes à fleurs
<i>Luzula multiflora</i> subsp. <i>multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811	Plantes à fleurs
<i>Lychnis flos-cuculi</i> subsp. <i>flos-cuculi</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009	Plantes à fleurs
<i>Lysimachia foemina</i> (Mill.) U.Manns & Anderb., 2009	Plantes à fleurs
<i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	Plantes à fleurs

Malva L., 1753	Plantes à fleurs
Malva setigera K.F.Schimp. & Spenn., 1829	Plantes à fleurs
Medicago arabica (L.) Huds., 1762	Plantes à fleurs
Medicago lupulina L., 1753	Plantes à fleurs
Medicago orbicularis (L.) Bartal., 1776	Plantes à fleurs
Medicago rigidula (L.) All., 1785	Plantes à fleurs
Medicago sativa L., 1753	Plantes à fleurs
Medicago sativa subsp. sativa L., 1753	Plantes à fleurs
Melica uniflora Retz., 1779	Plantes à fleurs
Melilotus albus Medik., 1787	Plantes à fleurs
Melilotus altissimus Thuill., 1799	Plantes à fleurs
Mentha aquatica L., 1753	Plantes à fleurs
Mentha suaveolens Ehrh., 1792	Plantes à fleurs
Mercurialis annua L., 1753	Plantes à fleurs
Mercurialis perennis L., 1753	Plantes à fleurs
Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.Mey., 1973	Plantes à fleurs
Molinia caerulea (L.) Moench, 1794	Plantes à fleurs
Muscari comosum (L.) Mill., 1768	Plantes à fleurs
Muscari neglectum Guss. ex Ten. & Sangiov., 1841	Plantes à fleurs
Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764	Plantes à fleurs
Myosotis L., 1753	Plantes à fleurs
Myosotis ramosissima subsp. ramosissima Rochel, 1814	Plantes à fleurs
Najas marina L., 1753	Plantes à fleurs
Nasturtium officinale R.Br., 1812 [déprécié]	Plantes à fleurs
Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Plantes à fleurs
Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh., 1837	Plantes à fleurs
Nuphar lutea (L.) Sm., 1809	Plantes à fleurs
Odontites Ludw., 1757	Plantes à fleurs
Odontites luteus (L.) Clairv., 1811	Plantes à fleurs
Odontites luteus subsp. luteus (L.) Clairv., 1811	Plantes à fleurs
Oenanthe pimpinelloides L., 1753	Plantes à fleurs
Onobrychis viciifolia Scop., 1772	Plantes à fleurs
Ononis natrix L., 1753	Plantes à fleurs
Ononis pusilla L., 1759	Plantes à fleurs
Ononis spinosa L., 1753	Plantes à fleurs
Ononis spinosa subsp. procurrens (Wallr.) Briq., 1913	Plantes à fleurs
Ononis striata Gouan, 1773	Plantes à fleurs
Ophioglossum vulgatum L., 1753	Fougères et affines
Ophrys apifera Huds., 1762	Plantes à fleurs
Ophrys araneola auct. sensu Flora Gallica	Plantes à fleurs
Ophrys araneola Rchb., 1830 [déprécié]	Plantes à fleurs
Ophrys aranifera Huds., 1778	Plantes à fleurs
Ophrys exaltata Ten., 1819	Plantes à fleurs
Ophrys insectifera L., 1753	Plantes à fleurs
Ophrys L., 1753	Plantes à fleurs
Ophrys lutea Cav., 1793	Plantes à fleurs

Ophrys lutea subsp. lutea Cav., 1793	Plantes à fleurs
Ophrys occidentalis x Ophrys scolopax	Plantes à fleurs
Ophrys scolopax Cav., 1793	Plantes à fleurs
Ophrys scolopax subsp. scolopax Cav., 1793	Plantes à fleurs
Ophrys speculum Link, 1800	Plantes à fleurs
Ophrys speculum subsp. speculum Link, 1800	Plantes à fleurs
Ophrys virescens Philippe, 1859	Plantes à fleurs
Ophrys x nouletii E.G.Camus, 1893	Plantes à fleurs
Orchis anthropophora (L.) All., 1785	Plantes à fleurs
Orchis militaris L., 1753	Plantes à fleurs
Orchis purpurea Huds., 1762	Plantes à fleurs
Origanum vulgare L., 1753	Plantes à fleurs
Origanum vulgare subsp. vulgare L., 1753	Plantes à fleurs
Ornithogalum divergens Boreau, 1847	Plantes à fleurs
Orobanche alba Stephan ex Willd., 1800	Plantes à fleurs
Orobanche amethystea Thuill., 1799	Plantes à fleurs
Orobanche minor Sm., 1797	Plantes à fleurs
Papaver rhoeas L., 1753	Plantes à fleurs
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922	Plantes à fleurs
Pastinaca sativa L., 1753	Plantes à fleurs
Pastinaca sativa subsp. urens (Req. ex Godr.) ?elak., 1875	Plantes à fleurs
Pastinaca sativa var. arvensis Pers., 1805	Plantes à fleurs
Persicaria maculosa Gray, 1821	Plantes à fleurs
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964	Plantes à fleurs
Petrosedum ochroleucum (Chaix) Niederle, 2014	Plantes à fleurs
Petrosedum rupestre (L.) P.V.Heath, 1987	Plantes à fleurs
Phalaris arundinacea L., 1753	Plantes à fleurs
Phleum nodosum L., 1759	Plantes à fleurs
Phleum phleoides (L.) H.Karst., 1880	Plantes à fleurs
Phleum pratense L., 1753	Plantes à fleurs
Phyteuma orbiculare L., 1753	Plantes à fleurs
Phyteuma orbiculare subsp. tenerum (Rich.Schulz) Braun-Blanq., 1933	Plantes à fleurs
Picris hieracioides L., 1753	Plantes à fleurs
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862	Plantes à fleurs
Pimpinella saxifraga L., 1753	Plantes à fleurs
Pimpinella saxifraga subsp. saxifraga L., 1753	Plantes à fleurs
Pinus pinaster Aiton, 1789	Plantes à fleurs
Pinus sylvestris L., 1753	Plantes à fleurs
Plantago lanceolata L., 1753	Plantes à fleurs
Plantago major L., 1753	Plantes à fleurs
Plantago media L., 1753	Plantes à fleurs
Plantago media subsp. media L., 1753	Plantes à fleurs
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., 1828	Plantes à fleurs
Poa bulbosa var. vivipara Koeler, 1802	Plantes à fleurs
Poa pratensis L., 1753	Plantes à fleurs
Poa pratensis subsp. pratensis L., 1753	Plantes à fleurs

<i>Poa trivialis</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Poa trivialis</i> subsp. <i>trivialis</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz, 1837	Plantes à fleurs
<i>Polygala vulgaris</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Polygala vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Polygonum aviculare</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Polygonum aviculare</i> subsp. <i>aviculare</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Polypodium interjectum</i> Shivas, 1961	Fougères et affines
<i>Potamogeton crispus</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke, 1856	Plantes à fleurs
<i>Potentilla verna</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Poterium sanguisorba</i> subsp. <i>balearica</i> (Bourg. ex Nyman) Stace, 2009	Plantes à fleurs
<i>Poterium sanguisorba</i> subsp. <i>sanguisorba</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Primula veris</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Primula veris</i> var. <i>veris</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta, 1982	Plantes à fleurs
<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Turra, 1764	Plantes à fleurs
<i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763	Plantes à fleurs
<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	Plantes à fleurs
<i>Prunus laurocerasus</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Prunus mahaleb</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Fougères et affines
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800	Plantes à fleurs
<i>Pulmonaria affinis</i> Jord., 1854	Plantes à fleurs
<i>Pyrus communis</i> subsp. <i>pyraster</i> (L.) Ehrh., 1780	Plantes à fleurs
<i>Quercus ilex</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Quercus pubescens</i> Willd., 1796	Plantes à fleurs
<i>Quercus robur</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Rabelera holostea</i> (L.) M.T.Sharpley & E.A.Tripp, 2019	Plantes à fleurs
<i>Ranunculus acris</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Ranunculus acris</i> subsp. <i>acris</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Ranunculus arvensis</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix, 1785	Plantes à fleurs
<i>Reseda lutea</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Reseda luteola</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Rhamnus alaternus</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798	Plantes à fleurs
<i>Rosa arvensis</i> Huds., 1762	Plantes à fleurs

Rosa canina L., 1753	Plantes à fleurs
Rosa L., 1753	Plantes à fleurs
Rubia peregrina L., 1753	Plantes à fleurs
Rubus idaeus L., 1753	Plantes à fleurs
Rubus L., 1753	Plantes à fleurs
Rumex acetosa subsp. acetosa L., 1753	Plantes à fleurs
Rumex conglomeratus Murray, 1770	Plantes à fleurs
Rumex crispus L., 1753	Plantes à fleurs
Rumex pulcher L., 1753	Plantes à fleurs
Rumex sanguineus L., 1753	Plantes à fleurs
Ruscus aculeatus L., 1753	Plantes à fleurs
Salix alba L., 1753	Plantes à fleurs
Salix atrocinerea Brot., 1804	Plantes à fleurs
Salvia pratensis L., 1753	Plantes à fleurs
Salvia rosmarinus Spenn., 1835	Plantes à fleurs
Salvia verbenaca L., 1753	Plantes à fleurs
Salvia verticillata L., 1753	Plantes à fleurs
Sambucus ebulus L., 1753	Plantes à fleurs
Sambucus nigra L., 1753	Plantes à fleurs
Samolus valerandi L., 1753	Plantes à fleurs
Scabiosa columbaria L., 1753	Plantes à fleurs
Scandix pecten-veneris L., 1753	Plantes à fleurs
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824	Plantes à fleurs
Schedonorus arundinaceus subsp. arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824	Plantes à fleurs
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812	Plantes à fleurs
Scilla bifolia L., 1753	Plantes à fleurs
Scorzonera humilis L., 1753	Plantes à fleurs
Scrophularia auriculata L., 1753	Plantes à fleurs
Scrophularia nodosa L., 1753	Plantes à fleurs
Sedum album L., 1753	Plantes à fleurs
Sedum dasyphyllum L., 1753	Plantes à fleurs
Sedum rubens L., 1753	Plantes à fleurs
Senecio vulgaris L., 1753	Plantes à fleurs
Senecio vulgaris subsp. vulgaris L., 1753	Plantes à fleurs
Serapias lingua L., 1753	Plantes à fleurs
Seseli montanum L., 1753	Plantes à fleurs
Seseli montanum subsp. montanum L., 1753	Plantes à fleurs
Sesleria caerulea subsp. caerulea (L.) Ard., 1763	Plantes à fleurs
Setaria italica subsp. viridis (L.) Thell., 1912	Plantes à fleurs
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817	Plantes à fleurs
Sherardia arvensis L., 1753	Plantes à fleurs
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., 1915	Plantes à fleurs
Silene latifolia Poir., 1789	Plantes à fleurs
Silene nutans L., 1753	Plantes à fleurs
Silene nutans subsp. nutans L., 1753	Plantes à fleurs
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869	Plantes à fleurs

<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869	Plantes à fleurs
<i>Sinapis arvensis</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Solanum nigrum</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Sonchus arvensis</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769	Plantes à fleurs
<i>Sonchus asper</i> subsp. <i>asper</i> (L.) Hill, 1769	Plantes à fleurs
<i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Sparganium erectum</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Spartium junceum</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br., 1810	Plantes à fleurs
<i>Stachys annua</i> (L.) L., 1763	Plantes à fleurs
<i>Stachys germanica</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Stachys recta</i> L., 1767	Plantes à fleurs
<i>Stachys recta</i> subsp. <i>recta</i> L., 1767	Plantes à fleurs
<i>Staehelina dubia</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789	Plantes à fleurs
<i>Stellaria neglecta</i> Weihe, 1825	Plantes à fleurs
<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	Plantes à fleurs
<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip., 1844	Plantes à fleurs
<i>Taraxacum</i> F.H. Wigg., 1780	Plantes à fleurs
Taxon sensible !	Plantes à fleurs
Taxon sensible !	Plantes à fleurs
<i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Teucrium montanum</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Teucrium scordium</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Thesium humifusum</i> DC., 1815	Plantes à fleurs
<i>Thesium humifusum</i> subsp. <i>divaricatum</i> (Jan ex Mert. & W.D.J.Koch) Bonnier & Layens, 1894	Plantes à fleurs
<i>Thesium humifusum</i> subsp. <i>humifusum</i> DC., 1815	Plantes à fleurs
<i>Thymus</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Thymus longicaulis</i> auct.	Plantes à fleurs
<i>Thymus praecox</i> subsp. <i>britannicus</i> (Ronniger) Holub, 1973	Plantes à fleurs
<i>Tordylium maximum</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link, 1821	Plantes à fleurs
<i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertn., 1788	Plantes à fleurs
<i>Torminalis glaberrima</i> (Gand.) Sennikov & Kurtto, 2017	Plantes à fleurs
<i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Trifolium medium</i> L., 1759	Plantes à fleurs
<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Trifolium repens</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip., 1844	Plantes à fleurs
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	Plantes à fleurs

<i>Tulipa sylvestris</i> subsp. <i>sylvestris</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Typha latifolia</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	Plantes à fleurs
<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Valeriana officinalis</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich, 1776	Plantes à fleurs
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr., 1821	Plantes à fleurs
<i>Verbascum thapsus</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Verbena officinalis</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Veronica anagalloides</i> Guss., 1826	Plantes à fleurs
<i>Veronica arvensis</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Veronica persica</i> Poir., 1808	Plantes à fleurs
<i>Viburnum lantana</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Viburnum tinus</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Vicia angustifolia</i> L., 1759	Plantes à fleurs
<i>Vicia sativa</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Vicia sepium</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik., 1790	Plantes à fleurs
<i>Viola arvensis</i> Murray, 1770	Plantes à fleurs
<i>Viola hirta</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Viola</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Vitis vinifera</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821	Plantes à fleurs
<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel., 1805	Plantes à fleurs
<i>Vulpia unilateralis</i> (L.) Stace, 1978	Plantes à fleurs
<i>Xeranthemum cylindraceum</i> Sm., 1813	Plantes à fleurs
<i>Zannichellia palustris</i> L., 1753	Plantes à fleurs
<i>Ziziphora acinos</i> (L.) Melnikov, 2016	Plantes à fleurs

Annexe 2 : Liste des espèces de la faune présentes sur la commune de Saint-Cernin-de-Labarde d'après la bibliographie (Source : Observatoire FAUNA)

Classr	Nom scientifique	Nom vernaculaire
Aves	<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	Alouette des champs
Aves	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Héron cendré
Aves	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Buse variable
Aves	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Alouette lulu
Aves	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	Bouscarle de Cetti
Aves	<i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758	Bruant proyer
Aves	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard des roseaux
Aves	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	Busard Saint-Martin
Aves	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Epervier d'Europe

Aves	Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)	Caille des blés
Aves	Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)	Chardonneret élégant
Aves	Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758)	Pluvier doré
Aves	Athene noctua (Scopoli, 1769)	Chevêche d'Athéna
Aves	Columba palumbus Linnaeus, 1758	Pigeon ramier
Aves	Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)	Tourterelle turque
Aves	Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810)	Cisticole des joncs
Aves	Elanus caeruleus (Desfontaines, 1789)	élanion blanc
Aves	Strix aluco Linnaeus, 1758	Chouette hulotte
Aves	Falco tinnunculus Linnaeus, 1758	Faucon crécerelle
Aves	Upupa epops Linnaeus, 1758	Huppe fasciée
Aves	Picus viridis Linnaeus, 1758	Pic vert
Aves	Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)	Pic épeiche
Aves	Ardea alba Linnaeus, 1758	Grande Aigrette
Aves	Asio otus (Linnaeus, 1758)	Hibou moyen-duc
Aves	Parus major Linnaeus, 1758	Mésange charbonnière
Aves	Sitta europaea Linnaeus, 1758	Sittelle torchepot
Aves	Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820	Grimpereau des jardins
Aves	Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)	Loriot d'Europe
Aves	Periparus ater (Linnaeus, 1758)	Mésange noire
Aves	Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)	Troglodyte mignon
Aves	Prunella modularis (Linnaeus, 1758)	Accenteur mouchet
Aves	Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)	Rougegorge familier
Aves	Phoenicurus ochruros (S.G. Gmelin, 1774)	Rougequeue noir
Aves	Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)	Rougequeue à front blanc
Aves	Poecile palustris (Linnaeus, 1758)	Mésange nonnette
Aves	Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	Milan royal
Aves	Turdus merula Linnaeus, 1758	Merle noir
Aves	Turdus philomelos C.L. Brehm, 1831	Grive musicienne
Aves	Passer domesticus (Linnaeus, 1758)	Moineau domestique
Aves	Burhinus oedicephalus (Linnaeus, 1758)	Oedicnème criard
Aves	Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)	Fauvette à tête noire
Aves	Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)	Pouillot véloce
Aves	Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)	Mésange à longue queue
Aves	Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)	Geai des chênes
Aves	Pica pica (Linnaeus, 1758)	Pie bavarde
Aves	Corvus corone Linnaeus, 1758	Corneille noire
Aves	Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758	Etourneau sansonnet
Aves	Lanius collurio Linnaeus, 1758	Pie-grièche écorcheur
Aves	Fringilla coelebs Linnaeus, 1758	Pinson des arbres
Aves	Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)	Tarier des prés
Aves	Emberiza cirrus Linnaeus, 1766	Bruant zizi
Aves	Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766)	Tarier pâle
Insecta	Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)	Tircis (Le)
Insecta	Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)	Fadet commun (Le)
Insecta	Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)	Céphale (Le)

Insecta	Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)	Myrtil (Le)
Insecta	Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)	Demi-Deuil (Le)
Insecta	Erythromma lindenii (Selys-Longchamps, 1840)	Agrion de Vander Linden
Insecta	Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)	Azuré de la Bugrane (L')
Insecta	Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)	Citron (Le)
Insecta	Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)	Aurore (L')
Insecta	Papilio machaon Linnaeus, 1758	Machaon (Le)
Mammalia	Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)	Pipistrelle commune
Mammalia	Sus scrofa Linnaeus, 1758	Sanglier
Mammalia	Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)	Chevreuil européen
Mammalia	Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)	Lapin de garenne
Insecta	Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)	Caloptéryx vierge
Insecta	Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)	Agrion élégant
Insecta	Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)	Agrion porte-coupe
Insecta	Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)	Crocothémis écarlate (Le)
Insecta	Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)	Damier de la Succise (Le)
Insecta	Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)	Orthétrum réticulé (L')
Insecta	Orthetrum albistylum (Selys, 1848)	Orthétrum à stylets blancs (L')
Insecta	Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840)	Gomphe à crochets (Le)
Insecta	Sympetrum sanguineum (O.F. Mäxler, 1764)	Sympétrum sanguin (Le)
Insecta	Anax imperator Leach, 1815	Anax empereur (L')
Insecta	Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)	Grande Sauterelle verte
Insecta	Gryllus campestris Linnaeus, 1758	Grillon champêtre
Mammalia	Pipistrellus kuhlii (Natterer in Kuhl, 1817)	Pipistrelle de Kuhl
Aves	Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)	Tourterelle des bois
Insecta	Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)	Naiade au corps vert (La)
Insecta	Satyrus pruni (Linnaeus, 1758)	Thécla du Prunier (La)
Aves	Regulus ignicapilla (Temminck, 1820)	Roitelet à triple bandeau
Insecta	Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)	Collier-de-corail (Le)
Aves	Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)	Mésange bleue
Aves	Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)	Traquet motteux
Aves	Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)	Vanneau huppé
Insecta	Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)	Amaryllis (L')
Insecta	Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Souci (Le)
Insecta	Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1807)	Trithémis annelé (Le)