REALYS
ENVIRONNEMENT

ATOL
39 avenue du Château d'eau
33 700 Mérignac

Projet d'aménagement

Prédiagnostic écologique

Commune de Salaunes (33)

Mars 2026



REALYS ENVIRONNEMENT 278 rue de la Calle 40160 PARENTIS EN BORN
SARL au capital de 3320 euros – RCS 879 603 181 Mont-de-Marsan
contact@realys-environnement.fr – www.realys-environnement.fr

Références de dossier

Etude	Prédiagnostic écologique relatif à un projet d'aménagement sur la commune de Salaunes (33)
Maître d'ouvrage	ATOL 39 avenue du Château d'eau 33700 Mérignac
Prestataire	**Realys Environnement** 278 Rue de la Calle 40160 Parentis-en-Born Tél. 09 84 42 42 00
Auteur de l'étude	Jules TAVERNIER, Chargé d'études, Ecologue
Relecteur de l'étude	Loïc FASAN, Cogérant, Ecologue
Date de remise	26.03.2026

SOMMAIRE

1. PREAMBULE 5
2. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 6
3. CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE 10
4. REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 13
5. PATRIMOINE NATUREL 16
5.1. Zonage réglementaire 16
5.1. Zonage d'inventaire naturel 16
6. VEGETATION ET SENSIBILITE ECOLOGIQUE DES MILIEUX 20
6.1. Habitats naturels et anthropiques 20
6.2. Espèces floristiques 27
6.3. Zone humide (critère floristique) 29
7. FAUNE 31
7.1. Amphibiens 31
7.2. Reptiles 31
7.3. Entomofaune 32
7.4. Avifaune 33
7.5. Mammifères terrestres 36
7.6. Chiroptères 36
8. CONCLUSION 38
9. CALENDRIER DES INVENTAIRES DE TERRAIN 40

LISTE DES PLANCHES

Planches 1a et 1b – Localisation géographique 7
Planche 2 – Situation cadastrale 9
Planche 3a et 3b – Contexte hydrographique général et local 11
Planche 4 – Patrimoine naturel 19
Planche 5 – Habitats 26
Planche 6 – Espèces patrimoniales 37
Planche 7 – Enjeux écologiques 39

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Localisation des prises de vue 13
Figure 2 : Prise de vue n°1 14
Figure 3 : Prise de vue n°2 14
Figure 4 : Prise de vue n°3 15
Figure 5 : Prise de vue n°4 15
Figure 6 : Zone humide floristique présente sur le site 30
Figure 7 : Zone humide floristique présente dans la ZIP 30
Figure 8 : Photographie de l'Ecureuil roux (Source : INPN) 43
Figure 9 : Répartition de l'Ecureuil roux en France et en Aquitaine 43
Figure 10 : Photographie de Lézard des murailles 44
Figure 11 : Répartition du Lézard des murailles en France métropolitaine et en Aquitaine 44
Figure 12 : Photographie de Pipit farlouse adulte (source : Oiseau.net) 45
Figure 13 : Répartition du Pipit farlouse en Aquitaine 45

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Synthèse des zonages d'inventaire à proximité de la zone d'étude 17
Tableau 2 : Habitats répertoriés sur le site 21
Tableau 3 : Flore répertoriée sur le site 27
Tableau 4 : Flore indicatrice de zone humide répertoriée sur le site 29
Tableau 5 : Classe de recouvrement des espèces selon la méthode phyto-sociologique de Braun-Blanquet 29
Tableau 6 : Reptiles identifiés sur le site 31
Tableau 7 : Avifaune répertoriée sur le site 33
Tableau 8 : Mammifères répertoriés sur la zone d'étude 36
Tableau 9 : Calendrier d'inventaires 40

1. Préambule

La société ATOL projette la création d'un aménagement sur la commune de Salaunes (33).

Le projet (ou **ZIP***) se situe sur la commune de Salaunes (33) dans le département de la Gironde (33), à environ 17 km à l'Ouest de Bordeaux. Il s'étend sur une unique parcelle cadastrale d'une superficie totale de **1,49 ha.**

Une **AEI**** a également été prospectée sur une zone tampon de 100 m afin d'étudier les milieux naturels connexes. Enfin, l'**AEE***** permet l'étude des différents zonages réglementaires et d'inventaire dans un rayon de 5 km autour de la zone d'étude.

Afin d'anticiper d'éventuel impacts du projet sur le milieu naturel, Realys Environnement a réalisé un prédiagnostic Faune-Flore du site.

***ZIP :** *La Zone d'Implantation Potentielle (ZIP) correspond à la limite du site maîtrisé par le Maître d'œuvre pour y implanter son projet.*

****AEI :** *L'Aire d'Etude Immédiate (AEI) de 50 m autour du projet permet l'analyse exhaustive de l'état initial en particulier :*

- *l'inventaire des espèces animales et végétales protégées (mammifères, oiseaux, espèces végétales protégées et patrimoniales ...),*
- *la cartographie des habitats,*
- *l'analyse de la fonctionnalité écologique de la zone d'implantation au sein du territoire.*

Ici, elle comprend les parcelles concernées par le projet mais également la zone des effets directs des travaux et celle des effets éloignés et induits, représentée par l'ensemble des unités écologiques potentiellement perturbées par le projet.


*****AEE :** *L'Aire d'Etude Eloignée (AEE) de 5 km autour de la zone d'implantation potentielle permet de recenser les différents éléments du patrimoine naturel et culturel avec les zonages réglementaires, les zonages d'inventaires écologiques, les zones de protection…*

2. Localisation géographique

↳ Planches 1a et 1b – Localisation géographique
↳ Planches 2 – Situation cadastrale

Le projet d'aménagement est accessible par le Chemin de Bedillon ou par la Rue des Genêts à Salaunes (33160). Il se trouve dans le centre du territoire communal, à environ 580 mètres à l'Ouest de la mairie de Salaunes. Le projet est situé sur la parcelle cadastrale D 1200.

La localisation géographique du projet est présentée sur les planches 1a et 1b tandis que la situation cadastrale est représentée sur la planche 2 ci-après.



1a

Localisation géographique

Ech 1:100 000

ATOL

Prédiagnostic écologique
Projet d'aménagement
Salaunes (33)

REALYS ENVIRONNEMENT




1b — Ech 1:2 000

Localisation géographique

ATOL

Prédiagnostic écologique
Projet d'aménagement
Salaunes (33)

REALYS ENVIRONNEMENT


Légende
Zone d'implantation potentielle
Aire d'étude immédiate
Parcelles cadastrales
D 1200
0
100
200 m
2
Situation cadastrale
Ech 1:3 000
ATOL
Prédiagnostic écologique
Projet d'aménagement
Salaunes (33)
REALYS
ENVIRONNEMENT
17.03.2026


3. Contexte hydrographique


↳ Planches 3a et 3b – Contexte hydrographique général et local

Le projet s'inscrit au droit de la zone hydrographique « **Le Canal des Etangs du confluent de la Déhesse de Talaris au bassin d'Arcachon** » codée S121.

Les eaux pluviales s'infiltrent ou ruissèlent au droit du projet et se retrouvent dans la **Craste de la Berle** (codée S1211682) au Nord ou dans le cours d'eau au **toponyme inconnu codé S1210682** au Sud**.** L'eau rejoint ensuite la **Craste de Capéran** (codée S1210682) puis la **Craste Climens** (codée S1210672), la **Craste de l'Eyron** (codée S1210522)**,** le **Canal de la Berle** (codé S1210512) pour arriver dans le lac de Lacanau. Enfin l'eau se retrouve dans le **Canal des étangs** (codé S12-0402) pour finir dans **le Bassin d'Arcachon**.

L'ambiance potamologique du secteur est présentée sur la planche n°3.


Légende
Zone d'implantion potentielle
Aire d'étude immédiate
Cours d'eau
Sens d'écoulement
0
1,5
3 km
17.03.2026
3a
Ech 1:60 000
Contexte hydrographique général
ATOL
Prédiagnostic écologique
Projet d'aménagement
Salaunes (33)
REALYS
ENVIRONNEMENT



3b

Ech 1:3 000

Contexte hydrographique local

ATOL

Prédiagnostic écologique
Projet d'aménagement
Salaunes (33)

REALYS ENVIRONNEMENT

4. Reportage photographique

La localisation des prises de vues est indiquée sur la figure suivante. Elles ont toutes été réalisées le 4 février 2026.




Figure 1 : Localisation des prises de vue



Figure 2 : Prise de vue n°1



Figure 3 : Prise de vue n°2



Figure 4 : Prise de vue n°3



Figure 5 : Prise de vue n°4

5. Patrimoine naturel

Sources : - DREAL Nouvelle Aquitaine
- Inventaire National du Patrimoine Naturel
Planche 4 : Patrimoine naturel

5.1. Zonage réglementaire

Le site du projet n'appartient à aucune zone Natura 2000. Aucun zonage réglementaire n'est présent dans le rayon de 5 km.

5.1. Zonage d'inventaire naturel

Le zonage d'inventaires situé dans un rayon de 5 km autour du projet est le suivant :

- **ZNIEFF 2 : 720030129 - Landes, lagunes et mares du nord-ouest bordelais**

Cette ZNIEFF de type 2 fait partie de l'entité biogéographique du Plateau landais, secteur constitué d'un vaste massif de Pins maritimes (*Pinus pinaster*) plantés sur sols sableux et tourbeux présentant par endroit une nappe subaffleurante. Ces particularités géologique et pédologique, couplées aux influences thermo-atlantiques, ont permis la formation de landes typiques du sud-ouest de la France.

Les landes sont des végétations constituées de petits buissons (chaméphytes) tels que les Bruyères [Bruyère cendrée (*Erica cinerea*), Bruyère ciliée (*Erica ciliaris*), Bruyère à quatre angles (*Erica tetralix*) ou encore Bruyère à balais (*Erica scoparia*) mais aussi d'herbacées parfois structurantes, telles que la Molinie bleue (*Molinia caerulea*) ou encore l'Avoine de Thore (*Pseudarrhenatherum longifolium*) et parfois piquetées de petits arbustes comme la Bourdaine (*Frangula alnus*) ou l'Ajonc d'Europe (*Ulex europaea*). Les différentes conditions du milieu induisent différents types de landes allant des plus humides aux plus sèches.

De plus, la nappe affleurante à certains endroits est à l'origine de la formation d'un réseau de mares, dénommées localement « lagunes », hautement patrimoniales par leur fonctionnalité écologique, mais aussi les espèces qui s'y trouvent (voir ZNIEFF de type 1 incluse "Lagunes du nord-ouest bordelais").

Le site se caractérise donc par la concentration importante en lagunes (et les enjeux flore-habitats associés), mais également plus largement par les landes sèches à humides qui parsèment le territoire et hébergent des espèces patrimoniales telles que la Gentiane des marais (*Gentiana pneumonanthe*), l'Ail des landes (*Allium ericetorum*), etc.

L'ensemble de ces habitats offrent également un milieu favorable au développement d'espèces faunistiques terrestres qui affectionnent les milieux boisés mais aimant les contextes humides, rarement très éloignées de l'eau car souvent crucial pour la reproduction de l'espèce. C'est notamment le cas de la Rainette ibérique (*Hyla molleri*) ou encore la Salamandre tachetée terrestre (*Salamandra salamandra terrestris*) mais aussi de nombreux autres amphibiens. La présence de milieux ouverts avoisinant le réseau de lagunes, de la même manière que les milieux boisés, favorise principalement le développement d'odonates tels que l'Aeschne affine (*Aeshna affinis*), la Leucorrhine à front blanc (*Leucorrhinia albifrons*) mais également de rhopalocères comme le Fadet des Laîches (*Coenonympha oedippus*). Les landes à bruyères en terrains sableux ou des milieux plus humides qui composent cette mosaïque d'habitats sont également propice à la présence de la Coronelle lisse (*Coronella austriaca*). Espèce actuellement considérée vulnérable selon la liste rouge régionale des

amphibiens et reptiles d'Aquitaine. A noter, la présence de plusieurs autres espèces faunistiques menacées selon les listes rouges régionales de l'UICN. Néanmoins, des prospections complémentaires pourraient permettre d'enrichir les connaissances de cette ZNIEFF principalement concernant l'avifaune et les mammifères.

Le projet se situe à environ 650 m à l'Ouest de cette ZNIEFF de type 2.

- **ZNIEFF 1 : 720030128 - Lagunes et mares du nord-ouest bordelais**

Cette ZNIEFF fait partie de l'entité biogéographique du Plateau landais, secteur constitué d'un vaste massif de Pins maritimes (*Pinus pinaster*) plantés sur sols sableux et tourbeux, présentant par endroit une nappe subaffleurante. Cette particularité est à l'origine de la formation d'un réseau de mares, dénommées localement « lagunes ».
Ce secteur présente une densité particulièrement importante de lagunes puisqu'on en dénombre plus de 400 sur un périmètre d'environ 50 km² en comparaison, on en recense 1000 au sein du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (3000 km²).
Les lagunes constituent des zones témoins du niveau de la nappe et donc de l'état de la ressource en eau. Or, elles font l'objet ces dernières années de nombreuses menaces telles que le comblement, le drainage, l'apport de remblais, de déchets verts ou de matériaux de construction divers, etc.
Par ailleurs, les lagunes inventoriées ont permis de détecter la présence de nombreuses espèces patrimoniales à fort enjeu telles que l'Elatine de Brochon (*Elatine brochonii*), la Littorelle à une fleur (*Littorella uniflora*), le Faux-Cresson de Thore (*Caropsis verticillo-inundata*) ou encore la Gentiane des marais (*Gentiana pneumonanthe*), indiquant également la typicité des habitats rencontrés : gazons amphibies oligotrophes vivaces à exondation estivale ou automnale, végétations aquatiques des eaux oligo-mésotrophes, landes humides, prairies oligotrophes paratourbeuses humides, etc.
La présence d'un tel réseau de lagunes au sein de la métropole de Bordeaux et sur les communes avoisinantes est un réel atout pour la gestion de la ressource en eau.
Outre le fort intérêt floristique de ce réseau, l'ensemble de ces lagunes propose un environnement favorable au développement de nombreuses espèces faunistiques effectuant une partie de leur cycle de vie dans le milieu aquatique. C'est notamment le cas de la rainette ibérique (*Hyla molleri*), actuellement non déterminante, mais présentant un enjeu de conservation majeur pour la région, ou encore d'odonates comme la Leucorrhine à front blanc (*Leucorrhinia albifrons*), actuellement considérée quasi-menacée selon la liste rouge régionale des odonates d'Aquitaine.


Le projet se situe à environ 940 m à l'Ouest de cette ZNIEFF de type 1.

Tableau 1 : Synthèse des zonages d'inventaire à proximité de la zone d'étude

Nom du zonage	Type	Référence	Localisation
Landes, lagunes et mares du nord-ouest bordelais	ZNIEFF 2	720030129	**650 m à l'Est de la zone d'étude**
Lagunes et mares du nord-ouest bordelais	ZNIEFF 1	720030128	**940 m à l'Est de la zone d'étude**

Les deux ZNIEFF sont situées à moins d'un kilomètre de la zone d'étude. La typologie d'habitat décrite dans la fiche descriptive de la ZNIEFF de type 2 « Landes, lagunes et mares du nord-ouest bordelais » présente des ressemblances avec les habitats observés au niveau de la zone d'étude (massif de Pins maritimes (*Pinus pinaster*) plantés sur sols sableux et tourbeux, présentant par endroit une nappe subaffleurante ; landes constituées de Bruyères, de Molinie bleue, d'Ajonc d'Europe…). Un certain lien peut donc être établi entre le site étudié et la ZNIEFF 720030129 bien qu'il soit moindre, notamment au vu du contexte urbain qui sépare les deux zones.

La localisation des zones Natura 2000 et zonages d'inventaires est présentée sur la planche 4.


N
Légende
Zone d'implantion potentielle
Aire d'étude éloignée
ZNIEFF 1
720030128 - Lagunes et mares du nord-ouest bordelais
ZNIEFF 2
720030129 - Landes, lagunes et mares du nord-ouest bordelais
720030128
720030011
850 m
940 m
720030129
0
1
2 km
17.03.2026
4
Ech 1:55 000
Patrimoine naturel
ATOL
Prédiagnostic écologique
Projet d'aménagement
Salaunes (33)
720030039
REALYS
ENVIRONNEMENT

6. Végétation et sensibilité écologique des milieux

↳ Planche 5 – Habitats

6.1. Habitats naturels et anthropiques

Lors des investigations de terrain, 6 habitats différents ont été recensés sur le site du projet selon la typologie EUNIS :

1. **D5.3 :** Jonchaie
2. **E1.7 :** Pelouse mésophile
3. **E2.1 x F4.13:** Prairie mésophile x Lande à Molinie bleue entretenues
4. **E5.1 :** Zone rudérale
5. **F3.15 :** Lande à Ajonc d'Europe entretenue
6. **F4.13 :** Lande à Molinie bleue
7. **G1.A1 :** Chênaie
8. **G3.713 :** Jeune pinède
9. **G3.713 :** Pinède
10. **G5.1 :** Alignement de Chêne pédonculé
11. **J1.2 x I2.2 :** Habitation x Jardin
12. **J4.2 :** Chemin
13. **J4.2 :** Route

    C2.1 : Fossé

Les milieux identifiés sur la zone d'étude sont rapportés dans le tableau suivant avec leurs équivalences entre habitats EUNIS et enjeux écologiques.

Tableau 2 : Habitats répertoriés sur le site

Milieux	Code EUNIS	Statut	Dénomination	Photographie du milieu	Espèces dominantes et/ou description	Zone humide	Enjeux écologiques
1	D5.3	-	Jonchaie		Il s'agit d'un habitat de faible surface situé au Sud-Est de la ZIP et qui est dominé par le Jonc aggloméré.	Oui	**Modéré**
2	E1.7	-	Pelouse mésophile		Cet habitat, situé au Sud de la ZIP, correspond à une pelouse mésophile peu dense en végétation. On y retrouve des espèces caractéristiques telles que le Plantain lancéolé, le Pâturin annuel, le Renoncule bulbeuse ou encore la Pâquerette.	Non	**Très faible**
3	E2.1 x F4.13		Prairie mésophile x Lande à Molinie bleue entretenues		Situé au Nord, il s'agit de l'un des habitats dominant de la ZIP. Il est un milieu ouvert assez dégradé par une gestion récente. Les espèces dominantes y sont le Dactyle aggloméré, la Molinie bleue, la Porcelle enracinée, la Bourse à pasteur, le Séneçon commun, le Céraiste aggloméré.	Non	**Très faible**


Milieux	Code EUNIS	Statut	Dénomination	Photographie du milieu	Espèces dominantes et/ou description	Zone humide	Enjeux écologiques
4	E5.1	-	Zone rudérale		Cet habitat correspond à une zone de stockage de différents matériaux de remblais ou de construction (graviers ou sable). Une partie de la zone est constituée de sol nu mais quelques rares espèces ont pu coloniser la zone. Par exemple, on y retrouve la Vergerette du Canada, le Pâturin annuel, ou encore le Dactyle aggloméré.	Non	**Très faible**
5	F3.15	-	Lande à Ajonc d'Europe entretenue		Ces zones correspondent à d'anciennes Lande à Ajoncs qui semblent avoir été rasées. On y observe en grande majorité de l'Ajonc d'Europe (restes secs et petites repousses) jonchant le sol, ainsi que quelques pieds de Molinies bleue et des mousses. Cet habitat est représenté par deux patchs situés respectivement au Nord-Ouest et au Sud-Ouest de la ZIP.	Non	**Très faible**
6	F4.13	-	Lande à Molinie bleue		Il s'agit de l'un des habitats majoritaires de la ZIP qui s'étend à l'Ouest dans l'AEI. On y trouve en majorité de la Molinie bleue de manière assez dense ainsi que quelques jeunes Chênes pédonculés épars. Cette lande est en bon état écologique et est considérée comme humide du fait de la dominance de la Molinie bleue (plante indicatrice de zone humide).	Oui	**Modéré**

Milieux	Code EUNIS	Statut	Dénomination	Photographie du milieu	Espèces dominantes et/ou description	Zone humide	Enjeux écologiques
7	G1.A1	-	Chênaie		Il s'agit de boisements de jeunes Chênes pédonculés qui se développent en grande partie dans l'AEI. On y retrouve une sous strate de Bruyère à balais, de Molinie bleue, de Lierre grimpant, de Houx, de Fougère aigle ou encore de Bourdaine.	Non	**Modéré**
8	G3.713	-	Jeune pinède		Cette pinède est une plantation récente de Pin maritime (environ 15 ans) située à l'Est de l'AEI. On y retrouve une sous strate herbacée composée d'espèces telles que le dactyle aggloméré.	Non	**Faible**
9	G3.713	-	Pinède		Il s'agit de pinèdes âgées (environ 25 à 30 ans) qui semblent ne plus être exploitées. On retrouve cet habitat en dehors de la ZIP à l'Ouest, au Nord-Ouest et au Nord-Est.	Non	**Modéré**

Milieux	Code EUNIS	Statut	Dénomination	Photographie du milieu	Espèces dominantes et/ou description	Zone humide	Enjeux écologiques
10	G5.1	-	Alignement de Chêne pédonculé		Il s'agit d'alignements de Chênes pédonculés qui font office de séparation entre les parcelles. Ces alignements se situent au Nord-Est de la ZIP (une petite partie dans la ZIP et le reste dans l'AEI) et se composent de Houx, de Lierre grimpant, d'Ajonc d'Europe ou encore de quelques Joncs agglomeré.	Non	**Faible**
11	J1.2 x I2.2	-	Habitation x Jardin		Il s'agit de zones privées constituées de maisons d'habitation et des jardins domestiques associés. On y retrouve des pelouses, des haies et quelques arbres ornementaux. Ces zones sont situées au Sud et à l'Est de l'AEI (en grande majorité hors ZIP).	Non	**Très faible**
12	J4.2	-	Chemin		Il s'agit de chemins non goudronnés mais carrossables situées dans la ZIP, à l'Est ainsi que dans l'AEI au Nord-Ouest. Aucunes espèces végétales n'y est présente, hormis les bandes enherbées de type pelouse, situées de part et d'autre.	Non	**Nul**

Milieux	Code EUNIS	Statut	Dénomination	Photographie du milieu	Espèces dominantes et/ou description	Zone humide	Enjeux écologiques
13	J4.2	-	Route		Il s'agit de routes goudronnées carrossables. Elles se situent dans l'AEI, au Sud, au Nord et à l'Est.		**Nul**
-	C2.1	-	Fossé		Il s'agit de fossés qui se situent au Nord, en bordure de la route et au Sud, dans les boisements. Une partie se situent dans la ZIP au Sud.		**Très faible**

La planche cartographique suivante permet de localiser les différents habitats recensés sur le site.


N
Légende
Zone d'implantion potentielle
Aire d'étude immédiate
Habitats
1. Jonchaie (D5.3)
2. Pelouse mésophile (E1.7)
3. Prairie mésophile x Lande à Molinie bleue entretenues (E2.1 x F4.13)
4. Zone rudérale (E5.1)
5. Lande à Ajonc d'Europe entretenue (F3.15)
6. Lande à Molinie bleue (F4.13)
7. Chênaie (G1.A1)
8. Jeune pinède (G3.713)
9. Pinède (G3.713)
10. Alignement de Chêne pédonculé (G5.1)
11. Habitation x Jardin (J1.2 x I2.2)
12. Chemin (J4.2)
13. Route (J4.2)
Fossés (C2.1)
0
100
200 m
18.03.2026
5
Ech 1:2 000
Habitats
ATOL
Prédiagnostic écologique
Projet d'aménagement
Salaunes (33)
REALYS
ENVIRONNEMENT

6.2. Espèces floristiques

La liste des espèces de flore relevées sur le site du projet est donnée dans le tableau suivant.

Tableau 3 : Flore répertoriée sur le site

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut national	Statut départemental	Espèce indicatrice de zone humide
				Code
Ajonc d'Europe	*Ulex europaeus*	/	/	/
Bouleau verruqueux	*Betula pendula*	/	/	/
Bourdaine	*Frangula alnus*	/	/	98888
Bourse-à-pasteur	*Capsella bursa-pastoris*	/	/	/
Bruyère à balais	*Erica scoparia*	/	/	/
Bruyère ciliée	*Erica ciliaris*	/	/	/
Céraiste aggloméré	*Cerastium glomeratum*	/	/	/
Chêne pédonculé	*Quercus robur*	/	/	/
Chèvrefeuille des bois	*Lonicera periclymenum*	/	/	/
Dactyle aggloméré	*Dactylis glomerata*	/	/	/
Fougère aigle	*Pteridium aquilinum*	/	/	/
Fragon petit-houx	*Ruscus aculeatus*	Règlementation préfectorale	/	/
Germandrée scorodoine	*Teucrium scorodonia*	/	/	/
Houx	*Ilex aquifolium*	Règlementation préfectorale	/	/
Jonc aggloméré	*Juncus conglomeratus*	/	/	104160
Lamier pourpre	*Lamium purpureum*	/	/	/
Lierre grimpant	*Hedera helix*	/	/	/
Molinie bleue	*Molinia caerulea*	/	/	108718
Pâquerette	*Bellis perennis*	/	/	/
Pâturin annuel	*Poa annua*	/	/	/
Petite oseille	*Rumex acetosella*	/	/	/
Pin maritime	*Pinus pinaster*	/	Plante exotique (Ancien statut)	/

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut national	Statut départemental	Espèce indicatrice de zone humide
				Code
Pissenlit commun	*Taraxacum officinale*	Insuffisamment documentée	Insuffisamment documentée	/
Plantain lancéolé	*Plantago lanceolata*	/	/	/
Porcelle enracinée	*Hypochaeris radicata*	/	/	/
Potentille rampante	*Potentilla reptans*	/	/	/
Renoncule bulbeuse	*Ranunculus bulbosus*	/	/	/
Ronce des bois	*Rubus nemorosus*	/	/	/
Séneçon commun	*Senecio vulgaris*	/	/	/
Trèfle des champs	*Trifolium arvense*	/	/	/
Trèfle douteux	*Trifolium dubium*	/	/	/
Vergerette du canada	*Erigeron canadensis*	/	PEE à impact majeur	/
Véronique petit-chêne	*Veronica chamaedrys*	/	/	/

Légende :

- PEE : Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes de Nouvelle-Aquitaine, 2022.

La flore recensée est globalement commune à l'échelle du département de la Gironde. Sur les 33 espèces recensées, une d'entre elles est une espèce exotique. Il s'agit de la Vergerette du Canada, une plante exotique envahissante à impact majeur.

6.3. Zone humide (critère floristique)

Quatre espèces indicatrices de zones humides ont été identifiées au sein du périmètre d'étude selon l'arrêté du 24 juin 2008 (modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009) qui précise les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'Environnement. Ces espèces sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 4 : Flore indicatrice de zone humide répertoriée sur le site

Nom vernaculaire	Nom Scientifique	Code arrêté du 24 juin 2008	Zone d'observation	Recouvrement
Bourdaine	*Frangula alnus*	98888	7. Chênaie (G1.A1)	1
			8. Jeune pinède (G3.713)	1
Jonc aggloméré	*Juncus conglomeratus*	104160	1. Jonchaie (D5.3)	4
			3. Prairie mésophile x Lande à Molinie bleue entretenues (E2.1 x F4.13)	+
			4. Zone rudérale (E5.1)	1
Molinie bleue	*Molinia caerulea*	108718	3. Prairie mésophile x Lande à Molinie bleue entretenues (E2.1 x F4.13)	2
			6. Lande à Molinie bleue (F4.13)	4
			7. Chênaie (G1.A1)	2
			9. Pinède (G3.713)	1

Tableau 5 : Classe de recouvrement des espèces selon la méthode phyto-sociologique de Braun-Blanquet

Coefficient	Classe de recouvrement en %
5	***75-100***
4	***50-75***
3	***25-50***
2	***5-25***
1	***1-5***
+	***<1***
r	***Individu isolé***

Ces espèces sont dominantes au niveau des associations végétales des habitats 1 : Jonchaie (D5.3) et 6 : Lande à Molinie bleue (F4.13). En effet, le Jonc aggloméré recouvre plus de 50% de l'habitat 1. La Molinie bleue recouvre plus de 50% de l'habitat 6. Ainsi, la surface totale de zone humide est de 8770 m² dans l'aire d'étude. Cela représente une surface de 6228 m² au niveau de la ZIP.



Figure 6 : Zone humide floristique présente sur le site




Figure 7 : Zone humide floristique présente dans la ZIP

7. Faune

Planche 6 – Espèces patrimoniales

Concernant la faune, les espèces suivantes ont été recensées sur l'aire d'étude :

- 1 espèce de reptile,
- 16 espèces d'oiseaux,
- 3 espèces de mammifères.

7.1. Amphibiens

Aucune espèce d'amphibien n'a été recensée au cours de l'inventaire effectué. Les fossés forestiers et certaines zones d'eau stagnantes au niveau des milieux ouverts constituent des milieux favorables à la reproduction des espèces communes d'amphibiens telles que le Triton palmé ou la Salamandre tachetée. Les boisements sont, quant à eux, favorables à leur hivernation.

7.2. Reptiles

Une espèce de reptile a été recensée sur le site. Leur statut réglementaire est présenté dans le tableau suivant.

Tableau 6 : Reptiles identifiés sur le site

Nom français	Nom latin	Statut Réglementaire			LRN	LRR	ZNIEFF	Enjeu local de conservation
		PN	Berne	DHFF				
Lézard des murailles	***Podarcis muralis***	**Art 2**	**An. II**	**An. IV**	**LC**	**LC**	**/**	**Faible**

Légende :

- **PN : Protection nationale : arrêté ministériel du 8 janvier 2021**
  Art 2 : Protection stricte de l'espèce
- **Berne : Convention de Berne**
  An. II : Interdiction de perturbation, capture, de détention, et de mise à mort intentionnelles et commercialisation d'animaux ou de produits obtenus à partir de ces derniers. Interdiction de détention, destruction ou ramassage intentionnels des œufs.
- **DHFF : Directive Habitats-Faune-Flore 92/43/CEE**
  An. IV : Espèce d'intérêt communautaire nécessitant une protection stricte.
- **LRN : Liste rouge des reptiles et amphibiens de France métropolitaine (2015)**
  LC : Préoccupation mineure
- **LRR : Liste rouge régionale des amphibiens et reptiles d'Aquitaine (2013)**
  LC : Préoccupation mineure
- **ZNIEFF : espèces déterminantes ZNIEFF**

Plusieurs individus de **Lézard des murailles** ont été recensés sur la zone d'étude. Cette espèce accomplit l'ensemble de son cycle de vie au niveau des **milieux arbustifs et boisés** du site. Elle utilise les milieux ouverts pour son alimentation et son transit. L'enjeu local de conservation de cette espèce est **faible.**

7.3. Entomofaune

7.3.1. Orthoptères

Aucune espèce d'orthoptère n'a été recensée au cours de l'inventaire effectué (hors période favorable).

7.3.2. Odonates

Aucune espèce d'odonate n'a été recensée au cours de l'inventaire effectué (hors période favorable).

7.3.3. Lépidoptères

Aucune espèce de lépidoptère n'a été recensée au cours de l'inventaire effectué (hors période favorable). Un inventaire complémentaire en période optimale (juin), ciblé sur les habitats de lande à Molinie bleue, permettrait de confirmer l'enjeu vis-à-vis du Fadet des Laîches.

7.3.4. Coléoptères saproxyliques

Aucune espèce de coléoptère saproxylique n'a été recensée au cours de l'inventaire effectué.

7.4. Avifaune

Sur l'aire d'étude, 16 espèces d'oiseaux ont été identifiées. Les statuts réglementaires de l'avifaune présente sur la zone d'étude sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 7 : Avifaune répertoriée sur le site

Nom français	Nom latin	Statut Réglementaire				Liste rouge nationale	Enjeu local de conservation
		PN	Bonn	Berne	DO		
Bruant zizi	*Emberiza cirlus*	Art 3	/	An. II	/	NA (passage) LC (nicheur)	Très faible
Corneille noire	*Corvus corone*	/	/	An. III	An. II/2	NA (hivernant) LC (nicheur)	Très faible
Etourneau sansonnet	*Sturnus vulgaris*	Art 1 (chasse)	/	/	An. II/2	LC (hivernant) NA (passage) LC (nicheur)	Très faible
Grimpereau des jardins	*Certhia brachydactyla*	Art 3	/	An. III	/	LC (nicheur)	Très faible
Merle noir	*Turdus merula*	Art 1 (chasse) Art 3 (commerce)	/	An. III	An. II/2	NA (hivernant) LC (nicheur)	Très faible
Mésange à longue queue	*Aegithalos caudatus*	Art 3	/	An. III	/	NA (passage) LC (nicheur)	Très faible
Mésange bleue	*Cyanistes caeruleus*	Art 3	/	An. II	/	NA (passage) LC (nicheur)	Très faible
Moineau domestique	*Passer domesticus*	Art 3	/	/	/	NA (passage) LC (nicheur)	Très faible
Pic vert	*Picus viridis*	Art 3	/	An. II	/	LC (nicheur)	Très faible
Pigeon ramier	*Columba palumbus*	Art 1 (chasse)	/	/	An. II/1 An. III/1	LC (hivernant) NA (passage) LC (nicheur)	Très faible

Nom français	Nom latin	Statut Réglementaire				Liste rouge nationale	Enjeu local de conservation
		PN	Bonn	Berne	DO		
Pinson des arbres	*Fringilla coelebs*	Art 3	/	An. III	/	LC (nicheur) NA (hivernant)	Très faible
Pipit farlouse	***Anthus pratensis***	**Art 3**	**/**	**An. II**	**/**	**NA (passage) VU (nicheur) DD (hivernant)**	**Modéré**
Pouillot véloce	*Phylloscopus collybita*	Art 3	/	An. III	/	NA (hivernant) LC (nicheur)	Très faible
Rougegorge familier	*Erithacus rubecula*	Art 3	An. II	An. II	/	LC (nicheur) NA (hivernant)	Très faible
Rougequeue noir	*Phoenicurus ochruros*	Art 3	An. II	An. II	/	NA (hivernant) LC (nicheur)	Très faible
Sittelle torchepot	*Sitta europaea*	Art 3	/	An. II	/	LC (nicheur)	Très faible

Légende :

- **PN : Protection nationale : arrêté ministériel du 29 octobre 2009**
  Art 1 (chasse) : (**arrêté ministériel du 26 juin 1987**) : Gibier chassable.
  Art 3 : (**arrêté ministériel du 29 octobre 2009**) : Protections stricte de l'espèce (Interdiction de destruction ou d'enlèvement (œufs, nids et individus), de mutilation, de capture ou d'enlèvement, de perturbation intentionnelle, sur le territoire métropolitain et en tout temps.
  Interdiction de détruire, altérer ou dégrader leurs sites de reproduction et leurs aires de repos, ainsi que l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations, sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente. Interdiction de détention, transport, naturalisation, colportage, mise en vente, vente ou achat, utilisation commerciale ou non, des oiseaux prélevés, sur le territoire national et en tout temps).
  Art 3 (commerce) : (**arrêté ministériel du 29 octobre 2009**) (relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire national) :
  Interdiction de destruction ou d'enlèvement des nids et des œufs. Interdiction de détention des œufs, vivants ou morts, de détention pour la vente, de colportage, de mise en vente, de vente ou d'achat des spécimens d'oiseaux dont la chasse est autorisée. Cette interdiction ne porte pas sur les oiseaux définis dans cet article.
- **Bonn : Convention de Bonn**
  An. II : Mise en place d'accord internationaux pour assurer la conservation de l'espèce.
- **Berne : Convention de Berne**

An. II : Protection des zones migratoires et de repos. An. III : Exploitation réglementée de manière à maintenir l'existence de population hors de danger.
An. III : Espèces de faune protégées (Exploitation réglementée de manière à maintenir l'existence de population hors de danger).

- **DO : Directive Oiseaux 2009/147/CE**
  An. II/1 : chasse autorisée dans toute l'Union Européenne dans la mesure où les efforts de conservation entrepris ne sont pas compromis.
  An. II/2 : chasse autorisée seulement dans les États membres de l'UE pour lesquels l'espèce est mentionnée
  An. III/1 : Vente, transport, détention pour la vente et la mise en vente peuvent être autorisés, pour autant que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés ou autrement licitement acquis.
- **Liste rouge des oiseaux de France métropolitaine (2012) : Espèces menacées de disparition**
  NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car, introduite dans la période récente ou, présente en métropole de manière occasionnelle).
  LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France et du monde est faible).
  VU : Vulnérable.

Parmi les 16 espèces d'oiseaux présentes sur la zone d'étude, 12 possèdent des statuts de protection au titre de la réglementation française (Article 3 de l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009). Cette avifaune est assez commune dans le département. Une espèce patrimoniale a été recensée au niveau de la zone d'étude. Il s'agit du Pipit farlouse, classé comme vulnérable sur liste rouge des oiseaux nicheurs en France. Celui-ci a été contacté au niveau de la lande à Molinie. Les milieux ouverts répertoriés sur le site sont favorables à sa nidification et à son alimentation.

7.5. Mammifères terrestres

Concernant les mammifères, trois espèces ont été recensées dans la zone d'étude. Les statuts réglementaires de ces espèces sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 8 : Mammifères répertoriés sur la zone d'étude

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut réglementaire			LRN	LRR	ZNIEFF	Enjeu local de conservation
		PN	Berne	DHFF				
Chevreuil européen	*Capreolus capreolus*	Art 1 (chasse)	An. III	/	LC	LC	/	Très faible
Ecureuil roux	***Sciurus vulgaris***	**Art 2**	**An. III**	**/**	**LC**	**LC**	**/**	**Faible**
Sanglier	*Sus scrofa*	Art 1 (chasse)	/	/	LC	LC	/	Très faible

Légende :

- **PN : Protection *nationale* arrêté ministériel du 23 avril 2007**
  Art. 1 (chasse (arrêté ministériel du 26 juin 1987) (fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée) : Gibier chassable
  Art 2 (arrêté ministériel du 23 avril 2007) : Protection stricte de l'espèce (Interdiction de destruction, mutilation, capture ou enlèvement, perturbation intentionnelle des mammifères dans le milieu naturel, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps.
  Interdiction de détruire, altérer ou dégrader leurs sites de reproduction et leurs aires de repos, ainsi que l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations.
  Interdiction de détention, transport, naturalisation, colportage, mise en vente, vente ou achat, utilisation commerciale ou non, des mammifères prélevés, sur le territoire national et en tout temps).
- **Berne : Convention de Berne**
  An. III : Exploitations réglementée de manière à maintenir l'existence de populations hors de danger
- **DHFF : Directive Habitats-Faune-Flore 92/43/CEE**
- **LRN : Liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine (2017)**
  LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France et du monde est faible)
- **LRR : Liste rouge régionale des mammifères continentaux non-volants d'Aquitaine (2020)**
  LC : Préoccupation mineure
- **ZNIEFF : espèces déterminantes ZNIEFF**


Le Chevreuil européen, l'Ecureuil roux et le Sanglier sont des espèces de mammifères communes dans le secteur. Plusieurs traces ou individus de ces espèces ont été observés sur le site.

L'**Écureuil roux** possède un intérêt patrimonial puisqu'il s'agit d'une espèce faisant l'objet d'une protection stricte. Des restes de repas (pomme de Pin consommé) ont été trouvés dans les boisements de la zone d'étude. Aucun individu n'a été observé directement. Les milieux ouverts du site situés à proximité directe (prairies mésiques notamment) constituent des habitats d'alimentation et de transit pour cette espèce.

7.6. Chiroptères

Aucun arbre gîte à chiroptères potentiel n'a été identifié lors des inventaires.

Les espèces patrimoniales et leurs habitats au droit du projet et de la zone d'étude sont présentés sur la planche 6 ci-après.


N
Légende
Zone d'implantion potentielle
Aire d'étude immédiate
Espèces patrimoniales
Lézard des murailles
Pipit farlouse
Habitats d'espèces
Boisement favorable au cycle de vie de l'Ecureuil roux et du Lézard des murailles ainsi qu'à l'hivernation des espèces communes d'amphibiens
Milieu favorable à l'alimentation et au transit de l'avifaune commune et du Lézard des murailles
Milieu ouvert favorable à la nidification du Pipit farlouse ainsi qu'à l'alimentation et au transit de l'avifaune commune et du Lézard des murailles
Milieu ouvert ou semi ouvert favorable à l'alimentation et au transit du Pipit farlouse, de l'avifaune commune et du Lézard des muraillles
Fossés favorables à la reproduction des espèces communes d'amphibiens
0
50
100 m
18.03.2026
6
Ech 1:2 000
Espèces patrimoniales
ATOL
Prédiagnostic écologique
Projet d'aménagement
Salaunes (33)
REALYS
ENVIRONNEMENT

8. Conclusion

↳ Planches 7 – Enjeux écologiques

La zone du projet est représentée par une zone ouverte (lande à Molinie bleue). L'AEI se compose, quant à elle, de boisements, d'habitations, de jardins domestiques ainsi que de chemin et d'une route. Les prospections ont été réalisées lors d'une unique session d'inventaire en mars.

Ainsi, l'intérêt écologique au sein de la zone d'étude est globalement nul à modéré.


Au niveau de la zone du projet (ZIP), les habitats présentent des enjeux écologique nuls à modérés :

- Les enjeux **nuls** sont associés aux voiries à l'Est (routes et chemins).
- Les enjeux **faibles** sont représentés par les zones de landes à Ajonc d'Europe entretenues, à la zone rudérale à l'Est et à la zone d'habitation et de jardin à l'Est (alimentation du Pipit farlouse). Les portions de fossés situées au Nord et au Sud ont également un enjeu faible (reproduction des espèces communes d'amphibiens).
- Les enjeux **modérés** sont associés aux milieux ouverts comme à la lande à molinie, à la jonchaie (zones humides), à la prairie mésophile x lande à molinie entretenues (nidification du Pipit farlouse). Les boisements de Chênes pédonculés (au Sud de la ZIP) et de Pins maritimes (à l'Ouest de la ZIP) font également partie des habitats à enjeux modérés pour leur valeur intrinsèque.

Au niveau de la zone d'étude, les habitats présentent des enjeux écologiques nuls à modérés :

- Les enjeux **nuls** sont associés aux voiries qui quadrillent l'AEI (routes et chemins).
- Les enjeux **faibles** sont représentés par la zone rudérale à l'Est et aux zones d'habitation et de jardins ainsi qu'à la pelouse mésophile au Sud et à l'Est (alimentation du Pipit farlouse). Les fossés (au Nord et au Sud) qui traversent l'AEI d'Ouest en Est ont aussi un enjeu faible (reproduction des espèces communes d'amphibiens). La jeune plantation de Pins maritimes situé au Nord-Ouest de l'AEI présente également un enjeu faible en tant que zone d'alimentation du Pipit farlouse.
- Les enjeux **modérés** sont associés aux milieux ouverts comme à la lande à molinie dans la partie Ouest de l'AEI, à une faible portion de la jonchaie à l'Est (zones humides), à une faible partie de la prairie mésophile x lande à molinie entretenues (nidification du Pipit farlouse). Les boisements de Chênes pédonculés et de Pins maritimes (à l'Ouest et au Nord-Est) font également partie des habitats à enjeux modérés pour leur valeur intrinsèque. Enfin, l'alignement de Chêne pédonculé à l'Est et au Nord-Est) présente également un enjeu modéré (enjeu intrinsèque).

Les enjeux écologiques au droit du projet et de la zone d'étude sont présentés sur la planche 7 ci-après.



7

Ech 1:2 000

Enjeux écologiques

ATOL

Prédiagnostic écologique
Projet d'aménagement
Salaunes (33)

REALYS ENVIRONNEMENT

9. Calendrier des inventaires de terrain

Tableau 9 : Calendrier d'inventaires

Thématique	Date	Expert	Méthodologie d'inventaire
Flore et habitats	5 mars 2026	Jules TAVERNIER	- Regroupement en milieux homogènes et inventaire floristique
Avifaune			- Prospection à vue - Points d'écoutes
Herpétofaune			- Recherche d'habitats favorables et de gites - Prospection à vue
Entomofaune			- Recherche d'habitats favorables, prospections au filet à papillon et filet fauchoir - Prospection à vue
Mammifères terrestres			- Recherche d'habitats favorables et de traces - Prospection à vue
Chiroptères			- Recherche d'arbres gîtes

Annexes

Annexe 1 : Espèces patrimoniales

Ecureuil roux

Sciurus vulgaris

Statut de protection	Protection nationale : Art 2	Convention de Bonn : /	Convention de Berne : An. III	Directive Habitats : /
Statut de conservation	Liste rouge nationale : LC		Liste rouge régionale : /	



Figure 8 : Photographie de l'Ecureuil roux (Source : INPN)




Figure 9 : Répartition de l'Ecureuil roux en France et en Aquitaine

(à gauche : en France jusqu'en 2017 – INPN ; à droite : en Aquitaine entre 2018 et 2022 – Faune Aquitaine)

L'Ecureuil roux est un hôte habituel des milieux forestiers mais peut aussi fréquenter les parcs urbains ou les régions bocagères. La reproduction de l'espèce a lieu entre mars et juillet. Le gîte de l'Ecureuil roux correspond à plusieurs nids sphériques construits à l'aide de rameaux ou de petites branches. Il se nourrit majoritairement de graines de conifères, de faines et de noisettes, de glands, de noix, de fruits, de baies, de champignons ou encore d'escargots.

Période d'observations	J F M A M J J **A** S O N D
Habitats d'observations	Boisements
Statut sur le site	Ensemble du cycle de vie
Enjeu sur le site	**Faible**

Lézard des murailles

Podarcis muralis



Figure 10 : Photographie de Lézard des murailles

Statut de protection	Protection nationale : Art 2	Convention de Bonn : /	Convention de Berne : An. II	Directive Habitats : An. IV
Statut de conservation	Liste rouge nationale LC		Liste rouge régionale LC	




Figure 11 : Répartition du Lézard des murailles en France métropolitaine et en Aquitaine
(à gauche : en France métropolitaine – INPN ; à droite : *en Aquitaine entre 2020 et 2025 – FAUNA*)

Le Lézard des murailles préfère les substrats solides rocailleux bien ensoleillés. Cependant, il s'agit d'une espèce ubiquiste affectionnant une diversité de milieux naturels et anthropiques.
Ainsi, une zone ensoleillée la quasi-totalité de la journée confère un bon potentiel de chauffe indispensable au métabolisme de ce reptile ectotherme. Le Lézard des murailles est l'espèce de reptiles la plus abondante au niveau national. Il colonise la totalité des départements de la métropole, à l'exception de la Corse. Il est présent dans toute la région Nouvelle Aquitaine. Il peut se rencontrer à plus de 2000 m en altitude. Les individus de l'Aquitaine appartiennent à la sous-espèce *P.m. brogniardii.* Les principales menaces sont la disparition de son habitat (rénovations d'anciens murets), les pesticides, et la prolifération des chats domestiques, qui en capturent une grande quantité. Ce lézard est classé comme espèce de « préoccupation mineure » au titre des listes rouge des reptiles (nationale et régionale).

Période d'observations	J F **M** A M J J A S O N D
Habitats d'observations	Milieux ouverts de la ZIP.
Statut sur le site	Ensemble du cycle de vie dans les boisements.
Enjeu sur le site	**Faible**

Pipit farlouse

Anthus pratensis

Statut de protection	Protection nationale : Art 3	Convention de Bonn : /	Convention de Berne : An. II	Directive Oiseaux : /
Statut de conservation	Liste rouge nationale VU		Liste rouge régionale /	



Figure 12 : Photographie de Pipit farlouse adulte (source : Oiseau.net)




Figure 13 : Répartition du Pipit farlouse en Aquitaine

(en Aquitaine entre 2020 et 2025 – FAUNA)

Le Pipit farlouse fréquente les milieux humides et très découverts, où la végétation reste courte voire rase. Il se perche volontiers et à ce titre apprécie les arbrisseaux. L'espèce tolère la présence d'arbres isolés et de faible hauteur mais disparaît assez vite lorsque les boisements deviennent denses. En période de reproduction, le Pipit farlouse parait liée aux formations tourbeuses. Au passage et en hiver, les farlouses se répandent largement dans les chaumes, les champs de betteraves et les labours, dans les jachères, le long des rivages de la mer et les eaux douces où les attirent les traînées d'algues et de débris échoués. Au crépuscule, les farlouses gîtent à terre parmi les herbes, les feuilles ou sous des arbrisseaux ; cependant beaucoup aiment passer la nuit dans les roseaux, les osiers, les haies surtout par temps de neige (Source : INPN).

Période d'observation	J F **M** A M J J A S O N D
Habitats d'observations	Milieux ouverts de la ZIP et alignements de Chênes pédonculés
Statut sur le site	Nidification au niveau des milieux ouvert de la ZIP (lande à molinie, prairie x lande à molinie bleue entretenue). Alimentation dans les milieux semi ouverts (jardins, pelouse, jeunes plantations de Pins maritimes...)
Enjeu sur le site	**Modéré**