



26-EEE-079 - CR inventaires mai 2026

Projet de reboisement lieu-dit à Mont-Cauvaire

Diagnostic Zones Humides Faune Flore Habitats



Maître d'Ouvrage	
Mandataire	
	Service écologique 1, route de Saint-Martin 76590 DENESTANVILLE Tél 02 35 32 99 15 Courriel ecologie@pcm-ingenierie.fr

TABLE DES MATIERES

CHAPITRE I - CONTEXTE, LOCALISATION ET OBJECTIFS.....	5
I.1 - Contexte général et localisation	5
I.2 - Contexte écologique	6
I.3 - Objectifs.....	7
CHAPITRE II - INVENTAIRES MAI 2026.....	8
II.1 - Inventaire de la Flore	8
II.2 - Inventaire de la Faune	10
II.3 - Habitats.....	12
CHAPITRE III - CONCLUSION	12

CHAPITRE I - CONTEXTE, LOCALISATION ET OBJECTIFS

I.1 - Contexte général et localisation

La société DELSA, représentée par Monsieur DELABIE, propriétaire de plusieurs parcelles au lieu-dit Le Mesnil à MONT-CAUVAIRE souhaite reboiser une partie de sa propriété. L'ambition est d'améliorer la biodiversité par une sylviculture extensive raisonnée. Le boisement se voudra discontinu, composé de plusieurs essences locales et multistrates sur une superficie d'environ 22,5 ha (carte n°1). L'objectif de ce diagnostic est de permettre d'établir une gestion cohérente du milieu ayant pour but de maximiser la valeur écologique du site en fonction des travaux projetés. Un périmètre éloigné (jonction avec le site et les ZNIEFF de proximité) sera analysé en termes de corridors biologiques et ne fera pas l'objet d'inventaires exhaustifs.

La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature a fixé les principes et les objectifs de la politique nationale de la protection de la faune et de la flore sauvages. Les espèces protégées en droit français sont les espèces animales et végétales dont les listes sont fixées par arrêtés ministériels en application du code de l'environnement (L411-1 et 2). Lors de tout aménagement, un état initial faune flore doit être réalisé afin de déterminer l'impact du projet sur les espèces sauvages en place et leurs habitats pour définir les effets directs et indirects du projet sur ceux-ci. Si impact avéré il y a, des mesures d'atténuations et des mesures compensatoires devront être proposées.



Figure 1 : Cartographie du périmètre d'étude

I.2 - Contexte écologique

L'aire d'étude est à proximité de plusieurs ZNIEFF, parmi lesquelles :

- ZNIEFF de Type 1 :
 - Cardonville ;
 - La côte des essarts ;
 - Le bois de Cordelleville ;
 - Le bois de la vente des pierres ;
 - Le bois Hébert, le chemin des Chasse-marée ;
- ZNIEFF de Type 2 :
 - La Vallée du Cailly.




Figure 2 : Site ZNIEFF autour de l'aire d'étude

Ces ZNIEFF sont caractérisées par une diversité régionale importante et constituent des zones de refuge pour la faune et la flore. Elle joue aussi un rôle de régulation des facteurs climatiques, de protection contre l'érosion et un rôle de rupture des grands espaces agricoles. Les principaux intérêts sont d'ordre écologique, botanique, faunistique et la présence de nombreuses espèces rares. La typologie des habitats est caractérisée par les pelouses calcicoles, les bois calcicoles, les forêts alluviales, les prairies humides et les cours d'eau du plus xériques aux plus hygrophiles, abritant une flore (Ail des ours, orchidées, etc.) et une faune (Chiroptères, Oiseaux, Amphibiens, Insectes etc.) remarquables. Nombre de ces habitats sont des lieux d'échanges et de passages.

Les milieux entourant l'aire d'étude semblent être bien conservés dans le secteur avec une diversité importante mais avec toutefois une forte pression agricole au niveau des plateaux.

I.3 - Objectifs

Les objectifs de la présente étude sont les suivants :

- ⇒ Recenser l'ensemble des habitats naturels de l'aire d'étude ;
- ⇒ Effectuer une reconnaissance du site précisant son contexte général et les différents types de formations végétales existantes (unités écologiques) ;
- ⇒ Réaliser le recensement de la flore existante et définir l'intérêt qu'elles représentent (par la synthèse des données existantes et la réalisation d'inventaires sur site) ;
- ⇒ Cibler la présence d'espèces protégées et/ou patrimoniales floristiques notamment celles citées dans les ZNIEFF connexes ;
- ⇒ Compléter cet inventaire floristique avec l'inventaire de la faune observée au moment des passages Flore ;
- ⇒ Rédiger un bilan de la sensibilité générale du site sur le plan écologique et de la fonctionnalité de la zone humide en place ;
- ⇒ Evaluer l'état des habitats et des populations d'espèces patrimoniales ;
- ⇒ Proposer des préconisations afin de favoriser la biodiversité sur le site en restaurant la fonctionnalité sans perturber les usages.

Les objectifs de cette étude sont donc d'effectuer des reconnaissances floristiques et faunistiques, en dégager les enjeux afin d'appréhender les impacts du projet sur ceux-ci. Il s'agit de maintenir la biodiversité existante en fonction des usages projetés.

CHAPITRE II - INVENTAIRES MAI 2026

II.1 - Inventaire de la Flore

Un second passage sur les sites a été réalisé les **26 et 28 mai 2026**. Ce passage a été réalisé en deux demi-journées au regard des fortes chaleurs enregistrées (supérieur à 30°C à midi). La liste flore a été actualisée et est fournie en annexe 1.

Toutes parcelles confondues, ce sont **124 (+39) espèces de flore** qui ont été observées. La majorité sont communes à très communes. Une seule espèce exotique envahissante a été détectée pour l'heure : un pied de solidage au niveau du site 4. Deux espèces patrimoniales ont été contactées et 4 autres sont potentiellement patrimoniales. Les deux espèces patrimoniales sont également déterminantes ZNIEFF en Haute-Normandie.

- **Espèces patrimoniales ;**

Espèces patrimoniales		
<i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753	Brome mou (s.l.)	pp
<i>Centaurea gr. jacea</i>	Centaurée jacée (groupe)	PP
<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886	Conopode dénudé (s.l.)	oui
<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753	Berce commune (s.l.) ; Berce des prés	pp
<i>Rumex crispus</i> L., 1753	Patience crépue	pp
<i>Salix aurita</i> L., 1753	Saule à oreillettes ; Petit Marsault	oui
<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés	pp

- **2 espèces ZNIEFF et 3 autres potentielles ;**

Espèces potentiellement ZNIEFF		
<i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753	Brome mou (s.l.)	pp
<i>Centaurea gr. jacea</i>	Centaurée jacée (groupe)	PP
<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886	Conopode dénudé (s.l.)	oui
<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés	pp
<i>Salix aurita</i> L., 1753	Saule à oreillettes ; Petit Marsault	oui

- **16 espèces indicatrices de zones humides et trois en pro parte ;**

Espèces indicatrices de zones humides	
<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	Nat
<i>Cardamine pratensis</i> L., 1753	Nat
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	Nat
<i>Convolvulus sepium</i> L., 1753	Nat
<i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753	Natpp
<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	Nat
<i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753	Nat
<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	Nat
<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753	Nat
<i>Juncus effusus</i> L., 1753	Nat
<i>Mentha arvensis</i> L., 1753	Nat
<i>Plantago major</i> L., 1753	Natpp
<i>Prunus padus</i> L., 1753	Nat
<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	Nat
<i>Ribes rubrum</i> L., 1753	Nat
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770	Nat
<i>Rumex crispus</i> L., 1753	Natpp
<i>Salix aurita</i> L., 1753	Nat
<i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753	Nat

Flore observée en mai 2026



Renoncule et Trèfle des prés



Cardamine des prés et Houlque laineuse



Stellaire holostée



Véronique à feuille de serpolet



Myosotis des champs



Fromental



Vesse des haies



Marguerite

©PCM EEE, mai 2026

II.2 - Inventaire de la Faune

38 (+9) espèces d'oiseaux ont été observées en cumul pour ces deux nouveaux passages. Parmi celles-ci, deux sont peu communes en Normandie : Le **Faucon crécerelle** et le **Faisan de Colchide** ; et une espèce est quasi-menacée sur liste rouge régionale : le **Bruant jaune**. La **Chevêche d'Athéna** a également été entendue mais reste à confirmer.

3 mammifères ont été recensés pour le moment : le Sanglier, la Taupe et le Chevreuil.

Aucun reptile ni amphibien n'a été détecté lors de ces passages. La présence d'un milieu un peu humide en en lisière forestière en zone 1 est susceptible d'accueillir le complexe des grenouilles rousses.

Au total, ce sont **43 (+28) insectes** qui ont été identifiées sur le terrain au cours des inventaires :

- **15 (+6) Papillons** communs excepté la **Zygène turquoise** rare et déterminante ZNIEFF en Normandie et la tordeuse du fraisier peu commune présentes sur la zone 3 ;
- **3 Orthoptères** communs dont la **Decticelle bariolée** affectionnant les milieux humides. Les individus sont tous juvéniles ;
- **10 (+8) Coléoptères** dont plusieurs sont plutôt rares ou du moins peu inventoriés sur le site ODIN en Normandie notamment **l'Axinotarsus, le Carabe purpurin et l'Harpalus nain**. La **Coccinelle asiatique** est également présente, cette espèce est invasive.
- **15 (+11) autres insectes** dont le **Carpocore pourpré, Clytre à grandes tâches, la Mouche voleuse, la Punaise des prairies et le Tipule à ailes barrées**, espèces peu communes dans les inventaires ODIN. La présence de la **Cicadelle verte** en zone 1 confirme la présence d'une petite zone humide sur la parcelle.

Une espèce de Mollusque est bien représentée sur l'ensemble des sites. Il s'agit de **l'Escargot des haies**.

Les six espèces patrimoniales observées pour le moment sont les suivantes :

Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua (Scopoli, 1769)</i>
Zygène turquoise	<i>Adscita stalius (Linnaeus, 1758)</i>
Axinotarsus marginalis	<i>Axinotarsus marginalis (Castelnau, 1840)</i>
Carabe purpurin	<i>Carabus violaceus purpurascens (Fabricius, 1787)</i>
Harpalus nain	<i>Harpalus pygmaeus (Dejean, 1829)</i>
Téléphone maison	<i>Cantharis fusca (Linnaeus, 1758)</i>

La Liste complète est fournie en annexe 2. Des illustrations des espèces observées en mai sont présentées page suivante.

Faune observée en mai 2026



Zygène turquoise



Chenilles du Paon du jour



Noctuelle à ligne argentée



Téléphore maison



Agapanthie à pilosité verdâtre



Carabe purpurin



Coccinelle asiatique



Ggrande sauterelle verte juvénile

©PCM EEE, Mai 2026

II.3 - Habitats

Pour l'heure, les habitats sont assez homogènes. Il s'agit majoritairement de parcelles liées à l'agriculture. Les habitats sont les suivants :

- Jachères,
- Cultures ;
- Prairie de fauche,
- Haies,
- Bosquets ;
- Zone humide temporaire sur argile en zone 1.

CHAPITRE III - CONCLUSION

En cumul pour ces nouveaux passages, ce sont **85** espèces **en flore** et **85 (+38) en faune** qui ont été observés. La diversité floristique est assez commune et lié aux usages agricoles. La mosaïque d'habitats est propice à la faune.

Au regard de la diversité observée et la présence d'une petite zone humide en zone 1, il serait judicieux de faire un passage complémentaire le 19 juin au moins sur cette parcelle qui semble être celle avec le plus d'enjeux biodiversité.

Localisation de l'aire d'étude



Planning Prévisionnel : INVENTAIRES FAUNE FLORE HABITATS Mont-Cauvaire 26-EEE-079

	Flore/habitats	Oiseaux	Mammifères	Amphibiens	Reptiles	Insectes
Printemps 2026						
24-avr.-26	x	x	x	x	(x)	(x)
26-mai-26	x	x	x	x	x	x
OPTION Eté 2026						
19-juin-26	x	x	x	x	x	x
Dates fermes						
Dates option						
(x) groupe observable selon conditions météo de l'année en cours						
Passage réalisé						

Pièces jointes :

Année 1 Liste Flore Mont Cauvaire mai 2026
Annexe 2 Liste Faune Mont Cauvaire mai 2026

FA/MM– Juin 2026



26-EEE-079

Projet de reboisement pour la recomposition paysagère et écologique du plateau du Mesnil à Mont-Cauvaire Préconisations des plantations



Maître d'Ouvrage	
Mandataire	
	Service écologique 1, route de Saint-Martin 76590 DENESTANVILLE Tél 02 35 32 99 15 Courriel ecologie@pcm-ingenierie.fr

TABLE DES MATIERES

CHAPITRE I - CONTEXTE	3
CHAPITRE II - RAPPEL DES ENJEUX IDENTIFIES	4
CHAPITRE III - PRECONISATIONS ET CHOIX DES ESSENCES	5

CHAPITRE I - CONTEXTE

A Mont-Cauvaire (Seine-Maritime, Pays de Caux), nous sommes sur un territoire de plateau limoneux, souvent venté, avec un climat océanique (carte n°1). L'objectif est de recréer des éléments du bocage cauchois en privilégiant exclusivement des essences locales, ce qui favorise les insectes pollinisateurs, les oiseaux, les chauves-souris et les auxiliaires des cultures. Les recommandations officielles de la Seine-Maritime insistent sur la diversité des essences (10 à 15 espèces minimum) plutôt que sur des plantations monospécifiques. Les inventaires ont été réalisés sur les 4 grandes zones présentées sur la carte n°1.



Carte n° 1 Localisation des parcelles

CHAPITRE II - RAPPEL DES ENJEUX IDENTIFIES

En cumul pour les différents passages sur site, ce sont **85 espèces en flore** et **85 en faune** qui ont été observés. La diversité floristique est assez commune et liée aux usages agricoles. La mosaïque d'habitats est propice à la faune.

Au regard de la diversité observée et de la présence d'une petite zone humide, il serait judicieux de ne pas boisier la zone n°1 et de conserver sa gestion actuelle.

Localisation de l'aire d'étude



Les enjeux écologiques sont définis carte n°2.



Carte n° 2 Enjeux écologiques de la zone d'étude

CHAPITRE III - PRECONISATIONS ET CHOIX DES ESSENCES

Pour un projet de boisement sur les parcelles agricoles zones 1 à 3 à Mont-Cauvaire, l'objectif principal est d'augmenter la biodiversité tout en conservant une faible emprise sur les terres cultivées. Il s'agit de mettre en place **plusieurs bosquets de 500 à 2 000 m² reliés entre eux par quelques arbres isolés ou de courtes haies**, plutôt qu'un seul grand bosquet. Cela crée davantage de lisières (écotones), qui sont les zones les plus riches écologiquement.

Arbres principaux (40% du peuplement)

Chêne pédonculé (*Quercus robur*) : l'espèce la plus intéressante pour la biodiversité.

Tilleul à petites feuilles (*Tilia cordata*) : floraison très favorable aux insectes.

Charme commun (*Carpinus betulus*) : excellent accompagnement du chêne.

Érable champêtre (*Acer campestre*) : très adapté au Pays de Caux.

Alisier torminal (*Sorbus torminalis*) : espèce locale de grand intérêt écologique et intéressant par rapport aux changements climatiques.

Arbres secondaires (30% du peuplement)

Merisier (*Prunus avium*)

Pommier sauvage (*Malus sylvestris*)

Poirier sauvage (*Pyrus pyraster*)

Sorbier des oiseleurs (*Sorbus aucuparia*)

Ces espèces augmentent fortement l'intérêt pour les oiseaux et les pollinisateurs.

Ceintures arbustives périphériques (30% du peuplement)

Aubépine monogyne (*Crataegus monogyna*) : ses fruits nourrissent la faune en automne et hiver.

Prunellier (*Prunus spinosa*) : son feuillage dense et ses épines offrent un excellent refuge pour la faune. Ses fruits sont source de nourriture en fin de saison.

Noisetier (*Corylus avellana*) : source de pollen précoce et fruits consommés par de nombreuses espèces.

Églantier (*Rosa canina*) : rôles multiples pour les pollinisateurs et les oiseaux.

Cornouiller sanguin (*Cornus sanguinea*) : rôles multiples pour les pollinisateurs et les oiseaux.

Viorne obier (*Viburnum opulus*) : rôles multiples pour les pollinisateurs et les oiseaux.

Sureau noir (*Sambucus nigra*) : rôles multiples pour les pollinisateurs et les oiseaux.

Fusain d'Europe (*Euonymus europaeus*) : ressource importante pour plusieurs insectes, notamment certains papillons de nuit et oiseaux.

Les proportions idéales sont les suivantes :

- 40 % de chênes pédonculés ;
- 15 % de tilleuls ;
- 15 % de charmes ;
- 10 % d'érables champêtres ;
- 20 % d'autres essences (merisier, alisier, pommier sauvage, poirier sauvage, etc.).

Projet de reboisement à Mont-Cauvaire Préconisations	26-EEE-079
	17/07/2026

Autour du bosquet, une couronne d'arbustes sur 3 à 5 m de large crée un effet de lisière très favorable à la faune. Les lisières sont souvent plus riches en biodiversité que l'intérieur du bosquet lui-même. Pour un projet de boisement en Seine-Maritime, le chêne pédonculé reste généralement l'espèce à privilégier, car c'est celle qui héberge le plus grand nombre d'insectes, lesquels nourrissent ensuite les oiseaux, chauves-souris et autres auxiliaires. Un bosquet dominé par le chêne mais mélangé à 8 à 12 autres essences locales est souvent la meilleure option écologique.

Objectif

Obtenir une véritable structure boisée avec plusieurs strates et une bonne production de fleurs, fruits et cavités à long terme. Il ne faut pas dépasser les 40% d'une seule essence afin d'éviter les risques sanitaires et climatiques futurs.

Compte tenu du réchauffement climatique observé en France et en Normandie, il pourrait être ajouté 5 à 10 % des plantations à des essences locales ou régionales plus tolérantes aux sécheresses :

- Alisier blanc
- Chêne sessile
- Torminal (augmenter sa part)

Il peut également avoir des variantes selon le type de sols en place sur lesquels on peut ajouter :

Sols frais à humides : Saule blanc, Saule marsault, Bourdaine, Aulne glutineux.

Sols profonds frais neutres à acides : Hêtre, Chataignier, Noyer, Fusain d'Europe.

Sols plus ou moins secs : Bouleau verruqueux, Néflier, Cormier.

Concernant les linéaires de haies et les arbres isolés jouant le rôle de corridors entre les différents bosquets, la liste des espèces à utiliser et leur proportion sont présentés ci-dessous et page suivante.

Pour 100 m de haie :

- 60 à 70 % d'arbustes
- 20 à 30 % de petits arbres
- 10 % de grands arbres laissés à maturité

Exemple :

- | | |
|--------------------|------------------------|
| • 15 % Aubépine | • 10 % Viorne |
| • 15 % Prunellier | • 10 % Fusain |
| • 10 % Noisetier | • 10 % Charme |
| • 10 % Cornouiller | • 5 % Érable champêtre |
| • 10 % Églantier | • 5 % Merisier |

Et tous les 20 à 30 m :

- un Chêne,
- ou un Tilleul,
- ou un Merisier.

Cette diversité permet d'étaler la floraison, d'offrir des fruits à différentes saisons et de limiter les risques liés aux maladies.

Projet de reboisement à Mont-Cauvaire Préconisations	26-EEE-079
	17/07/2026

Quelques conseils

A proscrire : arbres et arbustes non locaux, exotiques, toxiques ou invasifs (Robinier, Erable negundo, Erable sycomore, Thuya, Chêne rouge, etc.).

Utiliser des plants d'origine locale (issus de pépinières situées à proximité si possible).

Prévoir une largeur de haie de 3 à 5 m pour maximiser son rôle écologique.

Si possible, relier les nouvelles haies aux bois, mares ou haies existantes afin de **créer des corridors écologiques**.

Un schéma exemple est proposé page suivante.

FA– Juillet 2026

SCHÉMA DE PLANTATION – RÉSEAU DE BOSQUETS ET ÉLÉMENTS RELAIS

Mont-Cauvaire (76) – Plateau limoneux légèrement pentu




PRINCIPES

- Créer un réseau d'îlots boisés de tailles variées.
- Relier les bosquets entre eux par des arbres isolés et favoriser leur connexion avec les boisements voisins.
- Favoriser la biodiversité, les déplacements de la faune et la résilience des paysages.
- Maintenir des espaces de prairie entre les bosquets pour préserver une mosaïque de milieux ouverts et boisés.
- Essences locales et adaptées au Pays de Caux.


LÉGENDE




EXEMPLE 1 – RÉSEAU DIVERSIFIÉ




EXEMPLE 2 – STRUCTURE LINÉAIRE



EXEMPLE 3 – STRUCTURE MONUMENTALE (AUGNÉE)



EXEMPLE 4 – STRUCTURE EN GRADIENT



Perspective visuelle à préserver

Boisement dense existant Boisement moins dense en continuité Lisière étagée Prairie ouverte

Gradient de densité et de hauteur de la végétation

COMPOSITION TYPE D'UN BOSQUET



RÔLE DES ÉLÉMENTS PAYSAGERS




PALETTE D'ESSENCES LOCALES (à privilégier)

Arbres de haut jet
Chêne pédonculé, Charme commun, Tilleul à petites feuilles, Érabre champêtre

Arbres secondaires
Merisier, Aulxier torminal, Pommier sauvage, Poirier sauvage, Cornier, Sorbier des oiselleux

Arbustes de lisière
Aubépine, Néflier, Églantier, Cornouiller sanguin, Prunellier, Viorne obier, Fusain d'Europe

COUPE DE PRINCIPE D'UN GRADIENT DE LISIÈRE



Continuité écologique renforcée



Protection des sols et de l'eau



Paysage diversifié et attractif



Meilleure résilience

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

- Planter à l'automne ou en hiver.
- Paillasson au pied des plants.
- Protection gélive si nécessaire les premières années.

- Entretenir les haies en recépage/taille tous les 8 à 12 ans.
- Laisser évoluer naturellement les bosquets (interventions douces et espacées).

Schéma indicatif – Adaptation à affiner selon les contraintes du site.

Flore Mont-Cauvaire
24/04/2026 - 26/05/2026-28/05/2026

									24/04/2026				26/05/2026		28/05/2026
Nom complet	Nom français	Statut indigénat	Rareté	Menace Région	Statut	Intérêt patrimonial	Déterminant ZNIEFF	Indicateur ZH	Site 1	Site 2	Site 3	Site 4	Site 3	Zone 4	Site 1 et 2
<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	Érable sycomore ; Sycomore	I?	CC	LC								x		x	
<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	Achillée millefeuille	I	CC	LC					x	x	x				x
<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	Bugle rampante	I	C	LC					x	x		x			
<i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753	Vulpin des prés (s.l.)	I	C	LC									x	x	x
<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	Angélique sauvage (s.l.)	I	C	LC				Nat	x						
<i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski, 1934	Brome stérile	I	CC	LC						x					x
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	Flouve odorante	I	C	LC					x	x	x		x		x
<i>Anthriscus cf sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814	Cerfeuil des bois (s.l.) ; Cerfeuil sauvage	I	CC	LC					x						x
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	Fromental élevé (s.l.)	I	CC	LC							x				x
<i>Arum maculatum</i> L., 1753	Gouet tacheté	I	CC	LC							x	x			
<i>Bellis perennis</i> L., 1753	Pâquerette vivace	I	CC	LC							x				
<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	Bouleau verruqueux	I	CC	LC										x	x
<i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753	Brome mou (s.l.)	I	CC	LC		pp	pp			x	x		x		x
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792	Capselle bourse-à-pasteur	I	CC	LC										x	
<i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753	Cardamine hérissée	I	CC	LC							x				
<i>Cardamine pratensis</i> L., 1753	Cardamine des prés ; Cresson des prés	I	C	LC				Nat	x		x		x		
<i>Carex hirta</i> L., 1753	Laïche hérissée ; Laïche velue	I	C	LC											x
<i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762	Laïche des forêts (s.l.)	I	CC	LC							x				
<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	Charme commun	I	CC	LC						x	x	x		x	x
<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768	Châtaignier commun	Z;C	C	NA									x		x
<i>Centaurea gr. jacea</i>	Centaurée jacée (groupe)	I	CC	NA		pp	pp						x		x
<i>Centaurea</i> L., 1753	Centaurée (G)									x					
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816	Céraiste commun (s.l.)	I	CC	LC						x			x	x	x
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799	Céraiste aggloméré	I	CC	LC					x		x	x			x
<i>Chenopodium album</i> L., 1753	Chénopode blanc (s.l.)	I	CC	LC											x
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des champs	I	CC	LC							x		x	x	x
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des marais	I	C	LC				Nat					x	x	x
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	Cirse commun (s.l.)	I	CC	LC					x		x		x	x	x
<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886	Conopode dénué (s.l.)	I	PC	LC		Oui	Oui							x	
<i>Convolvulus sepium</i> L., 1753	Liseron des haies	I	CC	LC				Nat		x					x
<i>Corylus avellana</i> L., 1753	Noisetier commun ; Noisetier ; Coudrier	I	CC	LC											x
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style	I	CC	LC						x	x	x	x	x	x
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840	Crépide capillaire	I	CC	LC											x
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852	Gaillet croisette	I	C	LC						x					x
<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	Dactyle aggloméré (s.l.)	I	CC	LC					x	x	x		x	x	x
<i>Digitalis purpurea</i> L., 1753	Digitale pourpre	I	C	LC					x						x
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	Fougère mâle	I	CC	LC										x	
<i>Epilobium</i> sp	Epilobe								x		x	x			
<i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753	Épilobe à quatre angles (s.l.) ; Épilobe à tige carrée (s.l.)	I	CC	LC				Natpp							x
<i>Equisetum arvense</i> L., 1753	Prêle des champs	I	CC	LC							x				x
<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	Eupatoire chanvrine (s.l.)	I	CC	LC				Nat	x						x
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753	Euphorbe des bois (s.l.)	I	CC	LC					x						
<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	Hêtre commun ; Hêtre	I	CC	LC						x			x		x
<i>Ficaria verna</i> Huds., 1762	Ficaire fausse renoncule ; Ficaire	I	CC	LC					x	x	x				
<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	Frêne commun	I	CC	LC						x	x		x		x
<i>Galium aparine</i> L., 1753	Gaillet gratteron (s.l.)	I	CC	LC					x	x	x	x	x	x	x
<i>Galium gr. mollugo</i>	Gaillet mollugine (groupe) ; Caille-lait blanc	I	CC	NA											x
<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	Géranium découpé	I	CC	LC					x	x	x				x
<i>Geranium pusillum</i> L., 1759	Géranium fluët	I	C	LC										x	
<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	Géranium herbe-à-Robert ; Herbe à Robert	I	CC	LC						x			x		x
<i>Geum urbanum</i> L., 1753	Benoîte commune	I	CC	LC							x				x
<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	Lierre terrestre ; Gléchome lierre terrestre	I	CC	LC						x	x	x	x		
<i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753	Gnaphale des fanges	I	C	LC				Nat						x	
<i>Hedera helix</i> L., 1753	Lierre grimpant	I	CC	LC						x	x		x		
<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753	Berce commune (s.l.) ; Berce des prés	I	CC	LC		pp			x	x	x		x		
<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	Houlique laineuse (s.l.)	I	CC	LC						x	x		x	x	x
<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	Jacinthe des bois	I	C	LC					x		x	x	x		
<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	Millepertuis perforé ; Herbe à mille trous	I	CC	LC								x			x
<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	Porcelle enracinée	I	CC	LC											x
<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Houx	I	CC	LC						x					x
<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791	Séneçon jacobée (s.l.) ; Jacobée	I	CC	LC						x					
<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	Jonc des crapauds	I	C	LC				Nat							x
<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753	Jonc aggloméré	I	C	LC				Nat	x		x	x			
<i>Juncus effusus</i> L., 1753	Jonc épars	I	CC	LC				Nat					x	x	

<i>Lamium album</i> L., 1753	Lamier blanc ; Ortie blanche	I	CC	LC					x		x				
<i>Lamium galeobdalon</i> (L.) L., 1759	Lamier jaune (s.l.) ; Ortie jaune	I	C	LC								x			
<i>Lapsana communis</i> L., 1753	Lampsane commune (s.l.)	I	CC	LC											x
<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753	Gesse des prés	I	C	LC						x					x
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	Grande marguerite (diploïde)	I	AC?	DD							x				x
<i>Lolium perenne</i> L., 1753	Ray-grass anglais ; Ray-grass commun ; Ivraie vivace	I	CC	LC									x	x	
<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753	Lotier corniculé (s.l.)	I	CC	LC									x		x
<i>Matricaria chamomilla</i> L., 1753	Matricaire camomille	I	CC	LC										x	x
<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	Luzerne lupuline ; Minette ; Mignonnette	I	CC	LC						x			x		x
<i>Mentha arvensis</i> L., 1753	Menthe des champs	I	AC	LC				Nat						x	
<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764	Myosotis des champs (s.l.)	I	CC	LC										x	x
<i>Persicaria maculosa</i> Gray, 1821	Renouée persicaire ; Persicaire	I	CC	LC											x
<i>Phleum pratense</i> L., 1753	Fléole des prés	I	C	LC						x	x				
<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	Plantain lancéolé	I	CC	LC					x	x	x	x	x	x	
<i>Plantago major</i> L., 1753	Plantain à larges feuilles (s.l.)	I	CC	LC				Natpp		x		x		x	x
<i>Poa annua</i> L., 1753	Pâturin annuel (s.l.)	I	CC	LC						x	x				
<i>Poa pratensis</i> L., 1753	Pâturin des prés (s.l.)	I	C	LC								x	x		x
<i>Poa trivialis</i> L., 1753	Pâturin commun (s.l.)	I	CC	LC									x	x	x
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785	Sceau-de-Salomon multiflore ; Muguet de serpent	I	CC	LC								x		x	
<i>Populus tremula</i> L., 1753	Peuplier tremble ; Tremble	I	C	LC						x					x
<i>Primula veris</i> L., 1753	Primevère officinale ; Coucou	I	C	LC									x		
<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	Merisier (s.l.)	I	CC	LC						x					x
<i>Prunus padus</i> L., 1753	Cerisier à grappes ; Putiet	C	RR	NA				Nat							x
<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	Prunellier ; Épine noire	I	CC	LC					x						x
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Fougère aigle (s.l.)	I	CC	LC							x	x	x	x	x
<i>Quercus robur</i> L., 1753	Chêne pédonculé	I	CC	LC					x	x	x		x		x
<i>Ranunculus acris</i> L., 1753	Renoncule âcre (s.l.)	I	CC	LC					x	x	x		x	x	x
<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	Renoncule rampante	I	CC	LC				Nat	x	x	x	x	x	x	x
<i>Ribes rubrum</i> L., 1753	Groseillier rouge ; Groseillier à grappes	I;C	C	LC				Nat			x				
<i>Rosa canina</i> L., 1753	Rosier des chiens	I	?	DD						x					x
<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753	Ronce commune	#	#	#					x	x	x	x	x	x	x
<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	Grande oseille (s.l.) ; Oseille des prés	I	CC	LC					x	x	x		x		x
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770	Patience agglomérée	I	C	LC				Nat						x	
<i>Rumex crispus</i> L., 1753	Patience crépue	I	CC	LC		pp		Natpp	x		x	x	x		x
<i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753	Patience à feuilles obtuses (s.l.)	I	CC	LC					x	x	x	x	x	x	x
<i>Salix aurita</i> L., 1753	Saule à oreillettes ; Petit Marsault	I	AR	NT		Oui	Oui	Nat							x
<i>Salix caprea</i> L., 1753	Saule marsault ; Saule des chèvres	I	CC	LC											x
<i>Salix</i> L., 1753	Saule (G)									x					
<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	Sureau noir	I	CC	LC						x					x
<i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753	Scrofulaire aquatique (s.l.)	I	C	LC				Nat				x			
<i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753	Scrofulaire noueuse	I	C	LC										x	
<i>Senecio vulgaris</i> L., 1753	Séneçon commun (s.l.)	I	CC	LC											x
<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811	Silène dioïque ; Compagnon rouge	I	C	LC					x	x					x
<i>Solidago</i> L., 1753	Solidage (G)		Sub											x	
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769	Laiteron rude (s.l.) ; Laiteron épineux	I	CC	LC											x
<i>Stellaria graminea</i> L., 1753	Stellaire graminée	I	C	LC											x
<i>Stellaria holostea</i> L., 1753	Stellaire holostée	I	CC	LC					x	x			x		x
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789	Stellaire intermédiaire ; Mouron des oiseaux ; Mouron blanc	I	CC	LC						x		x			
<i>Taraxacum</i> F.H.Wigg.	Pissenlit (G)		CC						x	x	x	x	x	x	x
<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés	I	CC	LC		pp	pp				x	x		x	x
<i>Trifolium repens</i> L., 1753	Trèfle blanc ; Trèfle rampant	I	CC	LC							x		x	x	x
<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip., 1844	Matricaire inodore	I	CC	LC							x	x			
<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	Ajonc d'Europe (s.l.)	I	C	LC						x					x
<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Grande ortie (s.l.) ; Ortie dioïque (s.l.)	I	CC	LC					x	x	x	x	x	x	x
<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753	Véronique petit-chêne	I	CC	LC						x	x		x	x	
<i>Veronica persica</i> Poir., 1808	Véronique de Perse ; Véronique commune	Z	CC	NA									x		
<i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753	Véronique à feuilles de serpolet (s.l.)	I	C	LC								x		x	x
<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1821	Vesce hérissée	I	C	LC							x				x
<i>Vicia sepium</i> L., 1753	Vesce des haies	I	CC	LC						x	x				x
<i>Viscum album</i> L., 1753	Gui (s.l.)	I	CC	LC									x		
124	espèces				0	7	5	19	21	29	34	17	44	40	80

24/04/2026 - 26/05/2026-28/05/2026

[illegible]

Lépidoptères										
Aurore	<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)	45	LC			x				
Azuré des Nerpruns	<i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)	CC	LC			x			x	
Belle dame	<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)	CC	LC					x		x
Carte géographique	<i>Araschnia levana</i> (Linnaeus, 1758)	C	LC		x		x			
Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	C	LC		x					
Cuivré commun	<i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1761)	CC	LC			x	x			
Gamma	<i>Autographa gamma</i> (Linnaeus, 1758)	CC	NE			x				
Myrtil	<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	CC	LC							x
Noctuelle à ligne argentée	<i>Petrophora Chlorosata</i> (Scopoli, 1763)	AC	NE						x	
Paon du jour	<i>Aglais io</i> (Linnaeus, 1758)	CC	LC		x	x			x	x
Robert le diable	<i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758)	C	LC		x					
Tircis	<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	C	LC							x
Tordeuse de fraisier	<i>Celypha lacunana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	PC	NE					x		
Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	CC	LC		x	x			x	
Zygène turquoise	<i>Adscita statius</i> (Linnaeus, 1758)	R	LC	ZNIEFF				x		
		15	espèces							
Othoptère										
Criquet mélodieux	<i>Chorthippus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758)	C	LC							x
Decticelle bariolée	<i>Roeseliana roeselii</i> (Hagenbach, 1822)	CC	LC							x
Grande sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)	CC	LC							x
		3	espèces							
Coléoptères										
Agapanthie à pilosité verdâtre	<i>Agapanthia villosoviridescens</i> (De Geer, 1775)	PC	NE							x
Axinotarsus marginalis	<i>Axinotarsus marginalis</i> (Castelnau, 1840)	RR	LC					x		
Carabe purpurin	<i>Carabus violaceus purpurascens</i> (Fabricius, 1787)	AR	NE							x
Chrysomèle du peuplier	<i>Chrysomela populi</i> Linnaeus, 1758	C	NE		x					
Coccinelle asiatique	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Invasive	NA						x	
Coccinelle 7 points	<i>Coccinella septempunctata</i> (Linnaeus, 1758)	C	NE		x	x		x		x
Harpalus nain	<i>Harpalus pygmaeus</i> (Dejean, 1829)	AR	NE					x		x
Charençon Hoplia	<i>Hoplia</i> sp. (Illiger, 1803)	?	NE					x		
Oedemère noble	<i>Oedemera nobilis</i> (Scopoli, 1763)	AC	NE							x
Téléphone maison	<i>Cantharis fusca</i> (Linnaeus, 1758)	R	NE					x	x	
		10	espèces							
Autres insectes										
Abeille domestique	<i>Apis mellifera</i> (Linnaeus, 1758)	CC	LC					x	x	x
Bourdon des pierres	<i>Bombus lapidarius</i> (Linnaeus, 1758)	CC	LC					x	x	
Bourdon terrestre	<i>Bombus terrestris</i> (Linnaeus, 1758)	CC	NE			x			x	
Carpocore pourpré	<i>Carpocoris purpureipennis</i> (De geer, 1773)	PC	NE							x
Cicadelle verte	<i>Cicadella viridis</i> (Linnaeus, 1758)	C	NE							x
Clytre à grandes taches	<i>Clytra laeviuscula</i> Ratzeburg, 1837	PC	NE				x			
Corée marginée	<i>Coreus marginatus</i> (Linnaeus, 1758)	C	NE		x					
Frelon européen	<i>Vespa crabro</i> Linnaeus, 1758	CC	NE				x			
Mouche bleue	<i>Lucilia</i> sp. (Robineau Desvoidy, 1830)	C	NE							x
Mouche voleuse	<i>Choerades marginata</i> (Linnaeus, 1758)	PC	NE						x	
Parnope germanique	<i>Panorpa germanica</i> (Linnaeus, 1758)	AC	NE						x	x
Punaise des prairies	<i>Leptopterna dolabrata</i> (Linnaeus, 1758)	PC	NE							x
Tipule à ailes barrées	<i>Tipula fascipennis</i> (Meigen, 1818)	PC	NE							x
Tipule de printemps	<i>Tipula vernalis</i> (Meigen, 1804)	AC	NE					x		

Tipule des prairies	<i>Tipula paludosa</i> (Meigen, 1830)	CC	NE							x
	15	espèces								
Mollusques										
Escargot des haies	<i>Cepaea nemoralis</i> (Linnaeus, 1758)	CC							x	x
	1	espèce								
	85	espèces			32	32	13	26	33	49