

INVENTAIRES FAUNE FLORE HABITATS – Aménagement du Parc du Gier

Annexes



SOMMAIRE

INVENTAIRES FAUNE FLORE HABITATS – Aménagement du Parc du Gier

1

Annexes

1

SOMMAIRE

2

1 Statuts de protection et textes de références pour la faune

3

2 Cartes de répartitions des chiroptères visés par le PNA

8

3 Liste des espèces bibliographiques

29

3.1 Flore 29

3.2 Avifaune 59

3.3 Mammalofaune 70

3.4 Entomofaune 73

4 Liste des espèces inventoriées

83

4.1 Flore 83

5 Mesures préconisées

98

5.1 Adaptation de la période des travaux sur l'année 98

5.2 Gestion de l'éclairage 100

5.3 Vérification des arbres avant abattage 101

5.4 Vérification des bâtiments avant démolition 103

5.5 Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 104

1 STATUTS DE PROTECTION ET TEXTES DE REFERENCES POUR LA FAUNE

Source INPN

Réglementation

[C] - Convention CITES : convention relative à la réglementation du commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

Annexe I : regroupe les espèces les plus menacées d'extinction et dont le commerce international est interdit.

Annexe II : Espèces dont le commerce fait l'objet d'une réglementation stricte

Annexe III : Espèces qui font l'objet d'une protection uniquement à demande expresse du pays d'origine.

[Bo] - Convention de Bonn : convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage

Annexe I : espèces menacées en danger d'extinction.

Annexe II : espèces dont l'état de conservation est défavorable.

Accord AEWA : Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie. L'AEWA couvre 254 espèces d'oiseaux qui dépendent écologiquement des zones humides pendant au moins une partie de leur cycle annuel

[Be] - Convention de Berne : convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe

Annexe I : espèces de flore strictement protégées.

Annexe II : espèces de faune strictement protégées.

Annexe III : espèces de faune protégées mais une certaine exploitation est possible si le niveau si le niveau de population le permet.

[DO] - Directive Oiseaux : Directive 79/409/CEE du conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages

Annexe I : Liste des espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones de Protection Spéciale.

Annexe II : liste d'espèces d'oiseaux dont la chasse est autorisée sous certaines conditions (la partie 1 donne la liste des espèces autorisées à la chasse dans toute l'union, et la partie 2 celles autorisées seulement dans certains pays

Annexe III : liste d'oiseaux dont la destruction des individus mais aussi des nids, des œufs et des habitats, la vente et le transport pour la vente d'oiseaux vivants ou morts ou de toute partie obtenue à partir de l'oiseau, peuvent être autorisés sous certaines conditions.

[DH] - Directive Habitat-Faune-Flore : Directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages

Annexe I : Liste des types d'habitats naturels d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation

Annexe II : liste d'espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation

Annexe III : Critères de sélection des sites susceptibles d'être identifiés comme sites d'importance communautaire et désignés comme zones spéciales de conservation

Annexe IV : liste des espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte

Annexe V : Liste des espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesure de gestion

[P] - Protection nationale concernant les oiseaux : arrêté du 29/10/2009

Article 3 : Sont interdits la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel, la perturbation intentionnelle des animaux notamment en période de reproduction et l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente et l'achat, l'utilisation commerciale ou non des animaux.

Article 4 : Sont interdits la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel, la perturbation intentionnelle des animaux pour autant qu'elle remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée. Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente et l'achat, l'utilisation commerciale ou non des oiseaux.

Article 6 : Afin de permettre l'exercice de la chasse au vol le préfet peut délivrer pour ces espèces des autorisations exceptionnelles de désairage d'oiseaux, sous réserve du respect de certaines conditions.

[P] - Protection nationale concernant les mammifères : arrêté du 23/04/2007

Article 2 : Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente, ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente et l'achat, l'utilisation commerciale ou non des animaux.

[P] - Protection nationale concernant les amphibiens et les reptiles : arrêté du 08/01/2021

Article 2 : Sont interdits la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement des animaux dans le milieu naturel, la perturbation intentionnelle des animaux dans leur milieu naturel. Sont interdits également la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des

animaux. Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente et l'achat, l'utilisation commerciale ou non des animaux.

Article 3 : Sont interdits la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement des animaux dans le milieu naturel, la perturbation intentionnelle des animaux dans leur milieu naturel. Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente et l'achat, l'utilisation commerciale ou non des animaux.

Article 4 : Sont interdits la mutilation des animaux. Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente et l'achat, l'utilisation commerciale ou non des animaux.

[P] - Protection nationale concernant les insectes : arrêté du 23/04/2007

Article 2 : Sont interdits la destruction ou l'enlèvement des oeufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. Sont interdits également la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés

Article 3 : Sont interdits la destruction ou l'enlèvement des oeufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement des animaux. Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés.

[ECPR] - Espèces chassables / pêchable / ramassable :

Arrêté ministériel autorisant la chasse pour la Mammalofaune et l'avifaune, la pêche pour l'ichtyofaune et la batrachofaune, le ramassage pour certaines espèces de mollusques et de plantes.

[EN] - Espèces nuisibles :

Arrêté ministériel du 2 août 2012 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classées nuisibles.

Arrêté ministériel du 3 avril 2012 pris pour l'application de l'article R.427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d'espèces classées nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain du 1^{er} juillet 2012 au 30 juin 2013.

Arrêté préfectoral relatif au classement des animaux nuisibles et aux modalités de leur destruction dans les départements concernés.

Degré de menace

Niveau de menace mondial / européen / national / régional

Une Liste Rouge n'a pas de valeur juridique mais constitue un bilan à propos du niveau de menace de la faune à différentes échelles de territoire :

[LRM] – Liste rouge mondiale

[LRE] – Liste rouge européenne

[LRN] – Liste rouge nationale

[LRR] – Degré de menace régionale

En particulier pour les oiseaux, une évaluation est réalisée en fonction du statut biologique de l'espèce :

[LRNn] - Liste rouge nationale nicheur

[LRNh] - Liste rouge nationale hivernant

[LRNp] - Liste rouge nationale de passage

Les différentes catégories sont :

RE : éteinte en métropole

CR : en danger critique d'extinction (critically endangered)

EN : en danger (endangered)

VU : vulnérable (vulnerable)


NT : quasi menacée (near threatened)

LC : préoccupation mineure (least concern)

DD : données insuffisantes (data deficient)

NA : Non applicable

NE : Non évaluée (not evaluated)



[Z] - Déterminante ZNIEFF en région :

Par définition une ZNIEFF est un « secteur du territoire national pour lequel les experts scientifiques ont identifié des éléments remarquables du patrimoine naturel ». Deux grands types de zones sont distingués :

Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie souvent limitée définis par la présence d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional (ex. tourbière, mare, falaise, pelouse sèche...) ;

Les ZNIEFF de type II sont constituées de grands ensembles naturels riches ou peu

modifiés ou offrant des potentialités importantes (ex. grande vallée alluviale de la Saône, de la Loue, massif forestier de Chaux...).

Au niveau juridique, l'inventaire ZNIEFF reste un inventaire de connaissances du patrimoine naturel. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique directe : une zone inventoriée ne bénéficie d'aucune protection réglementaire. Il convient cependant de veiller dans ces zones à la présence hautement probable d'espèces et d'habitats protégés pour lesquels il existe une réglementation stricte.

Chaque région possède sa propre liste des espèces déterminantes de l'inventaire ZNIEFF. Elles sont notées d'un Z dans les tableaux de données.

Cortège - Habitats

An : Anthropique Bo : Bocager Co : Eaux courantes
Cu : Cultivé Eu : Euryèce Fo : Forestier
Hu : Humide Ou : Ouvert St : Eaux stagnante

**Plans Nationaux d'Actions
- Barbastelle d'Europe**

SAINT-ÉTIENNE
la métropole

SÉM
VERDI

Légende

Aires d'études


- Site d'étude (Red outline)
- Zone d'étude (Yellow outline)
- Aire d'étude bibliographique (Dashed red outline)


Plans Nationaux d'Action


- PNA Chiroptères
- Barbastella barbastellus (Hatched area)


0 5 10 km


Source : Google satellite
Production : VERDI pour Saint-Etienne métropole, mars 2024
























































3 LISTE DES ESPECES BIBLIOGRAPHIQUES

3.1 FLORE

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Sapindaceae	<i>Acer campestre</i> (L., 1753)	Érable champêtre, Acéraille				LC	LC	LC			LC		
Sapindaceae	<i>Acer opalus</i> (Mill., 1768)	Érable à feuilles d'obier, Érable opale, Érable d'Italie					LC	LC			LC		
Sapindaceae	<i>Acer platanoides</i> (L., 1753)	Érable plane, Plane				LC	LC	LC			LC		
Sapindaceae	<i>Acer pseudoplatanus</i> (L., 1753)	Érable sycomore, Grand Érable				LC	LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i> (L., 1753)	Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus				LC	LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Achillea ptarmica</i> (L., 1753)	Achillée sternutatoire, Herbe à éternuer, Achillée ptarmique				LC	LC	LC	ZH		LC		
Ranunculaceae	<i>Actaea spicata</i> (L., 1753)	Actée en épi, Herbe aux poux					LC	LC			LC		
Sapindaceae	<i>Aesculus hippocastanum</i> (L. 1753)	Marronnier d'Inde, Marronnier commun				VU	VU	NA					
Apiaceae	<i>Aethusa cynapium</i> (L., 1753)	Petite cigüe, Faux Persil						LC			LC		
Rosaceae	<i>Agrimonia eupatoria</i> (L., 1753)	Aigremoine, Francormier					LC	LC			LC		
Caryophyllaceae	<i>Agrostemma githago</i> (L., 1753)	Lychnis Nielle, Nielle des blés			C 1			LC			LC		
Poaceae	<i>Agrostis canina</i> (L. 1753)	Agrostide des chiens				LC	LC	LC	ZH		LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i> (L., 1753)	Agrostide capillaire						LC			LC		
Simaroubaceae	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, 1916	Faux vernis du Japon, Ailante glanduleux, Ailante, Ailanthé						NA		A4			
Poaceae	<i>Aira caryophyllea</i> (L., 1753)	Canche caryophyllée						LC			LC		
Poaceae	<i>Aira praecox</i> (L., 1753)	Canche printanière						LC			LC		
Lamiaceae	<i>Ajuga reptans</i> (L., 1753)	Bugle rampante, Consyre moyenne						LC			LC		
Alismataceae	<i>Alisma plantago-aquatica</i> (L., 1753)	Grand plantain d'eau, Plantain d'eau commun				LC	LC	LC	ZH		LC		
Brassicaceae	<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913	Alliaire, Herbe aux aulx						LC			LC		
Amaryllidaceae	<i>Allium schoenoprasum</i> (L., 1753)	Civette, Ciboulette, Ciboule				LC	LC	LC			LC		
Amaryllidaceae	<i>Allium ursinum</i> (L., 1753)	Ail des ours, Ail à larges feuilles					LC	LC			LC		
Amaryllidaceae	<i>Allium vineale</i> (L., 1753)	Ail des vignes, Oignon bâtard					LC	LC			LC		
Betulaceae	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	Aulne glutineux, Verne				LC	LC	LC	ZH		LC		
Poaceae	<i>Alopecurus pratensis</i> (L., 1753)	Vulpin des prés					LC	LC			LC		
Amaranthaceae	<i>Amaranthus blitum</i> (L., 1753)	Amarante livide, Amarante Blite						LC			LC		
Amaranthaceae	<i>Amaranthus deflexus</i> (L., 1771)	Amarante couchée, Amarante étalée						NA		E2			
Amaranthaceae	<i>Amaranthus hybridus</i> (L., 1753)	Amarante hybride						NA		P3			
Asteraceae	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> (L., 1753)	Ambroise élevée, Ambroise à feuilles d'Armoise, Ambrosie annuelle						NA		A5			
Orchidaceae	<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Orchis à fleurs lâches					LC	LC	ZH		VU	P1	Z
Asteraceae	<i>Andryala integrifolia</i> (L., 1753)	Andryale à feuilles entières, Andryale à feuilles entières sinueuse, Andryale sinueuse						LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Ranunculaceae	<i>Anemone nemorosa</i> (L., 1753)	Anémone des bois, Anémone sylvie						LC			LC		
Poaceae	<i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski, 1934	Brome stérile					LC	LC			LC		
Poaceae	<i>Anthoxanthum odoratum</i> (L., 1753)	Flouve odorante						LC			LC		
Apiaceae	<i>Anthriscus caucalis</i> (M.Bieb., 1808)	Cerfeuil vulgaire à fruits glabres, Persil sauvage						LC			LC		
Apiaceae	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814	Cerfeuil des bois, Persil des bois						LC			LC		
Rosaceae	<i>Aphanes arvensis</i> (L., 1753)	Alchémille des champs, Apane des champs			C 1		LC	LC			LC		
Brassicaceae	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842	Arabette de thalius, Arabette des dames						LC			LC		
Asteraceae	<i>Arctium lappa</i> (L., 1753)	Grande bardane, Bardane commune					LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800	Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules						LC			LC		
Asteraceae	<i>Arnoseris minima</i> (L.) Schweigg. & Körte, 1811	Arnoséris naine						LC			LC		
Poaceae	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	Fromental élevé, Ray-grass français					LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Artemisia annua</i> (L., 1753)	Armoise annuelle						NA		A4			
Asteraceae	<i>Artemisia verlotiorum</i> (Lamotte, 1877)	Armoise des Frères Verlot, Armoise de Chine						NA		A4			
Asteraceae	<i>Artemisia vulgaris</i> (L., 1753)	Armoise commune, Herbe de feu					LC	LC			LC		
Araceae	<i>Arum maculatum</i> (L., 1753)	Gouet tacheté, Chandelle						LC			LC		
Aspleniaceae	<i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm., 1795	Doradille du Nord, Doradille septentrionale					LC	LC			LC		
Aspleniaceae	<i>Asplenium x alternifolium</i> (Wulfen, 1781)	Doradille de Breyne, Doradille à feuilles alternes, Asplénium de Breyne											
	<i>Asplenium x sleepiae</i> (Badré & al., 1981)												

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Amaranthaceae	<i>Atriplex patula</i> (L., 1753)	Arroche étalée						LC			LC		
Poaceae	<i>Avena fatua</i> (L., 1753)	Avoine folle, Havenon			C 1	LC	LC	LC					
Poaceae	<i>Avena sativa</i> (L., 1753)	Avoine cultivée						NA			LC		
Poaceae	<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer, 1838	Foin tortueux						LC					
Poaceae	<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort., 1868	Avoine pubescente						LC			LC		
Lamiaceae	<i>Ballota nigra</i> (L., 1753)	Ballote noire					LC	LC			LC		
Poaceae	<i>Bambusa</i> sp.												
Brassicaceae	<i>Barbarea verna</i> (Mill.) Asch., 1864	Barbarée printanière, Barbarée du printemps				DD	DD	LC			LC		
Asteraceae	<i>Bellis perennis</i> (L., 1753)	Pâquerette						LC			LC		
Betulaceae	<i>Betula pendula</i> (Roth, 1788)	Bouleau verruqueux				LC	LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Bidens frondosa</i> (L., 1753)	Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu				LC		NA	ZH	2			
Asteraceae	<i>Bidens tripartita</i> (L., 1753)	Bident trifolié, Eupatoire aquatique				LC	LC	LC	ZH		LC		
Poaceae	<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult., 1817	Brachypode des rochers						LC			LC		
Poaceae	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	Brachypode des bois, Brome des bois						LC			LC		
Poaceae	<i>Briza media</i> (L., 1753)	Brize intermédiaire, Amourette commune						LC			LC		
Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i> (L., 1753)	Brome mou						LC			LC		
Cucurbitaceae	<i>Bryonia cretica</i> (L., 1753)	Bryone dioïque						LC			LC		
Cucurbitaceae	<i>Bryonia dioica</i> (Jacq., 1774)	Bryone dioïque						LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Scrophulariaceae	<i>Buddleja davidii</i> (Franch., 1887)	Buddleja du père David, Arbre à papillon, Arbre aux papillons						NA		A5			
Buxaceae	<i>Buxus sempervirens</i> (L., 1753)	Buis commun, Buis sempervirent					LC	LC			LC		
Plantaginaceae	<i>Callitriche hamulata</i> (Kütz. ex W.D.J.Koch, 1837)	Callitriche à crochets, Callitriche en hameçon						LC					
Ericaceae	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	Callune, Béruee					LC	LC			LC		
Ranunculaceae	<i>Caltha palustris</i> (L., 1753)	Populage des marais, SarbEndllotte				LC	LC	LC	ZH		LC		
Campanulaceae	<i>Campanula glomerata</i> (L., 1753)	Campanule agglomérée						LC			LC		
Campanulaceae	<i>Campanula patula</i> (L., 1753)	Campanule étoilée, Campanule étalée						LC			LC		
Campanulaceae	<i>Campanula rotundifolia</i> (L., 1753)	Campanule à feuilles rondes						LC			LC		
Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792	Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin					LC	LC			LC		
Brassicaceae	<i>Cardamine flexuosa</i> (With., 1796)	Cardamine flexueuse, Cardamine des bois						LC	ZH		LC		
Brassicaceae	<i>Cardamine hirsuta</i> (L., 1753)	Cardamine hérissée, Cresson de muraille						LC			LC		
Brassicaceae	<i>Cardamine impatiens</i> (L., 1753)	Cardamine impatiens, Cardamine impatiente, Herbe au diable						LC			LC		
Brassicaceae	<i>Cardamine pratensis</i> (L., 1753)	Cardamine des prés, Cresson des prés						LC	ZH		LC		
Asteraceae	<i>Carduus nutans</i> (L., 1753)	Chardon penché						LC			LC		
Cyperaceae	<i>Carex caryophyllea</i> (Latourr., 1785)	Laïche printanière, Laïche du printemps						LC			LC		
Cyperaceae	<i>Carex divulsa</i> (Stokes, 1787)	Laïche écartée						LC			LC		
Cyperaceae	<i>Carex flacca</i> (Schreb., 1771)	Laïche glauque, Langue-de-pic						LC			LC		
Cyperaceae	<i>Carex hirta</i> (L., 1753)	Laïche hérissée						LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Cyperaceae	<i>Carex panicea</i> (L., 1753)	Laïche millet, Faux FenEndl						LC	ZH		LC		
Cyperaceae	<i>Carex pendula</i> (Huds., 1762)	Laïche à épis pendants, Laïche pendante						LC	ZH		LC		
Cyperaceae	<i>Carex remota</i> L., 1755	Laïche espacée				LC		LC	ZH		LC		
Cyperaceae	<i>Carex spicata</i> (Huds., 1762)	Laïche en épis						LC			LC		
Cyperaceae	<i>Carex sylvatica</i> (Huds., 1762)	Laïche des bois						LC			LC		
Asteraceae	<i>Carlina vulgaris</i> (L., 1753)	Carline commune, Chardon doré						LC			LC		
Betulaceae	<i>Carpinus betulus</i> (L., 1753)	Charme, Charmille				LC	LC	LC			LC		
Fagaceae	<i>Castanea sativa</i> (Mill., 1768)	Chataignier, Châtaignier commun					LC	LC			LC		
Pinaceae	<i>Cedrus libani</i> (A.Rich., 1823)	Cèdre du Liban, Cèdre du mont Liban				VU	VU	NA					
Asteraceae	<i>Centaurea jacea</i> (L., 1753)	Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette						LC			LC		
Asteraceae	<i>Centaurea nigra</i> (L., 1753)	Centaurée noire						DD					
Caryophyllaceae	<i>Cerastium fontanum</i> (Baumg., 1816)	Céraiste commune						LC			LC		
Caryophyllaceae	<i>Cerastium glomeratum</i> (Thuill., 1799)	Céraiste aggloméré						LC			LC		
Plantaginaceae	<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange, 1870	Petite linaire, Petit Chaenorrhinum						LC			LC		
Apiaceae	<i>Chaerophyllum temulum</i> (L., 1753)	Chérophylle penché, Couquet						LC			LC		
Papaveraceae	<i>Chelidonium majus</i> (L., 1753)	Grande chélidoine, Herbe à la verrue, Éclaire					LC	LC			LC		
Amaranthaceae	<i>Chenopodium album</i> (L., 1753)	Chénopode blanc, Senousse						LC			LC		
Asteraceae	<i>Chondrilla juncea</i> L., 1753	Chondrille à tige de jonc, Chondrille effilée						LC			LC		
Asteraceae	<i>Cichorium intybus</i> L., 1753	Chicorée amère, Barbe-de-capucin					LC	LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Onagraceae	<i>Circaea lutetiana</i> (L., 1753)	Circée de Paris, Circée commune						LC			LC		
Asteraceae	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des champs, Chardon des champs						LC			LC		
Asteraceae	<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop., 1772	Cirse laineux, Cirse aranéeux						LC			LC		
Asteraceae	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des marais, Bâton du Diable						LC	ZH		LC		
Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé						LC			LC		
Ranunculaceae	<i>Clematis vitalba</i> (L., 1753)	Clématite des haies, Herbe aux gueux						LC			LC		
Lamiaceae	<i>Clinopodium vulgare</i> (L., 1753)	Sariette commune, Grand Basilic						LC			LC		
Apiaceae	<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886	Conopode dénudé, Grand Conopode						LC			LC		
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> (L., 1753)	Liseron des champs, Vrillée						LC			LC		
Convolvulaceae	<i>Convolvulus sepium</i> (L., 753)	Liset, Liseron des haies				LC		LC	ZH		LC		
Cornaceae	<i>Cornus sanguinea</i> (L., 1753)	Cornouiller sanguin, Sanguine						LC			LC		
Betulaceae	<i>Corylus avellana</i> (L., 1753)	Noisetier, Avelinier				LC	LC	LC			LC		
Rosaceae	<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne., 1879	Cotonéaster horizontal						NA		E2			
Rosaceae	<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC., 1825	Aubépine à deux styles				LC	LC	LC			LC		
Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i> (Jacq., 1775)	Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai				LC	LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Crepis biennis</i> (L., 1753)	Crépide bisannuelle						LC			LC		
Asteraceae	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840	Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires						LC			LC		
Asteraceae	<i>Crepis foetida</i> L., 1753	Crépide fétide						LC			LC		
Asteraceae	<i>Crepis setosa</i> Haller f., 1797	Crépide hérissée						LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Asteraceae	<i>Crepis vesicaria</i> (L., 1753)	Barkhausie à feuilles de pissenlit, Crépis à vésicules						LC			LC		
Rubiaceae	<i>Cruciata laevipes</i> (Opiz, 1852)	Gaillet croissette, Croissette commune						LC			LC		
Asteraceae	<i>Cyanus segetum</i> (Hill, 1762)	Bleuet des moissons, Bleuet, Barbeau					LC	LC			LC		
Plantaginaceae	<i>Cymbalaria muralis</i> (G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800)	Cymbalaire, Ruine de Rome, Cymbalaire des murs						LC					
Asteraceae	<i>Cynara scolymus</i> (L., 1753)	Artichaut						NA					
Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805	Chiendent pied-de-poule, Gros chiendent						LC			LC		
Poaceae	<i>Cynosurus cristatus</i> (L., 1753)	Crételle						LC			LC		
Cyperaceae	<i>Cyperus esculentus</i> var. <i>sativus</i> Boeckeler, 1870								ZH				
Cystopteridaceae	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh., 1805	Cystoptéris fragile, Capillaire blanche, Capillaire blanc					LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Cytisus oromediterraneus</i> Rivas Mart., T.E.Díaz, Fern.Prieto, Loidi & Peñas, 1984	Cytise oroméditerranéen, Genêt oroméditerranéen, Genêt purgatif				LC	LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	Genêt à balai, Juniesse						LC			LC		
Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i> (L., 1753)	Dactyle aggloméré, Pied-de-poule						LC			LC		
Poaceae	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805	Danthonie, Sieglie retombante						LC			LC		
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i> (L.)	Stramoine, Herbe à la taupe, Datura officinale						NA		P3			
Apiaceae	<i>Daucus carota</i> (L., 1753)	Carotte sauvage, Daucus carotte				LC	LC	LC			LC		
Caryophyllaceae	<i>Dianthus armeria</i> (L., 1753)	Oeillet velu, Armoirie, Oeillet à bouquet						LC			LC	Art.1 & 2 (38, 26)	
Caryophyllaceae	<i>Dianthus carthusianorum</i> (L., 1753)	Oeillet des Chartreux						LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Plantaginaceae	<i>Digitalis grandiflora</i> Mill., 1768	Digitale à grandes fleurs					LC	LC			LC		
Plantaginaceae	<i>Digitalis lutea</i> (L., 1753)	Digitale jaune						LC			LC		
Plantaginaceae	<i>Digitalis purpurea</i> (L., 1753)	Digitale pourpre, Gantelée					LC	LC			LC		
Poaceae	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop., 1771	Digitaire sanguine, Digitaire commune						LC			LC		
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002	Sceau de Notre Dame					LC	LC			LC		
Brassicaceae	<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC., 1821	Diplotaxe vulgaire, Roquette jaune					LC	LC			LC		
Caprifoliaceae	<i>Dipsacus fullonum</i> (L., 1753)	Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage						LC			LC		
Asteraceae	<i>Dittrichia graveolens</i> (L.) Greuter, 1973	Inule fétide, Inule à forte odeur						LC			LC		
Brassicaceae	<i>Draba verna</i> (L., 1753)	Drave de printemps						LC					
Dryopteridaceae	<i>Dryopteris x deweveri</i> (J.T.Jansen) J.T.Jansen & Wacht., 1934	Dryoptéris de Deweve											
Poaceae	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv., 1812	Échinochloé Pied-de-coq, Pied-de-coq				LC		LC			LC		
Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i> (L., 1753)	Vipérine commune, Vipérine vulgaire						LC			LC		
Elaeagnaceae	<i>Elaeagnus x submacrophylla</i> Servett., 1908												
Poaceae	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934	Chiendent commun, Chiendent rampant						LC			LC		
Onagraceae	<i>Epilobium angustifolium</i> (L., 1753)	Épilobe en épi, Laurier de saint Antoine				LC		LC			LC		
Onagraceae	<i>Epilobium hirsutum</i> (L., 1753)	Épilobe hérissé, Épilobe hirsute				LC		LC	ZH		LC		
Onagraceae	<i>Epilobium lanceolatum</i> Sebast. & Mauri; 1818	Épilobe à feuilles lancéolées						LC			LC		
Onagraceae	<i>Epilobium montanum</i> L., 1753	Épilobe des montagnes						LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Onagraceae	<i>Epilobium tetragonum</i> (L., 1753)	Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles						LC			LC		
Equisetaceae	<i>Equisetum arvense</i> (L., 1753)	Prêle des champs, Queue-de-renard				LC	LC	LC			LC		
Equisetaceae	<i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753	Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières				LC	LC	LC	ZH		LC		
Poaceae	<i>Eragrostis minor</i> Host, 1809	Éragrostis faux-pâturin, Petit Éragrostis						LC			LC		
Asteraceae	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804	Vergerette annuelle, Érigéron annuel						NA		A4			
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789	Érodium à feuilles de cigue, Bec de grue, Cicutaire						LC			LC		
Fabaceae	<i>Ervilia hirsuta</i> (L.) Opiz, 1852	Vesce hérissée, Ers velu						LC					
Apiaceae	<i>Eryngium campestre</i> (L., 1753)	Chardon Roland, Panicaud champêtre						LC			LC		
Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Pavot de Californie, Eschscholzie de Californie						NA		E2			
Celastraceae	<i>Euonymus europaeus</i> (L., 1753)	Bonnet-d'évêque					LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Eupatorium cannabinum</i> (L., 1753)	Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau						LC	ZH		LC		
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia amygdaloides</i> (L., 1753)	Euphorbe des bois, Herbe à la faux						LC			LC		
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia cyparissias</i> (L., 1753)	Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès						LC			LC		
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia helioscopia</i> (L., 1753)	Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues						LC			LC		
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia lathyris</i> (L., 1753)	Euphorbe épurge, Euphorbe des jardins						LC					
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia maculata</i> (L., 1753)	Euphorbe de Jovet, Euphorbe maculée						NA		P3			
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i> (L., 1753)	Euphorbe omblette, Essule ronde						LC			LC		
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia stricta</i> (L., 1759)	Euphorbe raide						LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Fagaceae	<i>Fagus sylvatica</i> (L., 1753)	Hêtre, Hêtre commun, Fouteau						LC			LC		
Polygonaceae	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á.Löve, 1970	Renouée liseron, Faux-liseron						LC			LC		
Polygonaceae	<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub, 1971	Renouée des haies, Vrillée des buissons						LC			LC		
Poaceae	<i>Festuca arvernensis</i> Auquier, Kerguélen & Markgr.-Dann., 1978	Fétuque d'Auvergne						LC			LC		
Poaceae	<i>Festuca filiformis</i> (Pourr., 1788)	Fétuque capillaire						LC			LC		
Poaceae	<i>Festuca heterophylla</i> (Lam., 1779)	Fétuque hétérophylle					LC	LC			LC		
Poaceae	<i>Festuca lemanii</i> Bastard, 1809	Fétuque de Léman						LC			LC		
Poaceae	<i>Festuca nigrescens</i> (Lam., 1788)	Fétuque noirâtre						LC			LC		
Poaceae	<i>Festuca rubra</i> (L., 1753)	Fétuque rouge					LC	LC			LC		
Ranunculaceae	<i>Ficaria verna</i> (Huds., 1762)	Ficaire à bulbilles					LC	LC			LC		
Moraceae	<i>Ficus carica</i> (L., 1753)	Figuier commun, Figuier de Carie, Caprifiguier, Figuier				LC	LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Filago germanica</i> L., 1763	Immortelle d'Allemagne						LC					
Rosaceae	<i>Filipendula vulgaris</i> (Moench, 1794)	Filipendule vulgaire, Spirée filipendule					LC	LC			LC		
Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i> (Mill., 1768)	Fenouil commun					LC	LC			LC		
Rosaceae	<i>Fragaria vesca</i> (L., 1753)	Fraisier sauvage, Fraisier des bois					LC	LC			LC		
Oleaceae	<i>Fraxinus excelsior</i> (L., 1753)	Frêne élevé, Frêne commun				NT	NT	LC			LC		
Papaveraceae	<i>Fumaria muralis</i> Sond. ex W.D.J.Koch, 1845	Fumeterre des murs						LC			NE		
Papaveraceae	<i>Fumaria officinalis</i> (L., 1753)	Fumeterre officinale, Herbe à la veuve					LC	LC			LC		
Lamiaceae	<i>Galeopsis segetum</i> (Neck., 1770)	Galéopsis douteux, Galéopsis des champs				DD	DD	LC					

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Lamiaceae	<i>Galeopsis tetrahit</i> (L., 1753)	Galéopsis tétrahit, Ortie royale						LC			LC		
Asteraceae	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav., 1798	Galinsoga cilié						NA		P3			
Rubiaceae	<i>Galium album</i> (Mill., 1768)	Gaillet dressé						LC					
Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> (L., 1753)	Gaillet gratteron, Herbe collante					LC	LC			LC		
Rubiaceae	<i>Galium mollugo</i> (L., 1753)	Gaillet commun, Gaillet Mollugine						LC			LC		
Rubiaceae	<i>Galium parisiense</i> (L., 1753)	Gaillet de Paris						LC			LC		
Rubiaceae	<i>Galium pumilum</i> (Murray, 1770)	Gaillet rude						LC			LC		
Rubiaceae	<i>Galium uliginosum</i> (L., 1753)	Gaillet aquatique, Gaillet fangeux				LC		LC	ZH		LC		
Rubiaceae	<i>Galium verum</i> (L., 1753)	Gaillet jaune, Caille-lait jaune					LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Genista anglica</i> (L., 1753)	Genêt d'Angleterre, Petit Genêt épineux						LC			LC		
Fabaceae	<i>Genista pilosa</i> L., 1753	Genêt poilu, Genêt velu, Genette						LC			LC		
Fabaceae	<i>Genista sagittalis</i> L., 1753	Genêt ailé, Genistrolle				LC	LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Genista tinctoria</i> L., 1753	Genêt des teinturiers, Petit Genêt						LC			LC		
Geraniaceae	<i>Geranium columbinum</i> L., 1753	Géranium des colombes, Pied de pigeon						LC			LC		
Geraniaceae	<i>Geranium dissectum</i> (L., 1755)	Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées						LC			LC		
Geraniaceae	<i>Geranium molle</i> (L., 1753)	Géranium à feuilles molles						LC			LC		
Geraniaceae	<i>Geranium nodosum</i> (L., 1753)	Géranium noueux						LC			LC		
Geraniaceae	<i>Geranium pusillum</i> (L., 1759)	Géranium fluet, Géranium à tiges grêles						LC			LC		
Geraniaceae	<i>Geranium pyrenaicum</i> (Burm.f., 1759)	Géranium des Pyrénées						LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Geraniaceae	<i>Geranium robertianum</i> (L., 1753)	Herbe à Robert						LC			LC		
Geraniaceae	<i>Geranium rotundifolium</i> (L., 1753)	Géranium à feuilles rondes, Mauvette						LC			LC		
Rosaceae	<i>Geum urbanum</i> (L., 1753)	Benoîte commune, Herbe de saint Benoît					LC	LC			LC		
Lamiaceae	<i>Glechoma hederacea</i> (L., 1753)	Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre					LC	LC			LC		
Poaceae	<i>Glyceria declinata</i> (Bréb., 1859)	Glycérie dentée					LC	LC	ZH		LC		
Araliaceae	<i>Hedera helix</i> (L., 1753)	Lierre grimpant, Herbe de saint Jean					LC	LC			LC		
Cistaceae	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768	Hélianthème jaune, Hélianthème commun						LC			LC		
Ranunculaceae	<i>Helleborus foetidus</i> (L., 1753)	Hellébore fétide, Pied-de-griffon					LC	LC			LC		
Apiaceae	<i>Heracleum mantegazzianum</i> (Sommier & Levier, 1895)	Berce du Caucase, Berce de Mantegazzi				LC		NA		A4			
Apiaceae	<i>Heracleum sphondylium</i> (L., 1753)	Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce						LC			LC		
Asteraceae	<i>Hieracium laevigatum</i> (Willd., 1803)	Épervière lisse						LC			LC		
Asteraceae	<i>Hieracium murorum</i> (L., 1753)	Épervière des murs						LC			LC		
Asteraceae	<i>Hieracium umbellatum</i> L., 1753	Épervière en ombelle, Accipitrine						LC			LC		
Brassicaceae	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss., 1847	Hirschfeldie grisâtre, Roquette bâtarde						LC					
Poaceae	<i>Holcus lanatus</i> (L., 1753)	Houlque laineuse, Blanchard						LC			LC		
Poaceae	<i>Holcus mollis</i> (L., 1759)	Houlque molle, Avoine molle						LC			LC		
Poaceae	<i>Hordeum murinum</i> (L., 1753)	Orge sauvage, Orge Queue-de-rat				LC	LC	LC			LC		
Cannabaceae	<i>Humulus lupulus</i> (L., 1753)	Houblon grimpant					LC	LC	ZH		LC		
Crassulaceae	<i>Hylotelephium maximum</i> (L.) Holub, 1978	Grand Sédum						LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Hypericaceae	<i>Hypericum hirsutum</i> L., 1753	Millepertuis velu, Millepertuis hérissé						LC			LC		
Hypericaceae	<i>Hypericum humifusum</i> L., 1753	Millepertuis couché, Petit Millepertuis						LC	ZH		LC		
Hypericaceae	<i>Hypericum maculatum</i> (Crantz, 1763)	Millepertuis maculé, Millepertuis taché						LC			LC		
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i> (L., 1753)	Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean					LC	LC			LC		
Hypericaceae	<i>Hypericum pulchrum</i> (L., 1753)	Millepertuis élégant, Millepertuis joli						LC			LC		
Hypericaceae	<i>Hypericum tetrapterum</i> (Fr., 1823)	Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles						LC	ZH		LC		
Asteraceae	<i>Hypochaeris glabra</i> (L., 1753)	Porcelle glabre, Porcelle des sables						LC			LC		
Asteraceae	<i>Hypochaeris maculata</i> L., 1753	Porcelle à feuilles tachées, Porcelle tachetée						LC			LC		
Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i> (L., 1753)	Porcelle enracinée						LC			LC		
Aquifoliaceae	<i>Ilex aquifolium</i> (L., 1753)	Houx				LC	LC	LC			LC		
Balsaminaceae	<i>Impatiens balfouri</i> (Hook.f., 1903)	Impatience de Balfour, Impatiente des jardins						NA		A4			
Balsaminaceae	<i>Impatiens glandulifera</i> (Royle, 1833)	Balsamine de l'Himalaya, Balsamine géante, Balsamine rouge						NA	ZH	A4			
Iridaceae	<i>Iris pseudacorus</i> (L., 1753)	Iris faux acore, Iris des marais				LC	LC	LC	ZH		LC		
Cyperaceae	<i>Isolepis setacea</i> (L.) R.Br., 1810	Scirpe sétacé, Isolépis sétacé				LC		LC	ZH		LC		
Asteraceae	<i>Jacobaea maritima</i> (L.) Pelter & Meijden, 2005	Séneçon Cinéraire						LC			VU		
Asteraceae	<i>Jacobaea vulgaris</i> (Gaertn., 1791)	Herbe de saint Jacques						LC			LC		
Campanulaceae	<i>Jasione montana</i> (L., 1753)	Jasione des montagnes, Herbe à midi						LC			LC		
Juglandaceae	<i>Juglans regia</i> (L., 1753)	Noyer commun, Calottier				LC	LC	NA					

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Juncaceae	<i>Juncus acutiflorus</i> (Ehrh. ex Hoffm., 1791)	Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore					LC	LC	ZH		LC		
Juncaceae	<i>Juncus articulatus</i> (L., 1753)	Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants				LC	LC	LC	ZH		LC		
Juncaceae	<i>Juncus bufonius</i> (L., 1753)	Jonc des crapauds				LC	LC	LC	ZH		LC		
Juncaceae	<i>Juncus conglomeratus</i> (L., 1753)	Jonc aggloméré				LC		LC	ZH		LC		
Juncaceae	<i>Juncus effusus</i> (L., 1753)	Jonc épars, Jonc diffus				LC	LC	LC	ZH		LC		
Juncaceae	<i>Juncus inflexus</i> (L., 1753)	Jonc glauque				LC		LC	ZH		LC		
Juncaceae	<i>Juncus tenuis</i> (Willd., 1799)	Jonc grêle, Jonc fin						NA		P3			
Caprifoliaceae	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828	Knautie des champs, Oreille-d'âne						LC			LC		
Caprifoliaceae	<i>Knautia arvernensis</i> (Briq.) Szabó, 1934	Knautie d'Auvergne, Knautie des chênaies						LC			LC		
Poaceae	<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P.Beauv., 1812	Koelérie pyramidale						LC			LC		
Asteraceae	<i>Lactuca perennis</i> (L., 1753)	Laitue vivace, Lâche				DD	DD	LC			LC		
Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i> (L., 1756)	Laitue scariole, Escarole					LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Lactuca virosa</i> (L., 1753)	Laitue vireuse, Laitue sauvage					DD	LC			LC		
Lythraceae	<i>Lagerstroemia indica</i> L.	Lilas des Indes, Folie de jeune fille						NA					
Lamiaceae	<i>Lamium album</i> (L., 1753)	Lamier blanc, Ortie blanche, Ortie morte					LC	LC			LC		
Lamiaceae	<i>Lamium amplexicaule</i> (L., 1753)	Lamier amplexicaule						LC			LC		
Lamiaceae	<i>Lamium galeobdolon</i> subsp. <i>montanum</i> (Pers.) Hayek, 1929	Lamier des montagnes											
Lamiaceae	<i>Lamium hybridum</i> Vill., 1786	Lamier hybride						LC			LC		
Lamiaceae	<i>Lamium maculatum</i> (L.) L., 1763	Lamier maculé, Lamier à feuilles panachées						LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Lamiaceae	<i>Lamium purpureum</i> (L., 1753)	Lamier pourpre, Ortie rouge						LC			LC		
Asteraceae	<i>Lapsana communis</i> (L., 1753)	Lampsane commune, Graceline						LC			LC		
Orobanchaceae	<i>Lathraea squamaria</i> (L., 1753)	Clandestine écailleuse, Lathrée écailleuse						LC	ZH		LC		
Fabaceae	<i>Lathyrus latifolius</i> (L., 1753)	Gesse à larges feuilles, Pois vivace				LC	LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler, 1971	Gesse des montagnes, Gesse à feuilles de Lin						LC			LC		
Fabaceae	<i>Lathyrus pratensis</i> (L., 1753)	Gesse des prés						LC			LC		
Lauraceae	<i>Laurus nobilis</i> (L., 1753)	Laurier-sauce					LC	LC			NE		
Araceae	<i>Lemna minor</i> (L., 1753)	Petite lentille d'eau				LC	LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>hispidus</i> L., 1753	Liondent hispide											
Asteraceae	<i>Leontodon saxatilis</i> subsp. <i>saxatilis</i> Lam., 1779	Liondent des rochers, Léontodon des rochers											
Brassicaceae	<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br., 1812	Passerage champêtre, Passerage des champs					LC	LC			LC		
Brassicaceae	<i>Lepidium graminifolium</i> L., 1759	Passerage à feuilles de graminée					LC	LC			LC		
Brassicaceae	<i>Lepidium rudérale</i> L., 1753	Passerage des décombres, Passerage rudérale					LC	LC			LC		
Brassicaceae	<i>Lepidium virginicum</i> L., 1753	Passerage de Virginie						NA		E2			
Asteraceae	<i>Leucanthemum ircutianum</i> (DC., 1838)	Marguerite						LC			NE		
Oleaceae	<i>Ligustrum vulgare</i> (L., 1753)	Troëne, Raisin de chien						LC			LC		
Plantaginaceae	<i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768	Linaire rampante						LC			LC		
Plantaginaceae	<i>Linaria vulgaris</i> (Mill., 1768)	Linaire commune						LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Linaceae	<i>Linum catharticum</i> (L., 1753)	Lin purgatif						LC			LC		
Asteraceae	<i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort., 1827	Cotonnière naine, Gnaphale nain						LC			LC	P5 (Haute-Savoie)	
Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i> (Lam., 1779)	Ivraie multiflore, Ray-grass d'Italie					LC	LC			NE		
Poaceae	<i>Lolium perenne</i> (L., 1753)	Ivraie vivace					LC	LC			LC		
Poaceae	<i>Lolium x boucheanum</i> Kunth, 1830	Ray-grass hybride											
Caprifoliaceae	<i>Lonicera periclymenum</i> (L., 1753)	Chèvrefeuille des bois, Cranquillier						LC			LC		
Caprifoliaceae	<i>Lonicera xylosteum</i> (L., 1753)	Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies						LC			LC		
Fabaceae	<i>Lotus corniculatus</i> (L., 1753)	Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée					LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Lotus pedunculatus</i> (Cav., 1793)	Lotus des marais, Lotier des marais					LC	LC	ZH		LC		
Brassicaceae	<i>Lunaria annua</i> (L., 1753)	Monnaie-du-Pape, Lunaire annuelle						LC		E2			
Juncaceae	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805	Luzule champêtre				LC		LC			LC		
Juncaceae	<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC., 1806	Luzule de Forster						LC			LC		
Juncaceae	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811	Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs						LC			LC		
Juncaceae	<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd., 1809	Luzule de printemps, Luzule printanière						LC			LC		
Juncaceae	<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811	Luzule des bois, Grande luzule, Troscart à fleurs lâches						LC			LC		
Lamiaceae	<i>Lycopus europaeus</i> (L., 1753)	Lycophe d'Europe, Chanvre d'eau				LC	LC	LC	ZH		LC		
Primulaceae	<i>Lysimachia nemorum</i> L., 1753	Lysimaque des bois, Mouron jaune						LC	ZH		LC		
Primulaceae	<i>Lysimachia nummularia</i> (L., 1753)	Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus				LC	LC	LC	ZH		LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Brassicaceae	<i>Malcolmia africana</i> (L.) R.Br., 1812	Malcolmie d'Afrique						VU					
Rosaceae	<i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill., 1768	Pommier sauvage, Boquettier				DD	DD	LC			LC		
Malvaceae	<i>Malva moschata</i> (L., 1753)	Mauve musquée						LC			LC		
Malvaceae	<i>Malva neglecta</i> (Wallr., 1824)	Petite mauve					LC	LC			LC		
Malvaceae	<i>Malva sylvestris</i> (L., 1753)	Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande mauve					LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762	Luzerne tachetée					LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Medicago lupulina</i> (L., 1753)	Luzerne lupuline, Minette					LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Medicago sativa</i> (L., 1753)	Luzerne cultivée				LC	LC	LC			LC		
Orobanchaceae	<i>Melampyrum pratense</i> (L., 1753)	Mélampyre des prés						LC			LC		
Poaceae	<i>Melica uniflora</i> (Retz., 1779)	Mélique uniflore						LC			LC		
Fabaceae	<i>Melilotus albus</i> (Medik., 1787)	Méililot blanc					LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam., 1779	Méililot officinal, Méililot jaune					LC	LC			LC		
Lamiaceae	<i>Melissa officinalis</i> L., 1753	Mélisse officinale					LC	LC					
Lamiaceae	<i>Mentha arvensis</i> L., 1753	Menthe des champs				LC		LC	ZH		LC		
Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i> (L., 1753)	Menthe pouliot				LC	LC	LC	ZH		LC		
Lamiaceae	<i>Mentha suaveolens</i> (Ehrh., 1792)	Menthe à feuilles rondes				LC		LC	ZH		LC		
Euphorbiaceae	<i>Mercurialis annua</i> (L., 1753)	Mercuriale annuelle, Vignette						LC			LC		
Apiaceae	<i>Meum athamanticum</i> (Jacq., 1776)	Fenouil des Alpes, Fenouil de montagne						LC			LC		
Poaceae	<i>Micropyrum tenellum</i> (L.) Link, 1844	Catapode des graviers						LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Caryophyllaceae	<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811	Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures						LC			LC		
Montiaceae	<i>Montia arvensis</i> Wallr., 1840	Montie à graines cartilagineuses						LC					
Asparagaceae	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768	Muscari à toupet, Muscari chevelu						LC			LC		
Asparagaceae	<i>Muscari neglectum</i> (Guss. ex Ten., 1842)	Muscari à grappes, Muscari négligé						LC			LC		
Boraginaceae	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764	Myosotis des champs						LC			LC		
Boraginaceae	<i>Myosotis balbisiana</i> Jord., 1852	Myosotis de Balbis						LC			LC	P1	Z
Boraginaceae	<i>Myosotis discolor</i> Pers., 1797	Myosotis bicolore, Myosotis changeant						LC			LC		
Boraginaceae	<i>Myosotis dubia</i> Arrond.	Myosotis douteux						LC					
Boraginaceae	<i>Myosotis ramosissima</i> (Rochel, 1814)	Myosotis rameux						LC			LC		
Boraginaceae	<i>Myosotis scorpioides</i> (L., 1753)	Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion					LC	LC	ZH		LC		
Apocynaceae	<i>Nerium oleander</i> (L., 1753)	Laurier rose, Oléandre		Art.2 & 3		LC	LC	LC	ZH				
Onagraceae	<i>Oenothera biennis</i> (L., 1753)	Onagre bisannuelle						NA		LG NI E2			
Fabaceae	<i>Ononis spinosa</i> (L., 1753)	Bugrane épineuse, Arrête-boeuf					LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Onopordum acanthium</i> (L., 1753)	Onopordon faux-acanthe, Chardon aux ânes						LC			LC		
Apiaceae	<i>Oreoselinum nigrum</i> Delarbre, 1800	Persil des montagnes, Persil de cerf						LC			LC		
Lamiaceae	<i>Origanum vulgare</i> (L., 1753)	Origan commun					LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Ornithopus perpusillus</i> (L., 1753)	Ornithope délicat, Pied-d'oiseau délicat						LC			LC		
Oxalidaceae	<i>Oxalis acetosella</i> (L., 1753)	Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, Alleluia						LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Oxalidaceae	<i>Oxalis corniculata</i> (L., 1753)	Oxalis corniculé, Trèfle jaune						LC					
Poaceae	<i>Panicum capillare</i> (L., 1753)	Panic capillaire						NA		A4			
Papaveraceae	<i>Papaver rhoeas</i> (L., 1753)	Coquelicot			C		LC	LC			LC		
Urticaceae	<i>Parietaria judaica</i> (L., 1756)	Pariétaire des murs, Pariétaire de Judée, Pariétaire diffuse						LC			LC		
Urticaceae	<i>Parietaria officinalis</i> L., 1753	Pariétaire officinale, Herbe à bouteille									LC		
Vitaceae	<i>Parthenocissus inserta</i> (A.Kern.) Fritsch, 1922	Vigne-vierge commune						NA		A4			
Apiaceae	<i>Pastinaca sativa</i> (L., 1753)	Panais cultivé, Pastinacier						LC			LC		
Polygonaceae	<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach, 1841	Renouée Poivre d'eau				LC	LC	LC	ZH		LC		
Polygonaceae	<i>Persicaria maculosa</i> (Gray, 1821)	Renouée Persicaire				LC	LC	LC			LC		
Caryophyllaceae	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964	Oeillet prolifère, Petrorhagie prolifère						LC			LC		
Poaceae	<i>Phalaris arundinacea</i> (L., 1753)	Baldingère faux-roseau, Fromenteau				LC	LC	LC	ZH		LC		
Pinaceae	<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst., (1881)	Épicéa commun, Sérente				LC	LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Picris hieracioides</i> (L., 1753)	Picride éperviaire, Herbe aux vermisseaux						LC			LC		
Asteraceae	<i>Pilosella officinarum</i> (F.W. Schultz & Sch Bip, 1862)	Piloselle officinale, Epervière piloselle						LC			LC		
Apiaceae	<i>Pimpinella saxifraga</i> (L., 1753)	Petit boucage, Persil de Bouc						LC			LC		
Pinaceae	<i>Pinus sylvestris</i> (L., 1753)	Pin sylvestre				LC	LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Pisum sativum</i> (L., 1753)	Pois cultivé					LC	LC			VU		
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> (L., 1753)	Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures					LC	LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Plantaginaceae	<i>Plantago major</i> (L., 1753)	Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet				LC	LC	LC			LC		
Poaceae	<i>Poa annua</i> (L., 1753)	Pâturin annuel				LC		LC			LC		
Poaceae	<i>Poa bulbosa</i> (L., 1753)	Pâturin bulbeux						LC			LC		
Poaceae	<i>Poa compressa</i> (L., 1753)	Pâturin comprimé, Pâturin à tiges aplaties						LC			LC		
Poaceae	<i>Poa nemoralis</i> (L., 1753)	Pâturin des bois, Pâturin des forêts						LC			LC		
Poaceae	<i>Poa pratensis</i> (L., 1753)	Pâturin des prés						LC			LC		
Poaceae	<i>Poa trivialis</i> (L., 1753)	Pâturin commun, Gazon d'Angleterre						LC			LC		
Polygalaceae	<i>Polygala vulgaris</i> (L., 1753)	Polygala commun, Polygala vulgaire						LC			LC		
Asparagaceae	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785	Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore						LC			LC		
Asparagaceae	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) (Druce, 1906)	Sceau de salomon odorant, Polygonate officinal					LC	LC			LC		
Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i> (L., 1753)	Renouée des oiseaux, Renouée Traîlasse					LC	LC			LC		
Dryopteridaceae	<i>Polystichum setiferum</i> ((Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913)	Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, Aspidium à cils raides				LC	LC	LC			LC		
Salicaceae	<i>Populus nigra</i> subsp. <i>nigra</i> L.	Peuplier noir							ZH				
Salicaceae	<i>Populus tremula</i> (L., 1753)	Peuplier Tremble				LC	LC	LC			LC		
Salicaceae	<i>Populus x canadensis</i> (Moench, 1785)	Peuplier du Canada, Peuplier hybride euraméricain											
Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i> (L., 1753)	Pourpier cultivé, Porcelane				LC		LC			LC		
Rosaceae	<i>Potentilla argentea</i> (L., 1753)	Potentille argentée						DD			LC		
Rosaceae	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Räusch., 1797	Potentille tormentille					LC	LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Rosaceae	<i>Potentilla neglecta</i> (Baumg., 1816)	Potentille négligée						LC			DD		
Rosaceae	<i>Potentilla reptans</i> (L., 1753)	Potentille rampante, Quintefeuille						LC			LC		
Rosaceae	<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke, 1856	Potentille faux fraisier, Potentille stérile						LC			LC		
Rosaceae	<i>Potentilla verna</i> (L., 1753)	Potentille de Tabernaemontanus						LC					
Rosaceae	<i>Poterium sanguisorba</i> (L., 1753)	Pimprenelle à fruits réticulés						LC			LC		
Asteraceae	<i>Prenanthes purpurea</i> (L., 1753)	Prénanthe pourpre, Prénanthès						LC			LC		
Primulaceae	<i>Primula veris</i> (L., 1753)	Coucou, Primevère officinale, Brérelle					LC	LC			LC		
Primulaceae	<i>Primula vulgaris</i> (Huds., 1762)	Primevère acaule						LC			LC		
Lamiaceae	<i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763	Brunelle laciniée						LC			LC		
Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i> (L., 1753)	Brunelle commune, Herbe au charpentier				LC	LC	LC			LC		
Rosaceae	<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	Merisier vrai, Cerisier des bois				LC	LC	LC			LC		
Rosaceae	<i>Prunus cerasus</i> (L., 1753)	Cerisier acide, Griottier						NA					
Rosaceae	<i>Prunus domestica</i> (L., 1753)	Prunier domestique, Prunier				DD	DD	NA					
Rosaceae	<i>Prunus laurocerasus</i> (L., 1753)	Laurier-cerise, Laurier-palme				LC	LC	NA		E2			
Rosaceae	<i>Prunus mahaleb</i> (L., 1753)	Bois de Sainte-Lucie, Prunier de Sainte-Lucie, Amarel				LC	LC	LC			LC		
Rosaceae	<i>Prunus padus</i> (L., 1753)	Cerisier à grappes, Putiet, Merisier à grappes, Putier				LC	LC	LC	ZH		LC		
Rosaceae	<i>Prunus serrulata</i> Lindl., 1830	Cerisier du Japon											
Rosaceae	<i>Prunus spinosa</i> (L., 1753)	Épine noire, Prunellier, Pelossier				LC	LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Pulicaria vulgaris</i> (Gaertn., 1791)	Herbe de Saint-Roch, Pulicaire annuelle, Pulicaire commune		Art.1		LC		LC	ZH		EN		Z

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Fagaceae	<i>Quercus petraea</i> (Liebl., 1784)	Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets				LC	LC	LC			LC		
Fagaceae	<i>Quercus pubescens</i> (Willd., 1805)	Chêne pubescent					LC	LC			LC		
Fagaceae	<i>Quercus robur</i> (L., 1753)	Chêne pédonculé, Gravelin				LC	LC	LC			LC		
Fagaceae	<i>Quercus x kernerii</i> (Simkovic, 1883)	Chêne de Kerner											
Ranunculaceae	<i>Ranunculus acris</i> (L., 1753)	Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre						LC			LC		
Ranunculaceae	<i>Ranunculus arvensis</i> (L., 1753)	Renoncule des champs, Chaussée-trappe des blés			C			LC			LC		
Ranunculaceae	<i>Ranunculus auricomus</i> (L., 1753)	Renoncule à tête d'or, Renoncule Tête-d'or						LC			LC		
Ranunculaceae	<i>Ranunculus bulbosus</i> (L., 1753)	Renoncule bulbeuse						LC			LC		
Ranunculaceae	<i>Ranunculus flammula</i> (L., 1753)	Renoncule flammette, Petite douve, Flammule				LC	LC	LC	ZH		LC		
Ranunculaceae	<i>Ranunculus paludosus</i> (Poir., 1789)	Renoncule des marais, Renoncule à feuilles de cerfeuil						LC			LC		
Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i> (L., 1753)	Renoncule rampante					LC	LC	ZH		LC		
Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i> (L., 1753)	Ravenelle, Radis sauvage					LC	LC			LC		
Resedaceae	<i>Reseda lutea</i> (L., 1753)	Réséda jaune, Réséda bâtard						LC			LC		
Resedaceae	<i>Reseda luteola</i> (L., 1753)	Réséda jaunâtre, Réséda des teinturiers, Mignonette jaunâtre						LC			LC		
Resedaceae	<i>Reseda phyteuma</i> (L., 1753)	Réséda raiponce						LC					
Polygonaceae	<i>Reynoutria japonica</i> (Houtt., 1777)	Renouée du Japon						NA		A5 LN NI			
Polygonaceae	<i>Reynoutria x bohemica</i> Chrtek & Chrtkova, 1983	Renouée de Bohême								A5			

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Orobanchaceae	<i>Rhinanthus minor</i> (L., 1756)	Petit cocriste, Petit Rhinanthé						LC			LC		
Grossulariaceae	<i>Ribes rubrum</i> L., 1753	Groseillier rouge, Groseillier à grappes						LC	ZH		LC		
Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i> (L., 1753)	Robinier faux-acacia, Carouge				LC		NA		A5			
Rosaceae	<i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798	Rosier des haies, Églantier agreste					LC	LC			LC		
Rosaceae	<i>Rosa arvensis</i> (Huds., 1762)	Rosier des champs, Rosier rampant						LC			LC		
Rosaceae	<i>Rosa canina</i> (L., 1753)	Rosier des chiens, Rosier des haies					LC	LC			LC		
Rosaceae	<i>Rubus caesius</i> (L., 1753)	Rosier bleue, Ronce à fruits bleus, Ronce bleue					LC	LC	ZH		LC		
Rosaceae	<i>Rubus fruticosus</i> (L., 1753)	Ronce ligneuse, Ronce de Bertram, Ronce commune									DD		
Rosaceae	<i>Rubus plicatus</i> (Weihe & Nees, 1822)												
Rosaceae	<i>Rubus sp</i>	Ronce											
Polygonaceae	<i>Rumex acetosa</i> (L., 1753)	Oseille des prés, Rumex oseille						LC			LC		
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> (L., 1753)	Petite oseille, Oseille des brebis					LC	LC			LC		
Polygonaceae	<i>Rumex conglomeratus</i> (Murray, 1770)	Patience agglomérée, Oseille agglomérée						LC	ZH		LC		
Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i> (L., 1753)	Patience crépue, Oseille crépue					LC	LC			LC		
Polygonaceae	<i>Rumex obtusifolius</i> (L., 1753)	Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage						LC			LC		
Polygonaceae	<i>Rumex pulcher</i> L., 1753	Patience élégante, Rumex joli						LC			LC		
Polygonaceae	<i>Rumex sanguineus</i> (L., 1753)	Patience sanguine						LC	ZH		LC		
Salicaceae	<i>Salix alba</i> (L., 1753)	Saule blanc, Saule commun				LC	LC	LC	ZH		LC		
Salicaceae	<i>Salix caprea</i> (L., 1753)	Saule marsault, Saule des chèvres					LC	LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Salicaceae	<i>Salix fragilis</i> (L., 1753)	Saule fragile					LC	LC	ZH		LC		
Salicaceae	<i>Salix purpurea</i> (L., 1753)	Osier rouge, Osier pourpre				LC	LC	LC	ZH		LC		
Salicaceae	<i>Salix viminalis</i> L., 1753	Osier blanc				LC	LC	LC	ZH		LC		
Lamiaceae	<i>Salvia pratensis</i> (L., 1753)	Sauge des prés, Sauge commune						LC			LC		
Lamiaceae	<i>Salvia verticillata</i> L.	Sauge verticillée						LC					
Adoxaceae	<i>Sambucus nigra</i> (L., 1753)	Sureau noir, Sampéquier						LC			LC		
Caryophyllaceae	<i>Saponaria officinalis</i> (L., 1753)	Saponaire officinale, Savonnière, Herbe à savon					LC	LC			LC		
Saxifragaceae	<i>Saxifraga granulata</i> (L., 1753)	Saxifrage granulé, Herbe à la gravelle						LC			LC		
Caprifoliaceae	<i>Scabiosa columbaria</i> (L., 1753)	Scabieuse colombarie						LC			LC		
Cyperaceae	<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják, 1972	Scirpe-jonc				LC		LC	ZH		LC		
Cyperaceae	<i>Scirpus sylvaticus</i> (L., 1753)	Scirpe des bois, Scirpe des forêts				LC	LC	LC	ZH		LC		
Caryophyllaceae	<i>Scleranthus annuus</i> (L., 1753)	Gnabelle annuelle			C			LC			LC		
Caryophyllaceae	<i>Scleranthus perennis</i> (L., 1753)	Scléranthe vivace						LC			LC		
Scrophulariaceae	<i>Scrophularia nodosa</i> (L., 1753)	Scrophulaire noueuse					LC	LC			LC		
Crassulaceae	<i>Sedum acre</i> (L., 1753)	Poivre de muraille, Orpin acre					LC	LC			LC		
Crassulaceae	<i>Sedum album</i> (L., 1753)	Orpin blanc						LC			LC		
Crassulaceae	<i>Sedum cepaea</i> L., 1753	Orpin pourpier, Orpin paniculé						LC			LC		
Crassulaceae	<i>Sedum hirsutum</i> (All., 1785)	Orpin hérissé, Sédum hérissé						LC			LC		
Crassulaceae	<i>Sedum sexangulare</i> (L., 1753)	Orpin de Bologne, Orpin doux, Orpin à six angles						LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Asteraceae	<i>Senecio inaequidens</i> (DC., 1838)	Séneçon sud-africain						NA		A4			
Asteraceae	<i>Senecio viscosus</i> (L., 1753)	Séneçon visqueux						LC			LC		
Asteraceae	<i>Senecio vulgaris</i> (L., 1753)	Séneçon commun						LC			LC		
Poaceae	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult., 1817	Sétaire glauque, Sétaire naine						LC			LC		
Caryophyllaceae	<i>Silene latifolia</i> (Poir., 1789)	Compagnon blanc, Silène à feuilles larges						LC			LC		
Caryophyllaceae	<i>Silene nutans</i> (L., 1753)	Silène nutans, Silène penché						LC			LC		
Caryophyllaceae	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869	Silène enflé, Tapotte				LC		LC			LC		
Brassicaceae	<i>Sinapis arvensis</i> (L., 1753)	Moutarde des champs, Raveluche					LC	LC			LC		
Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop., 1772	Herbe aux chantes, Sisymbre officinal					LC	LC			LC		
Solanaceae	<i>Solanum dulcamara</i> (L., 1753)	Douce amère, Bronde					LC	LC	ZH		LC		
Solanaceae	<i>Solanum nigrum</i> (L., 1753)	Morelle noire						LC			LC		
Asteraceae	<i>Solidago virgaurea</i> L., 1753	Solidage verge d'or, Herbe des Juifs					LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769	Laiteron rude, Laiteron piquant						LC			LC		
Asteraceae	<i>Sonchus oleraceus</i> (L., 1753)	Laiteron potager, Laiteron lisse						LC			LC		
Rosaceae	<i>Sorbus aucuparia</i> (L., 1753)	Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage				LC	LC	LC			LC		
Caryophyllaceae	<i>Spergula morisonii</i> (Boreau, 1847)	Spargoute printanière, Spergule de Morison, Espargoutte de printemps						LC			LC		
	<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. & C. Presl										LC		
Lamiaceae	<i>Stachys byzantina</i> (K. Koch, 1848)	Épiaire laineuse, Épiaire de Byzance						NA					
Lamiaceae	<i>Stachys germanica</i> (L., 1753)	Épiaire d'Allemagne, Sauge molle						LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Lamiaceae	<i>Stachys sylvatica</i> (L., 1753)	Épiaire des bois, Ortie à crapauds						LC			LC		
Caryophyllaceae	<i>Stellaria alsine</i> (Grimm, 1767)	Stellaire des sources						LC	ZH		LC		
Caryophyllaceae	<i>Stellaria graminea</i> (L., 1753)	Stellaire graminée						LC			LC		
Caryophyllaceae	<i>Stellaria holostea</i> (L., 1753)	Stellaire holostée					LC	LC			LC		
Caryophyllaceae	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789	Mouron des oiseaux, Morgeline					LC	LC			LC		
Caprifoliaceae	<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S.F.Blake, 1914	Symphorine à fruits blancs, Symphorine à grappes						NA		E2			
Boraginaceae	<i>Symphytum officinale</i> (L., 1753)	Grande consoude					LC	LC	ZH		LC		
Oleaceae	<i>Syringa vulgaris</i> (L., 1753)	Lilas					LC	NA					
Asteraceae	<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch.Bip., 1844	Grande camomille, Tanaïs Parthénium					LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Tanacetum vulgare</i> (L., 1753)	Tanaïs commune, Sent-bon						LC			LC		
Asteraceae	<i>Taraxacum</i> sp												
Brassicaceae	<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br., 1812	Téedalie à tige nue						LC			LC		
Lamiaceae	<i>Teucrium scorodonia</i> (L., 1753)	Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodaine					LC	LC			LC		
Cupressaceae	<i>Thuja occidentalis</i> (L., 1753)	Thuya du Canada, Thuya d'Occident				LC		NA		1			
Lamiaceae	<i>Thymus pseudochamaedrys</i> (Heinr.Braun) Ronniger	Thym faux Petit-Chêne						DD					
Lamiaceae	<i>Thymus pulegioides</i> (L., 1753)	Thym commun, Thym faux Pouliot						LC			LC		
Malvaceae	<i>Tilia platyphyllos</i> (Scop., 1771)	Tilleul à grandes feuilles				LC	LC	LC			LC		
Apiaceae	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC., 1830	Torilis faux-cerfeuil, Grattau						LC			LC		
Asteraceae	<i>Tragopogon pratensis</i> (L., 1753)	Salsifis des prés						LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Poaceae	<i>Tragus racemosus</i> (L.) All., 1785	Bardanette en grappe, Bardanette rameuse						LC			LC		
Fabaceae	<i>Trifolium arvense</i> (L., 1753)	Trèfle des champs, Pied de lièvre, Trèfle Pied-de-lièvre					LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Trifolium campestre</i> (Schreb., 1804)	Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance						LC			LC		
Fabaceae	<i>Trifolium dubium</i> (Sibth., 1794)	Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune						LC			LC		
Fabaceae	<i>Trifolium pratense</i> (L., 1753)	Trèfle des prés, Trèfle violet				LC	LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Trifolium repens</i> (L., 1753)	Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande					LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Trifolium striatum</i> (L., 1753)	Trèfle strié						LC			LC		
Fabaceae	<i>Trifolium subterraneum</i> L., 1753	Trèfle semeur, Trèfle souterrain, Trèfle enterreur				LC	LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip, 1844	Matricaire inodore						LC			LC		
Poaceae	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv, 1812	Trisetè commune, Avoine dorée						LC			LC		
Asteraceae	<i>Tussilago farfara</i> (L., 1753)	Tussilage, Pas-d'âne, Herbe de saint Quirin					LC	LC			LC		
Crassulaceae	<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy, 1948	Nombril de vénus, Oreille-d'abbé						LC			LC		
Urticaceae	<i>Urtica dioica</i> (L., 1753)	Ortie dioïque, Grande ortie				LC	LC	LC			LC		
Ericaceae	<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753	Myrtille, Maurette					LC	LC			LC		
Caprifoliaceae	<i>Valeriana officinalis</i> (L., 1753)	Valériane officinale, Valériane des collines					LC	LC			LC		
Caprifoliaceae	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr, 1821	Mache doucette, Mache						LC			LC		
Hymenophyllaceae	<i>Vandenboschia speciosa</i> (Willd.) Kunkel, 1966	Trichomanès remarquable	II/IV	Art.1				LC			NT		Z
Scrophulariaceae	<i>Verbascum densiflorum</i> (Bertol., 1810)	Molène faux-bEndllon-blanc, Molène à fleurs denses					LC	LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Scrophulariaceae	<i>Verbascum pulverulentum</i> (Vill., 1779)	Molène pulvérulente						LC			LC		
Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i> (L., 1753)	Molène bEndllon-blanc, Herbe de saint Fiacre					LC	LC			LC		
Verbenaceae	<i>Verbena officinalis</i> (L., 1753)	Verveine officinale, Verveine sauvage					LC	LC			LC		
Plantaginaceae	<i>Veronica arvensis</i> (L., 1753)	Véronique des champs, Velvete sauvage						LC			LC		
Plantaginaceae	<i>Veronica beccabunga</i> (L., 1753)	Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux				LC	LC	LC	ZH		LC		
Plantaginaceae	<i>Veronica chamaedrys</i> (L., 1753)	Véronique petit chêne, Fausse Germandrée						LC			LC		
Plantaginaceae	<i>Veronica hederifolia</i> (L., 1753)	Véronique à feuilles de lierre						LC			LC		
Plantaginaceae	<i>Veronica officinalis</i> (L., 1753)	Véronique officinale, Herbe aux ladres					LC	LC			LC		
Plantaginaceae	<i>Veronica persica</i> (Poir., 1808)	Véronique de Perse						NA		1			
Plantaginaceae	<i>Veronica polita</i> (Fr., 1819)	Véronique luisante, Véronique brillante						LC			LC		
Plantaginaceae	<i>Veronica serpyllifolia</i> (L., 1753)	Véronique à feuilles de serpolet				LC		LC			LC		
Plantaginaceae	<i>Veronica triphyllos</i> (L., 1753)	Véronique à feuilles trilobées, Véronique à trois lobes						NT			NT		
Fabaceae	<i>Vicia cracca</i> (L., 1753)	Vesce cracca, Jarosse, Vesce à épis						LC			LC		
Fabaceae	<i>Vicia lathyroides</i> (L., 1753)	Vesce printannière, Vesce fausse Gesse					LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Vicia orobus</i> (DC., 1815)	Vesce orobe				LC		LC			NT		
Fabaceae	<i>Vicia sativa</i> (L., 1753)	Vesce cultivée, Poisette				EN	LC	NA		1	LC		
Fabaceae	<i>Vicia segetalis</i> (Thuill., 1799)	Vesce des moissons						LC					
Fabaceae	<i>Vicia sepium</i> (L., 1753)	Vesce des haies				LC	LC	LC			LC		
Apocynaceae	<i>Vinca minor</i> (L., 1753)	Petite pervenche, Violette de serpent					LC	LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Violaceae	<i>Viola arvensis</i> (Murray, 1770)	Pensée des champs			C 1		LC	LC			LC		
Violaceae	<i>Viola hirta</i> (L., 1753)	Violette hérissée						LC			LC		
Violaceae	<i>Viola odorata</i> (L., 1753)	Violette odorante					LC	LC			LC		
Violaceae	<i>Viola reichenbachiana</i> (Jord. ex Boreau, 1857)	Violette des bois, Violette de Reichenbach						LC			LC		
Violaceae	<i>Viola riviniana</i> (Rchb., 1823)	Violette de Rivinus, Violette de rivin						LC			LC		
Santalaceae	<i>Viscum album</i> (L., 1753)	Gui des feuillus, Gui blanc, Gui, Bois de la Sainte-Croix					LC	LC			LC		
Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i> (L., 1753)	Vigne cultivée				LC	LC	LC			DD		
Poaceae	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel, 1805	Vulpie queue-de-rat, Vulpie Queue-de-souris						LC			LC		

3.2 AVIFAUNE

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DO]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN ^h]	[LRN ^h]	[LRN ^p]	[LRR ^h] RA	[LRR ^h] RA	[LRR ^p] RA	[Z ⁿ] RA	[Z ^h] RA	Enjeu réglementaire	Potentialité	Statut potentiel	Enjeu local
Phasianidae	<i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758)	Perdrix rouge	DOII /1 DOIII /2			LC	NT	LC			RE					MAJ	Non potentielle	/	TFA
Picidae	<i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	Pic mar	DOI	Art.3		LC	LC	LC			CR			Z	C	MAJ	Non potentielle	/	TFA
Laniidae	<i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche grise		Art.3	RC	NE1		EN	NA ^d		CR	VU	VU	Z	C	MAJ	Non potentielle	/	TFA
Locustellidae	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	Locustelle tachetée		Art.3		LC	LC	NT		NA ^c	CR		VU	Z		MAJ	Non potentielle	/	TFA
Scolopacidae	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	Chevalier guignette		Art.3		LC	LC	NT	NA ^c	DD	EN		LC	Z	C	TFO	Non potentielle	/	TFA
Alcedinidae	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Martin-pêcheur d'Europe	DOI	Art.3		LC	LC	VU	NA ^c		VU	DD		Z	C	TFO	Potentielle	Nidification	TFO
Ardeidae	<i>Ardea alba</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Aigrette	DOI	Art.3		LC	LC	NT	LC		NA	LC	LC		Z	TFO	Potentielle	Nourrissage	FO
Strigidae	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand-duc d'Europe	DOI	Art.3		LC	LC	LC			VU				C	TFO	Non potentielle	/	TFA
Burhinidae	<i>Burhinus oedichemus</i> (Linnaeus, 1758)	Oedichème criard	DOI	Art.3		LC	LC	LC	NA ^d	NA ^d	VU		VU	Z		TFO	Non potentielle	/	TFA
Caprimulgidae	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Engoulevent d'Europe	DOI	Art.3		LC	LC	LC		NA ^c	LC		LC			TFO	Non potentielle	/	TFA
Ciconiidae	<i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)	Cigogne blanche	DOI	Art.3		LC	LC	LC	NA ^c	NA ^d	VU	NT	LC		C	TFO	Non potentielle	/	TFA
Accipitridae	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Circaète Jean-le-Blanc	DOI	Art.3		LC	LC	LC		NA ^d	NT		LC			TFO	Non potentielle	/	TFA

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DO]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRNn]	[LRNh]	[LRNp]	[LRRn] RA	[LRRh] RA	[LRRp] RA	[Zn] RA	[Zh] RA	Enjeu réglementaire	Potentialité	Statut potentiel	Enjeu local
Accipitridae	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard des roseaux	DOI	Art.3		LC	LC	NT	NA ^d	NA ^d	VU	NA	LC		C	TFO	Non potentielle	/	TFA
Accipitridae	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard Saint-Martin	DOI	Art.3		LC	NT	LC	NA ^c	NA ^d	VU	VU	LC			TFO	Non potentielle	/	TFA
Accipitridae	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard cendré	DOI	Art.3		LC	LC	NT		NA ^d	EN		LC	Z		TFO	Non potentielle	/	TFA
Accipitridae	<i>Clanga clanga</i> (Pallas, 1811)	Aigle criard	DOI	Art.3		VU	VU			NA ^b						TFO	Non potentielle	/	TFA
Rallidae	<i>Crex crex</i> (Linnaeus, 1758)	Râle des genêts	DOI	Art.3 PM1	RCU	LC		EN		NA ^d	CR		CR			TFO	Non potentielle	/	TFA
Picidae	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Pic noir	DOI	Art.3		LC	LC	LC			LC			C	C	TFO	Non potentielle	/	TFA
Ardeidae	<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	Aigrette garzette	DOI	Art.3		LC	LC	LC	NA ^c		NT	VU	LC		C	TFO	Potentielle	Nourrissage	FO
Emberizidae	<i>Emberiza calandra</i> (Linnaeus, 1758)	Bruant proyer		Art.3		LC	LC	LC			EN	EN	EN	Z	C	TFO	Non potentielle	/	TFA
Emberizidae	<i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758	Bruant ortolan	DOI	Art.3		LC	LC	EN		EN	EN		VU	Z		TFO	Non potentielle	/	TFA
Emberizidae	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	Bruant des roseaux		Art.3		LC	LC	EN		NA ^c	VU	LC	LC	Z	C	TFO	Non potentielle	/	TFA
Charadriidae	<i>Eudromias morinellus</i> (Linnaeus, 1758)	Pluvier guignard	DOI	Art.3		LC		RE		NT	NA		DD			TFO	Non potentielle	/	TFA
Falconidae	<i>Falco peregrinus</i> (Tunstall, 1771)	Faucon pèlerin	DOI	Art.3		LC	LC	LC	NA ^d	NA ^d	VU	LC	NA		C	TFO	Non potentielle	/	TFA
Gaviidae	<i>Gavia immer</i> (Brinnich, 1764)	Plongeon imbrin	DOI	Art.3		LC			VU			NA	NA			TFO	Non potentielle	/	TFA
Gruidae	<i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758)	Grue cendrée	DOI	Art.3		LC	LC	CR	NT	NA ^c	NA	NA	LC		Z	TFO	Non potentielle	/	TFA
Accipitridae	<i>Gypaetus barbatus</i> (Linnaeus, 1758)	Gypaète barbu	DOI	Art.3 PM1	RC	NT	NT	EN			NA	CR				TFO	Non potentielle	/	TFA

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DO]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRNn]	[LRNh]	[LRNp]	[LRNn] RA	[LRRh] RA	[LRRp] RA	[Zn] RA	[Zh] RA	Enjeu réglementaire	Potentialité	Statut potentiel	Enjeu local
Accipitridae	<i>Gyps fulvus</i> (Hablizl, 1783)	Vautour fauve	DOI	Art.3	RCU	LC	LC	LC			VU				C	TFO	Non potentielle	/	TFA
Accipitridae	<i>Hieraaetus pennatus</i> (Gmelin, 1788)	Aigle botté	DOI	Art.3		LC	LC	NT	NA ^c		CR	NA	NA			TFO	Non potentielle	/	TFA
Hirundinidae	<i>Hirundo rustica</i> (Linnaeus, 1758)	Hirondelle rustique		Art.3		LC	LC	NT		DD	EN	NA	LC	C		TFO	Potentielle	Nidification	TFO
Laniidae	<i>Lanius collurio</i> (Linnaeus, 1758)	Pie-grièche écorcheur	DOI	Art.3		LC	LC	NT	NA ^c	NA ^d	LC		LC	Z		TFO	Non potentielle	/	TFA
Alaudidae	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Alouette lulu	DOI	Art.3		LC	LC	LC	NA ^c		VU	DD	DD	Z	C	TFO	Non potentielle	/	TFA
Accipitridae	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Milan noir	DOI	Art.3		LC	LC	LC		NA ^d	LC	NA	LC	C	C	TFO	Potentielle	En transit	MO
Accipitridae	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	Milan royal	DOI	Art.3	RCU	NT	NT	VU	VU	NA ^c	CR	CR	LC			TFO	Potentielle	En transit	MO
Passeridae	<i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758)	Moineau friquet		Art.3		LC	LC	EN			VU			Z	C	TFO	Non potentielle	/	TFA
Phasianidae	<i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758)	Perdrix grise	DOII /1 DOIII /1			LC	LC	LC			CR					TFO	Non potentielle	/	TFA
Accipitridae	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Bondrée apivore	DOI	Art.3		LC	LC	LC		LC	NT		LC			TFO	Potentielle	Nidification	TFO
Phylloscopidae	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	Pouillot siffleur		Art.3		LC	LC	NT		NA ^d	EN		DD	Z		TFO	Potentielle	Nidification	TFO
Scolopacidae	<i>Tringa glareola</i> (Linnaeus, 1758)	Chevalier sylvain	DOI	Art.3		LC	LC			LC			LC			TFO	Non potentielle	/	TFA
Upupidae	<i>Upupa epops</i> (Linnaeus, 1758)	Huppe fasciée		Art.3		LC	LC	LC	NA ^d		EN	NA	VU	Z		TFO	Potentielle	Nourrissage	FO
Charadriidae	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Vanneau huppé	DOII /2	Art.3		NT	VU	NT	LC	NA ^d	EN	VU	DD	Z		TFO	Non potentielle	/	TFA

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DO]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRNn]	[LRNh]	[LRNp]	[LRNn] RA	[LRRh] RA	[LRRp] RA	[Zn] RA	[Zh] RA	Enjeu réglementaire	Potentialité	Statut potentiel	Enjeu local
Motacillidae	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit farlouse		Art.3		NT	LC	VU	DD	NA ^d	LC	LC	LC	Z	C	FO	Non potentielle	/	TFA
Strigidae	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Chevêche d'Athéna		Art.3		LC	LC	LC			VU			Z	C	FO	Non potentielle	/	TFA
Fringillidae	<i>Chloris chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Verdier d'Europe		Art.3		LC	LC	VU	NA ^d	NA ^d	LC	LC	LC	C		FO	Potentielle	Nidification	FO
Hirundinidae	<i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de fenêtre		Art.3		LC	LC	NT		DD	VU	NA	LC	C		FO	Potentielle	Nidification	FO
Picidae	<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	Pic épeichette		Art.3		LC	LC	VU			LC			C	C	FO	Peu potentielle	Nidification	MO
Emberizidae	<i>Emberiza citrinella</i> (Linnaeus, 1758)	Bruant jaune		Art.3		LC	LC	VU	NA ^d	NA ^d	VU	DD	DD	Z	C	FO	Potentielle	Nidification	FO
Muscicapidae	<i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764)	Gobemouche noir		Art.3		LC	LC	VU		DD	VU		LC	Z		FO	Peu potentielle	Nidification	MO
Threskiornithidae	<i>Geronticus eremita</i>	Ibis chauve		Art.4		EN										FO	Non potentielle	/	TFA
Fringillidae	<i>Linaria cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Linotte mélodieuse		Art.3		LC	LC	VU	NA ^d	NA ^c	LC	LC	LC	C	C	FO	Potentielle	Nidification	FO
Paridae	<i>Poecile montanus</i> (Conrad, 1827)	Mésange boréale		Art.3		LC	LC	VU			LC	LC	LC	Z	C	FO	Non potentielle	/	TFA
Hirundinidae	<i>Ptyonoprogne rupestris</i> (Scopoli, 1769)	Hirondelle de rochers		Art.3		LC	LC	LC		NA ^d	LC	VU	LC	C	C	FO	Non potentielle	/	TFA
Fringillidae	<i>Pyrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Bouvreuil pivoine		Art.3		LC	LC	VU	NA ^d		LC	VU	LC	C	C	FO	Potentielle	Nidification	FO
Muscicapidae	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Tarier des prés		Art.3		LC	LC	VU		DD	VU		DD	Z		FO	Non potentielle	/	TFA
Fringillidae	<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	Serin cini		Art.3		LC	LC	VU		NA ^d	LC	LC	DD	C	C	FO	Potentielle	Nidification	FO
Alaudidae	<i>Alauda arvensis</i> (Linnaeus, 1758)	Alouette des champs	DOII /2			LC	LC	NT	LC	NA ^d	VU	VU	VU		C	MO	Non potentielle	/	TFA

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DO]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRNn]	[LRNh]	[LRNp]	[LRrn] RA	[LRrh] RA	[LRrp] RA	[Zn] RA	[Zh] RA	Enjeu réglementaire	Potentialité	Statut potentiel	Enjeu local
Motacillidae	<i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit spioncelle		Art.3		LC	LC	LC	NA ^d	NA ^d	LC	LC	LC	Z	C	MO	Non potentielle	/	TFA
Apodidae	<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	Martinet noir		Art.3		LC	NT	NT		DD	LC		LC	C		MO	Potentielle	Nidification	MO
Accipitridae	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Buse variable		Art.3		LC	LC	LC	NA ^c	NA ^c	NT	LC	LC	C	C	MO	Potentielle	Nidification	MO
Charadriidae	<i>Charadrius dubius</i> (Scopoli, 1786)	Petit Gravelot		Art.3		LC	LC	LC		NA ^c	NT	NA	DD	Z		MO	Non potentielle	/	TFA
Laridae	<i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linnaeus, 1766)	Mouette rieuse	DOII /2	Art.3		LC	LC	NT	LC	NA ^d	LC	LC	LC		C	MO	Non potentielle	/	TFA
Cinclidae	<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	Cincle plongeur		Art.3		LC	LC	LC			LC			Z	C	MO	Potentielle	Nidification	MO
Columbidae	<i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	Pigeon colombin	DOII /2			LC	LC	LC	NA ^d	NA ^d	VU	VU	DD	Z		MO	Potentielle	Nidification	MO
Corvidae	<i>Corvus monedula</i> (Linnaeus, 1758)	Choucas des tours	DOII /2	Art.3		LC	LC	LC	NA ^d		NT	LC	LC	C	C	MO	Potentielle	Nidification	MO
Phasianidae	<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	Caille des blés	DOII /2			LC	NT	LC		NA ^d	VU	NA	VU	Z		MO	Non potentielle	/	TFA
Emberizidae	<i>Emberiza cia</i> (Linnaeus, 1766)	Bruant fou		Art.3		LC	LC	LC			LC	LC	LC	Z	C	MO	Non potentielle	/	TFA
Falconidae	<i>Falco tinnunculus</i> (Linnaeus, 1758)	Faucon crécerelle		Art.3		LC	LC	NT	NA ^d	NA ^d	LC	LC	LC	C	C	MO	Potentielle	Nidification	MO
Fringillidae	<i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758	Bec-croisé des sapins		Art.3		LC	LC	LC		NA ^d	LC	LC	LC	Z	C	MO	Non potentielle	/	TFA
Meropidae	<i>Merops apiaster</i> (Linnaeus, 1758)	Guêpier d'Europe		Art.3		LC	LC	LC		NA ^d	VU		DD	Z		MO	Non potentielle	/	TFA
Motacillidae	<i>Motacilla flava</i> (Linnaeus, 1758)	Bergeronnette printanière		Art.3		LC	LC	LC		DD	NT		LC	C		MO	Peu potentielle	Nourrissage	FA

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DO]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRNn]	[LRNh]	[LRNp]	[LRNn] RA	[LRRh] RA	[LRRp] RA	[Zn] RA	[Zh] RA	Enjeu réglementaire	Potentialité	Statut potentiel	Enjeu local
Muscicapidae	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	Gobemouche gris		Art.3		LC	LC	NT		DD	NT		DD	C		MO	Potentielle	Nidification	MO
Scolopacidae	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Courlis cendré	DOII /2			NT	VU	VU	LC	NA ^d	VU	DD	DD	Z		MO	Non potentielle	/	TFA
Muscicapidae	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	Traquet motteux		Art.3		LC	LC	NT		DD	LC	NA	LC	Z		MO	Non potentielle	/	TFA
Passeridae	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Moineau domestique		Art.3		NE1	LC	LC		NA ^b	NT			C	C	MO	Potentielle	Nidification	MO
Phylloscopidae	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Pouillot fitis		Art.3		LC	LC	NT		DD	NT	NA	LC	C		MO	Potentielle	Nidification	MO
Regulidae	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Roitelet huppé		Art.3		LC	LC	NT	NA ^d	NA ^d	LC	LC	LC	C	C	MO	Non potentielle	/	TFA
Muscicapidae	<i>Saxicola rubicola</i> (Linnaeus, 1766)	Tarier pâtre		Art.3		NE2	LC	NT	NA ^d	NA ^d	LC	LC	LC	C	C	MO	Non potentielle	/	TFA
Fringillidae	<i>Spinus spinus</i> (Linnaeus, 1758)	Tarin des aulnes		Art.3		LC	LC	LC	DD	NA ^d	DD	LC	LC	Z	C	MO	Potentielle	Nidification	MO
Columbidae	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Tourterelle des bois	DOII /2			VU	VU	VU		NA ^c	NT		LC	Z		MO	Potentielle	Nidification	MO
Sylviidae	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Fauvette des jardins		Art.3		LC	LC	NT		DD	LC		LC	Z		MO	Potentielle	Nidification	MO
Sylviidae	<i>Sylvia communis</i> (Latham, 1787)	Fauvette grisette		Art.3		LC	LC	LC		DD	NT		DD	C		MO	Potentielle	Nidification	MO
Podicipedidae	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Grèbe castagneux		Art.3		LC	LC	LC	NA ^d		LC	LC	LC	Z	C	MO	Non potentielle	/	TFA
Sittidae	<i>Tichodroma muraria</i> (Linnaeus, 1758)	Tichodrome échelette		Art.3		LC		NT			LC	LC	NA	C	C	MO	Non potentielle	/	TFA
Turdidae	<i>Turdus pilaris</i> (Linnaeus, 1758)	Grive litorne	DOII /2			LC	LC	LC	LC		LC	LC	LC	Z		MO	Potentielle	Nidification	MO
Turdidae	<i>Turdus torquatus</i> Linnaeus, 1758	Merle à plastron		Art.3		LC	LC	LC		DD				Z	C	MO	Non potentielle	/	TFA

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DO]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRNn]	[LRNh]	[LRNp]	[LRNn] RA	[LRRh] RA	[LRRp] RA	[Zn] RA	[Zh] RA	Enjeu réglementaire	Potentialité	Statut potentiel	Enjeu local
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	Effraie des clochers		Art.3		LC	LC	LC			VU	LC		Z	C	MO	Non potentielle	/	TFA
Accipitridae	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Autour des palombes		Art.3 & 6		LC	LC	LC	NA ^c	NA ^d	LC	LC			C	FA	Potentielle	Nidification	FA
Accipitridae	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Epervier d'Europe		Art.3 & 6		LC	LC	LC	NA ^c	NA ^d	LC	LC	LC	C	C	FA	Potentielle	Nidification	FA
Aegithalidae	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange à longue queue		Art.3		LC	LC	LC		NA ^b	LC			C	C	FA	Potentielle	Nidification	FA
Motacillidae	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit des arbres		Art.3		LC	LC	LC		DD	LC		LC	C		FA	Potentielle	Nidification	FA
Ardeidae	<i>Ardea cinerea</i> (Linnaeus, 1758)	Héron cendré		Art.3		LC	LC	LC	NA ^c	NA ^d	LC	LC	LC		C	FA	Potentielle	Nourrissage	TFA
Strigidae	<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	Hibou moyen-duc		Art.3		LC	LC	LC	NA ^d	NA ^d	LC	LC	LC	C	C	FA	Peu potentielle	Nidification	TFA
Ardeidae	<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	Héron garde-boeufs		Art.3		LC	LC	LC	NA ^c		LC	LC	LC			FA	Potentielle	Nourrissage	TFA
Fringillidae	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Chardonneret élégant		Art.3		LC	LC	VU	NA ^d	NA ^d	LC	LC	LC	C	C	FA	Potentielle	Nidification	FA
Certhiidae	<i>Certhia brachydactyla</i> (C.L. Brehm, 1820)	Grimpereau des jardins		Art.3		LC	LC	LC			LC			C	C	FA	Potentielle	Nidification	FA
Cuculidae	<i>Clamator glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	Coucou geai		Art.3		LC	LC	LC			NA		NA			FA	Non potentielle	/	TFA
Fringillidae	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	Grosbec casse-noyaux		Art.3		LC	LC	LC	NA ^d		LC	LC	LC	C	C	FA	Potentielle	Nidification	FA
Corvidae	<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758	Grand corbeau		Art.3		LC	LC	LC			LC				C	FA	Non potentielle	/	TFA
Cuculidae	<i>Cuculus canorus</i> (Linnaeus, 1758)	Coucou gris		Art.3		LC	LC	LC		DD	LC		LC	C		FA	Potentielle	Nidification	FA

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DO]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRNn]	[LRNh]	[LRNp]	[LRNn] RA	[LRRh] RA	[LRRp] RA	[Zn] RA	[Zh] RA	Enjeu réglementaire	Potentialité	Statut potentiel	Enjeu local
Paridae	<i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange bleue		Art.3		LC	LC	LC		NA ^b	LC	LC	LC	C	C	FA	Potentielle	Nidification	FA
Picidae	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Pic épeiche		Art.3		LC	LC	LC	NA ^d		LC	LC	LC	C	C	FA	Potentielle	Nidification	FA
Emberizidae	<i>Emberiza cirrus</i> (Linnaeus, 1758)	Bruant zizi		Art.3		LC	LC	LC		NA ^d	LC	LC	LC	C	C	FA	Potentielle	Nidification	FA
Muscicapidae	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Rougegorge familier		Art.3		LC	LC	LC	NA ^d	NA ^d	LC	LC	LC	C	C	FA	Potentielle	Nidification	FA
Falconidae	<i>Falco subbuteo</i> (Linnaeus, 1758)	Faucon hobereau		Art.3		LC	LC	LC		NA ^d	LC		LC			FA	Potentielle	Nidification	FA
Fringillidae	<i>Fringilla coelebs</i> (Linnaeus, 1758)	Pinson des arbres		Art.3		LC	LC	LC	NA ^d	NA ^d	LC	LC		C	C	FA	Potentielle	Nidification	FA
Fringillidae	<i>Fringilla montifringilla</i> (Linnaeus, 1758)	Pinson du nord		Art.3		LC	LC		DD	NA ^d		LC	LC			FA	Potentielle	Hivernage	TFA
Rallidae	<i>Fulica atra</i> (Linnaeus, 1758)	Foulque macroule	DOII /1 DOIII /2			LC	NT	LC	NA ^c	NA ^c	LC	LC	LC			FA	Potentielle	Nourrissage	TFA
Acrocephalidae	<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	Hypolais polyglotte		Art.3		LC	LC	LC		NA ^d	LC		LC	C		FA	Potentielle	Nidification	FA
Laridae	<i>Larus michahellis</i> (Naumann, 1840)	Goéland leucopée		Art.3		LC	LC	LC	NA ^d	NA ^d	LC	LC	LC	C	C	FA	Non potentielle	/	TFA
Paridae	<i>Lophophanes cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange huppée		Art.3		LC	LC	LC			LC	LC	LC	C	C	FA	Non potentielle	/	TFA
Muscicapidae	<i>Luscinia megarhynchos</i> (C. L. Brehm, 1831)	Rossignol philomèle		Art.3		LC	LC	LC		NA ^c	LC			C		FA	Potentielle	Nidification	FA
Motacillidae	<i>Motacilla alba</i> (Linnaeus, 1758)	Bergeronnette grise		Art.3		LC	LC	LC	NA ^d		LC	LC	LC	C		FA	Potentielle	Nidification	FA
Motacillidae	<i>Motacilla cinerea</i> (Tunstall, 1771)	Bergeronnette des ruisseaux		Art.3		LC	LC	LC	NA ^d		LC	LC	LC	C	C	FA	Potentielle	Nidification	FA

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DO]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRNn]	[LRNh]	[LRNp]	[LRrn] RA	[LRrh] RA	[LRrp] RA	[Zn] RA	[Zh] RA	Enjeu réglementaire	Potentialité	Statut potentiel	Enjeu local
Oriolidae	<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	Loriot d'Europe		Art.3		LC	LC	LC		NA ^c	LC		LC	C		FA	Potentielle	Nidification	FA
Paridae	<i>Parus major</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange charbonnière		Art.3		LC	LC	LC	NA ^b	NA ^d	LC	LC	LC	C	C	FA	Potentielle	Nidification	FA
Paridae	<i>Periparus ater</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange noire		Art.3		LC		LC	NA ^d	NA ^d	LC	LC	LC	C	C	FA	Peu potentielle	Nourrissage	TFA
Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Cormoran		Art.3		LC	LC	LC	LC	NA ^d	NA	LC	LC	C		FA	Non potentielle	/	TFA
Muscicapidae	<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774)	Rougequeue noir		Art.3		LC	LC	LC	NA ^d	NA ^d	LC	LC	LC	C	C	FA	Potentielle	Nidification	FA
Muscicapidae	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	Rougequeue à front blanc		Art.3		LC	LC	LC		NA ^d	LC		LC	C		FA	Non potentielle	/	TFA
Phylloscopidae	<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)	Pouillot de Bonelli		Art.3		NE1	LC	LC		NA ^d	LC		LC	C		FA	Potentielle	Nidification	FA
Phylloscopidae	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Pouillot véloce		Art.3		LC	LC	LC	NA ^d	NA ^c	LC	LC	LC	C	C	FA	Potentielle	Nidification	FA
Corvidae	<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	Pie bavarde	DOII /2			LC	LC	LC			NT					FA	Potentielle	Nidification	FA
Picidae	<i>Picus viridis</i> (Linnaeus, 1758)	Pic vert		Art.3		LC	LC	LC			LC			C	C	FA	Potentielle	Nidification	FA
Paridae	<i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange nonnette		Art.3		LC	LC	LC			LC	LC	LC	C	C	FA	Peu potentielle	Nourrissage	TFA
Prunellidae	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Accenteur mouchet		Art.3		LC	LC	LC	NA ^c		LC	LC	LC	C	C	FA	Potentielle	Nidification	FA
Regulidae	<i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820)	Roitelet à triple bandeau		Art.3		LC	LC	LC	NA ^d	NA ^d	LC	LC	LC	C	C	FA	Potentielle	Nidification	FA
Scolopacidae	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Bécasse des bois	DOII /1D OIII/ 2			LC	LC	LC	LC	NA ^d	NT	LC	DD	Z		FA	Non potentielle	/	TFA

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DO]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRNn]	[LRNh]	[LRNp]	[LRNn] RA	[LRRh] RA	[LRRp] RA	[Zn] RA	[Zh] RA	Enjeu réglementaire	Potentialité	Statut potentiel	Enjeu local
Sittidae	<i>Sitta europaea</i> (Linnaeus, 1758)	Sittelle torchepot		Art.3		LC	LC	LC			LC			C	C	FA	Potentielle	Nidification	FA
Strigidae	<i>Strix aluco</i> (Linnaeus, 1758)	Chouette hulotte		Art.3		LC	LC	LC	NA ^c		LC			C	C	FA	Potentielle	Nidification	FA
Sylviidae	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Fauvette à tête noire		Art.3		LC	LC	LC	NA ^c	NA ^c	LC	LC	LC	C	C	FA	Potentielle	Nidification	FA
Apodidae	<i>Tachymarptis melba</i> (Linnaeus, 1758)	Martinet à ventre blanc		Art.3		LC	LC	LC			LC		LC			FA	Potentielle	Nidification	FA
Troglodytidae	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Troglodyte mignon		Art.3		LC	LC	LC	NA ^d		LC			C		FA	Potentielle	Nidification	FA
Turdidae	<i>Turdus iliacus</i> (Linnaeus, 1766)	Grive mauvis	DOII /2			NT	LC		LC	NA ^d		LC	LC			FA	Potentielle	Nidification	FA
Anatidae	<i>Anas platyrhynchos</i> (Linnaeus, 1758)	Canard colvert	DOII /1 DOIII /1			LC	LC	LC	LC	NA ^d	LC	LC	LC			TFA	Potentielle	Nourrissage	TFA
Columbidae	<i>Columba livia</i> (Gmelin, 1789)	Pigeon biset	DOII /1			LC	LC	DD								TFA	Potentielle	Nidification	TFA
Columbidae	<i>Columba palumbus</i> (Linnaeus, 1758)	Pigeon ramier	DOII /1 DOIII /1			LC	LC	LC	LC	NA ^d	LC	DD	DD			TFA	Potentielle	Nidification	TFA
Corvidae	<i>Corvus corone</i> (Linnaeus, 1758)	Corneille noire	DOII /2			LC	LC	LC	NA ^d		LC	LC	LC		C	TFA	Potentielle	Nidification	TFA
Corvidae	<i>Corvus frugilegus</i> (Linnaeus, 1758)	Corbeau freux	DOII /2			LC	VU	LC	LC		LC	LC	LC			TFA	Potentielle	Nidification	TFA
Rallidae	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Gallinule Poule-d'eau	DOII /2			LC	LC	LC	NA ^d	NA ^d	LC	LC	LC			TFA	Potentielle	Nourrissage	TFA
Corvidae	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	Geai des chênes	DOII /2			LC	LC	LC	NA ^d		LC	LC	LC			TFA	Potentielle	Nidification	TFA

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DO]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRNn]	[LRNh]	[LRNp]	[LRNn] RA	[LRRh] RA	[LRRp] RA	[Zn] RA	[Zh] RA	Enjeu réglementaire	Potentialité	Statut potentiel	Enjeu local
Phasianidae	<i>Phasianus colchicus</i> (Linnaeus, 1758)	Faisan de Colchide	DOII /1 DOIII /1			LC	LC	LC			NA					TFA	Non potentielle	/	TFA
Columbidae	<i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838)	Tourterelle turque	DOII /2			LC	LC	LC		NA ^d	LC					TFA	Potentielle	Nidification	TFA
Sturnidae	<i>Sturnus vulgaris</i> (Linnaeus, 1758)	Etourneau sansonnet	DOII /2			LC	LC	LC	LC	NA ^c	LC		LC			TFA	Potentielle	Nidification	TFA
Turdidae	<i>Turdus merula</i> (Linnaeus, 1758)	Merle noir	DOII /2			LC	LC	LC	NA ^d	NA ^d	LC	LC	LC			TFA	Potentielle	Nidification	TFA
Turdidae	<i>Turdus philomelos</i> (C. L. Brehm, 1831)	Grive musicienne	DOII /2			LC	LC	LC	NA ^d	NA ^d	LC	LC	LC			TFA	Potentielle	Nidification	TFA
Turdidae	<i>Turdus viscivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Grive draine	DOII /2			LC	LC	LC	NA ^d	NA ^d	LC	LC	LC			TFA	Potentielle	Nidification	TFA

3.3 MAMMALOFAUNE

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[ECNPRE]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Muridae	<i>Apodemus flavicollis</i> (Melchior, 1834)	Mulot à collier					LC	LC	LC	LC	
Muridae	<i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758)	Mulot sylvestre					LC	LC	LC	LC	
Cricetidae	<i>Arvicola sapidus</i> (Miller, 1908)	Campagnol amphibie		Art.2			VU	VU	NT	CR	Z
Cervidae	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Chevreuril européen				EC1	LC	LC	LC	LC	
Castoridae	<i>Castor fiber</i> (Linnaeus, 1758)	Castor d'Eurasie	DHII DHIV	Art.2			LC	LC	LC	LC	Z
Muridae	<i>Clethrionomys glareolus</i> (Schreber, 1780)	Campagnol roussatre					LC	LC	LC	LC	
Soricidae	<i>Crocidura leucodon</i> (Hermann, 1780)	Crocidure leucode					LC	LC	NT	NT	Z
Soricidae	<i>Crocidura russula</i> (Hermann, 1780)	Crocidure musette					LC	LC	LC	LC	
Soricidae	<i>Crocidura russula russula</i> (Hermann, 1780)	Crocidure musette									
Cervidae	<i>Dama dama</i> (Linnaeus, 1758)	Daim européen, Daim				EC1	LC	LC	NA ^a	NA	
Gliridae	<i>Eliomys quercinus</i> (Linnaeus, 1766)	Lérot					NT	NT	LC	LC	
Erinaceidae	<i>Erinaceus europaeus</i> (Linnaeus, 1758)	Hérisson d'Europe		Art.2			LC	LC	LC	NT	C
Felidae	<i>Felis silvestris</i> (Schreber, 1775)	Chat forestier	IV	Art.2			LC		LC	NT	Z
Viverridae	<i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758)	Genette commune	V	Art.2			LC	LC		LC	Z
Gliridae	<i>Glis glis</i> (Linnaeus, 1766)	Loir gris					LC	LC	LC	LC	
Leporidae	<i>Lepus europaeus</i> (Pallas, 1778)	Lièvre d'Europe				EC1	LC	LC	LC	LC	

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[ECNPRE]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Mustelidae	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	Loutre d'Europe	II/IV	Art.2 Pm1	RCU		NT	NT	LC	CR	
Mustelidae	<i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777)	Fouine				EC1 EN1	LC	LC	LC	LC	
Mustelidae	<i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758)	Martre des pins	V			EC1	LC	LC	LC	LC	
Mustelidae	<i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)	Blaireau européen				EC1	LC	LC	LC	LC	
Muridae	<i>Micromys minutus</i> (Pallas, 1771)	Rat des moissons					LC	LC	LC	NT	Z
Cricetidae	<i>Microtus agrestis</i> (Linnaeus, 1760)	Campagnol agreste					LC	LC	LC	LC	
Cricetidae	<i>Microtus arvalis</i> (Pallas, 1778)	Campagnol des champs					LC	LC	LC	LC	
Cricetidae	<i>Microtus duodecimcostatus</i> (de Selys-Longchamps, 1839)	Campagnol provençal					LC	LC	LC	LC	
Gliridae	<i>Muscardinus avellanarius</i> (Linnaeus, 1758)	Muscardin	DHIV	Art.2			LC	LC	LC	LC	C
Mustelidae	<i>Mustela erminea</i> (Linnaeus, 1758)	Hermine				EC1	LC	LC	LC	LC	
Mustelidae	<i>Mustela nivalis</i> (Linnaeus, 1766)	Belette d'Europe				EC1 EN1	LC	LC	LC	NT	
Mustelidae	<i>Mustela putorius putorius</i> (Linnaeus, 1758)	Putois d'Europe									
Myocastoridae	<i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)	Ragondin				UE1 EC1 EE2	LC		NA ^a	NA	
Soricidae	<i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771)	Crossope aquatique		Art.2			LC	LC	LC	NT	Z
Cricetidae	<i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766)	Rat musqué				EC1 EE2	LC		NA ^a	NA	
Leporidae	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)	Lapin de garenne				EC1	EN	NT	NT	VU	
Procyonidae	<i>Procyon lotor</i> (Linnaeus, 1758)	Raton laveur				EC1 EN1	LC		NA ^a	NA	

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[ECNPRE]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Muridae	<i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769)	Rat surmulot				EE1	LC		NA ^a	LC	
Muridae	<i>Rattus rattus</i> (Linnaeus, 1758)	Rat noir					LC	LC	LC	EN	Z
Bovidae	<i>Rupicapra rupicapra</i> (Linnaeus, 1758)	Chamois					LC	LC	LC	LC	
Sciuridae	<i>Sciurus vulgaris</i> (Linnaeus, 1758)	Ecureuil roux		Art.2			LC	LC	LC	LC	C
Soricidae	<i>Sorex coronatus</i> (Millet, 1828)	Musaraigne couronnée					LC	LC	LC	LC	
Soricidae	<i>Sorex minutus</i> (Linnaeus, 1766)	Musaraigne pygmée					LC	LC	LC	LC	
Suidae	<i>Sus scrofa</i> (Linnaeus, 1758)	Sanglier				EC1 EN1	LC	LC	LC	LC	
Talpidae	<i>Talpa europaea</i> (Linnaeus, 1758)	Taupe d'Europe					LC	LC	LC	LC	
Canidae	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	Renard roux				EC1 EN1	LC	LC	LC	LC	

3.4 ENTOMOFAUNE

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[ECNPRE]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
LEPIDOPTERES											
Nymphalidae	<i>Aglais io</i> (Linnaeus, 1758)	Paon-du-jour						LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758)	Petite Tortue						LC	LC	LC	
Pieridae	<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)	Aurore						LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Apatura ilia</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Petit Mars changeant						LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Aphantopus hyperantus</i> (Linnaeus, 1758)	Tristan						LC	LC	LC	
Pieridae	<i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	Gazé						LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Araschnia levana</i> (Linnaeus, 1758)	Carte géographique						LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)	Tabac d'Espagne						LC	LC	LC	
Lycaenidae	<i>Aricia agestis</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Collier-de-corail						LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Boloria dia</i> (Linnaeus, 1767)	Petite Violette						LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Boloria euphrosyne</i> (Linnaeus, 1758)	Grand collier argenté						LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Boloria selene</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Petit Collier argenté						LC	NT	LC	
Nymphalidae	<i>Brenthis daphne</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Nacré de la Ronce						LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Brenthis ino</i> (Rottemburg, 1775)	Nacré de la Sanguisorbe						LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Brintesia circe</i> (Fabricius, 1775)	Silène						LC	LC	LC	

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[EONPRE]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRQ] RA	[Z] RA
Lycaenidae	<i>Cacyreus marshalli</i> (Butler, 1898)	Brun du Pélargonium					LC		NA	NA	
Lycaenidae	<i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758)	Thécla de la Ronce						LC	LC	LC	
Hesperiidae	<i>Carcharodus alceae</i> (Esper, 1780)	Hespérie de l'Alcée						LC	LC	LC	
Lycaenidae	<i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré des Nerpruns						LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Coenonympha arcania</i> (Linnaeus, 1760)	Céphale						LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	Procris, Fadet commun						LC	LC	LC	
Pieridae	<i>Colias alfacariensis</i> (Ribbe, 1905)	Fluoré						LC	LC	DD	
Pieridae	<i>Colias crocea</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Souci						LC	LC	LC	
Lycaenidae	<i>Cupido argiades</i> (Pallas, 1771)	Azuré du Trèfle						LC	LC	LC	
Lycaenidae	<i>Cupido minimus</i> (Fuessly, 1775)	Argus frêle						LC	LC	LC	
Lycaenidae	<i>Cyaniris semiargus</i> (Rottemburg, 1775)	Demi-Argus						LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Erebia meolans</i> (Prunner, 1798)	Moiré des Fétuques					LC	LC	LC	LC	
Hesperiidae	<i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758)	Point de Hongrie						LC	LC	LC	
Erebidae	<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	Ecaille chinée (L)	II								
Nymphalidae	<i>Fabriciana adippe</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Moyen Nacré						LC	LC	LC	
Pieridae	<i>Gonepteryx cleopatra</i> (Linnaeus, 1767)	Citron de Provence						LC	LC	LC	
Pieridae	<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	Citron						LC	LC	LC	
Papilionidae	<i>Iphiclidus podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	Flambé						LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Issoria lathonia</i> (Linnaeus, 1758)	Petit Nacré						LC	LC	LC	

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[ECNPRE]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LR]RA	[Z]RA
Nymphalidae	<i>Lasiommata maera</i> (Linnaeus, 1758)	Ariane						LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767)	Mégère, Satyre						LC	LC	LC	
Pieridae	<i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade du lotier, Piérade de la moutarde						LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Limenitis camilla</i> (Linnaeus, 1764)	Petit Sylvain						LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Limenitis populi</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Sylvain						LC	NT	LC	Z
Nymphalidae	<i>Limenitis reducta</i> (Staudinger, 1901)	Sylvain azuré						LC	LC	LC	
Lycaenidae	<i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1760)	Cuivré commun						LC	LC	LC	
Lycaenidae	<i>Lycaena tityrus</i> (Poda, 1761)	Cuivré fuligineux						LC	LC	LC	
Lycaenidae	<i>Lysandra bellargus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré bleu-céleste						LC	LC	LC	
Sphingidae	<i>Macroglossum stellatarum</i> (Linnaeus, 1758)	Moro-Sphinx (Le), Sphinx du Caille-Lait (Le)									
Nymphalidae	<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	Myrtil						LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	Demi-Deuil						LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Melitaea athalia</i> (Rottemburg, 1775)	Mélitée du Mélampyre						LC	LC		
Nymphalidae	<i>Melitaea cinxia</i> (Linnaeus, 1758)	Mélitée du Plantain						LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Melitaea didyma</i> (Esper, 1778)	Mélitée orangée						LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Melitaea nevadensis</i> (Oberthur, 1904)	Mélitée de Fruhstorfer								LC	
Nymphalidae	<i>Melitaea parthenoides</i> (Keferstein, 1851)	Mélitée des Scabieuses					LC	LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Melitaea phoebe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Mélitée des Centaurées						LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Tortue						LC	LC	LC	

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[EONPRE]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LR]RA	[Z]RA
Papilionidae	<i>Papilio machaon</i> (Linnaeus, 1758)	Machaon						LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	Tircis						LC	LC	LC	
Lycaenidae	<i>Phengaris arion</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré du Serpolet	IV	Art.2	N				LC	LC	C
Pieridae	<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade du Chou						LC	LC	LC	
Pieridae	<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade du Navet						LC	LC	LC	
Pieridae	<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade de la Rave						LC	LC	LC	
Lycaenidae	<i>Plebejus idas</i> (Linnaeus, 1761)	Azuré du Genêt						LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758)	Robert-le-diable						LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Polygonia c-album c-album</i> (Linnaeus, 1758)	Robert-le-diable						LC	LC	LC	
Lycaenidae	<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	Argus bleu, Azuré commun						LC	LC	LC	
Lycaenidae	<i>Pseudophilotes baton</i> (Bergstrasser, 1779)	Azuré du Thym					LC	LC	LC	NT	Z
Nymphalidae	<i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1771)	Amaryllis						LC	LC	LC	
Saturniidae	<i>Saturnia pyri</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Grand Paon de nuit									
Lycaenidae	<i>Scolitantides orion</i> (Pallas, 1771)	Azuré des Orpins						LC	LC	NT	Z
Hesperiidae	<i>Thymelicus acteon</i> (Rottemburg, 1775)	Hespérie du Chiendent						NT	LC	LC	
Hesperiidae	<i>Thymelicus lineola</i> (Ochsenheimer, 1808)	Hespérie du Dactyle						LC	LC	LC	
Hesperiidae	<i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761)	Hespérie de la Houque						LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	Vulcain					LC	LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)	Belle-Dame					LC	LC	LC	LC	

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[ECNPRE]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
ODONATES											
Aeshnidae	<i>Aeshna affinis</i> (Vander Linden, 1820)	Aeschne affine					LC	LC	LC	LC	Z
Aeshnidae	<i>Aeshna cyanea</i> (O.F. Muller, 1764)	Aeschne bleue					LC	LC	LC	LC	
Aeshnidae	<i>Aeshna mixta</i> (Latreille, 1805)	Aeschne mixte					LC	LC	LC	LC	Z
Aeshnidae	<i>Anax imperator</i> (Leach, 1815)	Anax empereur					LC	LC	LC	LC	
Calopterygidae	<i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1780)	Caloptéryx éclatant					LC	LC	LC	LC	
Calopterygidae	<i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)	Caloptéryx vierge					LC	LC	LC	LC	
Lestidae	<i>Chalcolestes viridis</i> (Vander Linden, 1825)	Leste vert					LC	LC	LC	LC	
Coenagrionidae	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	Agrion de Mercure	II	Art.3	R		NT	NT	LC	LC	C
Coenagrionidae	<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)	Agrion jouvencelle					LC	LC	LC	LC	
Cordulegastridae	<i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807)	Cordulégastre annelé					LC	LC	LC	LC	
Coenagrionidae	<i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840)	Agrion porte-coupe					LC	LC	LC	LC	
Coenagrionidae	<i>Erythromma lindenii</i> (Selys, 1840)	Naiade aux yeux bleus, Agrion de Vander Linden					LC	LC	LC	LC	
Coenagrionidae	<i>Erythromma viridulum</i> (Charpentier, 1840)	Naiade au corps vert					LC	LC	LC	LC	
Gomphidae	<i>Gomphus pulchellus</i> (Selys, 1840)	Gomphe joli					LC	LC	LC	LC	
Coenagrionidae	<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	Agrion élégant					LC	LC	LC	LC	
Coenagrionidae	<i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825)	Agrion nain					LC	LC	LC	NT	
Lestidae	<i>Lestes barbarus</i> (Fabricius, 1798)	Leste sauvage					LC	LC	LC	LC	Z
Libellulidae	<i>Libellula depressa</i> (Linnaeus, 1758)	Libellule déprimée					LC	LC	LC	LC	

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[ECNPRE]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LR]RA	[Z]RA
Libellulidae	<i>Libellula quadrimaculata</i> (Linnaeus, 1758)	Libellule à quatre tâches					LC	LC	LC	LC	
Gomphidae	<i>Onychogomphus forcipatus</i> (Linnaeus, 1758)	Gomphe à forceps, Gomphe à pinces					LC	LC	LC	LC	
Libellulidae	<i>Orthetrum brunneum</i> (Boyer de Fonscolombe, 1837)	Orthétrum brun					LC	LC	LC	LC	
Libellulidae	<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)	Orthétrum réticulé					LC	LC	LC	LC	
Libellulidae	<i>Orthetrum coerulescens coerulescens</i> (Fabricius, 1798)	Orthétrum bleuissant									
Platycnemididae	<i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771)	Pennipatte bleuâtre, Agrion à larges pattes					LC	LC	LC	LC	
Coenagrionidae	<i>Pyrrosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)	Petite nymphe au corps de feu					LC	LC	LC	LC	
Lestidae	<i>Sympecma fusca</i> (Vander Linden, 1820)	Leste brun					LC	LC	LC	LC	
Libellulidae	<i>Sympetrum depressiusculum</i> (Selys, 1841)	Sympétrum déprimé			R			VU	EN	NT	Z
Libellulidae	<i>Sympetrum pedemontanum</i> (O.F. Muller in Allioni, 1766)	Sympétrum du Piémont			R		LC	LC	NT	VU	Z
Libellulidae	<i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Muller, 1764)	Sympétrum sanguin					LC	LC	LC	LC	
Libellulidae	<i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)	Sympétrum fascié					LC	LC	LC	LC	
ORTHOPTERES											
Acrididae	<i>Acrotylus fischeri</i> (Azam, 1901)	Ædipode framboisine								LC	Z
Tettigoniidae	<i>Bicolorana bicolor</i> (Philippi, 1830)	Decticelle bicolore						LC		LC	Z
Acrididae	<i>Calliptamus barbarus</i> (O.G. Costa, 1836)	Caloptène ochracé						LC		LC	
Acrididae	<i>Calliptamus italicus</i> (Linnaeus, 1758)	Caloptène italien						LC		LC	
Acrididae	<i>Chorthippus albomarginatus</i> (De Geer, 1773)	Criquet marginé						LC		LC	

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[ECNPRE]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LR] RA	[Z] RA
Acrididae	<i>Chorthippus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758)	Criquet mélodieux						LC		LC	
Acrididae	<i>Chorthippus brunneus brunneus</i> (Thunberg, 1815)	Criquet duettiste					LC	LC		LC	
Acrididae	<i>Chorthippus dorsatus</i> (Zetterstedt, 1821)	Criquet verte-échine						LC		LC	
Acrididae	<i>Chorthippus mollis</i> (Charpentier, 1825)	Criquet des jachères						LC		LC	
Acrididae	<i>Chorthippus vagans</i> (Eversmann, 1848)	Criquet des Pins						LC		LC	
Acrididae	<i>Chrysochraon dispar</i> (Germar, 1834)	Criquet des clairières						LC		LC	
Tettigoniidae	<i>Conocephalus fuscus</i> (Fabricius, 1793)	Conocéphale bigarré						LC		LC	
Tettigoniidae	<i>Ephippiger diurnus</i> (Dufour, 1841)	Ephippigère des vignes					LC	LC		LC	
Acrididae	<i>Euchorthippus declivus</i> (Brisout de Barneville, 1848)	Criquet des mouillères					LC	LC		LC	
Acrididae	<i>Euchorthippus elegantulus</i> (Zeuner, 1940)	Criquet blafard					LC	LC		LC	Z
Acrididae	<i>Euchorthippus elegantulus elegantulus</i> (Zeuner, 1940)	Criquet blafard					LC	LC		LC	
Gryllidae	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i> (Latreille, 1804)	Grillon bordelais, Grillon d'été						LC		LC	
Acrididae	<i>Gomphocerippus rufus</i> (Linnaeus, 1758)	Gomphocère roux, Gomphocère, Gomphocère fauve						LC		LC	
Gryllidae	<i>Gryllus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Gresillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill						LC		LC	
Tettigoniidae	<i>Leptophyes punctatissima</i> (Bosc, 1792)	Leptophye ponctuée, Sauterelle ponctuée, Barbitiste tresponctue					LC	LC		LC	
Tettigoniidae	<i>Meconema thalassinum</i> (De Geer, 1773)	Méconème tambourinaire, Méconème varie, Sauterelle des Chênes						LC		LC	
Acrididae	<i>Mecostethus parapleurus</i> (Hagenbach, 1822)	Criquet des Roseaux, Parapleure alliee						LC		LC	

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[ECNPRE]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LR] RA	[Z] RA
Trigonidiidae	<i>Nemobius sylvestris</i> (Bosc, 1792)	Grillon des bois, Grillon forestier, Némobie forestier, Némobie forestière						LC		LC	
Acrididae	<i>Oedipoda caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	Œdipode turquoise						LC		LC	
Acrididae	<i>Omocestus haemorrhoidalis</i> (Charpentier, 1825)	Criquet rouge-queue						LC		LC	
Acrididae	<i>Omocestus rufipes</i> (Zetterstedt, 1821)	Criquet noir-ébène						LC		LC	
Acrididae	<i>Pezotettix giornae</i> (Rossi, 1794)	Criquet pansu						LC		LC	Z
Tettigoniidae	<i>Phaneroptera nana</i> (Fieber, 1853)	Phanérotère méridional						LC		LC	
Tettigoniidae	<i>Pholidoptera griseoaptera</i> (De Geer, 1773)	Decticelle cendrée, Ptérolèpe aptère						LC		LC	
Tettigoniidae	<i>Platycleis albopunctata</i> (Goeze, 1778)	Decticelle grisâtre, Dectique gris						LC		LC	
Tettigoniidae	<i>Platycleis albopunctata albopunctata</i> (Goeze, 1778)	Decticelle chagrinée									
Acrididae	<i>Pseudochorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	Criquet des pâtures, Oedipode parallèle						LC		LC	
Tettigoniidae	<i>Roeseliana roeselii</i> (Hagenbach, 1822)	Decticelle bariolée						LC		LC	
Tettigoniidae	<i>Ruspolia nitidula</i> (Scopoli, 1786)	Conocéphale gracieux, Conocéphale mandibulaire						LC		LC	
Acrididae	<i>Stauroderus scalaris</i> (Fischer von Waldheim, 1846)	Criquet jacasseur, Staurodère scalaire						LC		LC	
Acrididae	<i>Stenobothrus lineatus</i> (Panzer, 1796)	Criquet de la Palène, Stenobothre ligne, Criquet du Brachypode						LC		LC	
Acrididae	<i>Stenobothrus stigmaticus</i> (Rambur, 1838)	Sténobothre nain								NT	
Acrididae	<i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758)	Criquet ensanglanté, Œdipode ensanglantée						LC		LC	
Tettigoniidae	<i>Tessellana tessellata</i> (Charpentier, 1825)	Decticelle carroyée, Dectique marqueté						LC		LC	

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[ECNPRE]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LR]RA	[Z]RA
Tetrigidae	<i>Tetrix undulata</i> (Sowerby, 1806)	Tétrix forestier, Tétrix des clairières, Tétrix commun						LC		LC	
Tettigoniidae	<i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Sauterelle verte						LC		LC	
COLEOPTERES											
Cerambycidae	<i>Agapanthia suturalis</i> (Fabricius, 1787)	/									
Elateridae	<i>Alosterna tabacicolor</i> (De Geer, 1775)	Lepture gitane									
Cerambycidae	<i>Cerambyx cerdo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Capricorne	II / IV	2			VU	NT			
cerambycidae	<i>Chlorophorus glabromaculatus</i> (Goeze, 1777)	Clyte poilu					LC	LC		LC	
cerambycidae	<i>Clytus arietis</i> (Linnaeus, 1758)	Clyte d'Eastwood, Clyte bélié, Clyte guêpe						LC		LC	
Cerambycidae	<i>Deroplia genei</i> (Aragona, 1830)	/								LC	
Lucanidae	<i>Dorcus parallelipedus</i> (Linnaeus, 1758)	Petite biche, petite lucane						LC		LC	
Cerambycidae	<i>Exocentrus adpersus</i> (Mulsant, 1846)	/									
Cerambycidae	<i>Glaphyra umbellatarum</i> (Schreber, 1759)	/									
Cerambycidae	<i>Gracilia minuta</i> (Fabricius, 1781)	/						LC		NT	
Cerambycidae	<i>Grammoptera abdominalis</i> (Stephens, 1831)	Lepturette discrète						LC			
Cerambycidae	<i>Grammoptera ruficornis</i> (Fabricius, 1781)	Lepturette rousse									
Cerambycidae	<i>Grammoptera ustulata</i> (Schaller, 1783)	Lepturette suédoise									
Lucanidae	<i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)	Lucane cerf-volant, Cerf-volant (mâle), Biche (femelle)	II					NT		NT	C
Cerambycidae	<i>Mesosa nebulosa</i> (Fabricius, 1781)	Lamie écorce de chêne, Mésosse nébuleuse									

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[ECNPRE]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Cerambycidae	<i>P (Linnaeus, 1758)hymatodes testaceus</i>	Calleux chauffagiste						LC		LC	
Cerambycidae	<i>Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767)</i>	Lepture dentésque					VU	VU			
cerambycidae	<i>Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758)</i>	Clyte horrible, Clyte arqué						LC		LC	
Cerambycidae	<i>Poecilium alni (Linnaeus, 1767)</i>	Calleux arlequin						LC		LC	
Cerambycidae	<i>Poecilium rufipes (Fabricius, 1777)</i>	/						LC			
Cerambycidae	<i>Pogonocherus hispidulus (Piller & Mitterpacher, 1783)</i>	/									
Cerambycidae	<i>Pseudovadonia livida (Fabricius, 1777)</i>	Lepture havane									
Pyrochroidae	<i>Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus, 1758)</i>	Cardinal imposteur									
Cerambycidae	<i>Ropalopus femoratus (Linnaeus, 1758)</i>	/					LC	LC		LC	
Cerambycidae	<i>Rutpela maculata (Poda, 1761)</i>	Lepture tachetée, Lepture cycliste								LC	
Cerambycidae	<i>Semanotus laurasii (Lucas, 1852)</i>	/						LC		VU	
Cerambycidae	<i>Stenopterus rufus (Linnaeus, 1767)</i>	Calleux Cycliste, Sténoptère roux						LC		LC	
Coccinellidae	<i>Xylotrechus antilope (Schönherr, 1817)</i>	Clyte suspicieux									
Cerambycidae	<i>Xylotrechus arvicola (Olivier, 1800)</i>	Clyte apaisé						LC		LC	
Dytiscidae	<i>Yola bicarinata (Latreille, 1804)</i>	/									

4 LISTE DES ESPECES INVENTORIEES

4.1 FLORE

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Sapindaceae	<i>Acer campestre</i> (L., 1753)	Érable champêtre, Acénaie				LC	LC	LC			LC		
Sapindaceae	<i>Acer negundo</i> (L., 1753)	Érable negundo, Érable frêne, Érable Négondo				LC		NA		A4			
Sapindaceae	<i>Acer platanoides</i> (L., 1753)	Érable plane, Plane				LC	LC	LC			LC		
Sapindaceae	<i>Acer pseudoplatanus</i> (L., 1753)	Érable sycomore, Grand Érable				LC	LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i> (L., 1753)	Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus				LC	LC	LC			LC		
Rosaceae	<i>Agrimonia eupatoria</i> (L., 1753)	Aigremoine, Francormier					LC	LC			LC		
Simaroubaceae	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, 1916	Faux vernis du Japon, Ailante glanduleux, Ailante, Ailante						NA		A4			
Lamiaceae	<i>Ajuga reptans</i> (L., 1753)	Bugle rampante, Consyre moyenne						LC			LC		
Brassicaceae	<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913	Alliaire, Herbe aux aulx						LC			LC		
Amaryllidaceae	<i>Allium ursinum</i> (L., 1753)	Ail des ours, Ail à larges feuilles					LC	LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Amaryllidaceae	<i>Allium vineale</i> (L., 1753)	Ail des vignes, Oignon bâtard					LC	LC			LC		
Betulaceae	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	Aulne glutineux, Verne				LC	LC	LC	ZH		LC		
Poaceae	<i>Alopecurus myosuroides</i> (Huds., 1762)	Vulpin des champs, Queue-de-renard			C 1			LC			LC		
Asteraceae	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> (L., 1753)	Ambroise élevée, Ambroise à feuilles d'Armoise, Ambrosie annuelle						NA		A5			
Boraginaceae	<i>Anchusa arvensis</i> (L., 1753)	Buglosse des champs			C								
Ranunculaceae	<i>Anemone nemorosa</i> (L., 1753)	Anémone des bois, Anémone sylvie						LC			LC		
Poaceae	<i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski, 1934	Brome stérile					LC	LC			LC		
Poaceae	<i>Anisantha tectorum</i> (L.) Nevski, 1934	Brome des toits						LC					
Poaceae	<i>Anthoxanthum odoratum</i> (L., 1753)	Flouve odorante						LC			LC		
Apiaceae	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm. subsp. <i>sylvestris</i>												
Fabaceae	<i>Anthyllis vulneraria</i> (L., 1753)	Anthyllide vulnérable, Trèfle des sables						LC			LC		
Plantaginaceae	<i>Antirrhinum majus</i> (L., 1753)	Muflier à grandes fleurs, Gueule-de-lion						LC					
Asteraceae	<i>Arctium lappa</i> (L., 1753)	Grande bardane, Bardane commune					LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800	Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules						LC			LC		
Poaceae	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	Fromental élevé, Ray-grass français					LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Artemisia verlotiorum</i> (Lamotte, 1877)	Armoise des Frères Verlot, Armoise de Chine						NA		A4			
Asteraceae	<i>Artemisia vulgaris</i> (L., 1753)	Armoise commune, Herbe de feu					LC	LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Araceae	<i>Arum maculatum</i> (L., 1753)	Gouet tâcheté, Chandelle						LC			LC		
Amaranthaceae	<i>Atriplex patula</i> (L., 1753)	Arroche étalée						LC			LC		
Brassicaceae	<i>Aubrieta deltoidea</i> (L.) DC., 1821	Aubrietie deltoïde, Aubriétia à delta						NA					
Poaceae	<i>Avena barbata</i> (Pott ex Link, 1799)	Avoine barbue					LC	LC			LC		
Poaceae	<i>Avena fatua</i> (L., 1753)	Avoine folle, Havenon			C 1	LC	LC	LC					
Lamiaceae	<i>Ballota nigra</i> (L., 1753)	Ballote noire					LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Bellis perennis</i> (L., 1753)	Pâquerette						LC			LC		
Brassicaceae	<i>Berteroa incana</i> (L.) DC., 1821	Alysson blanc, Alysse blanche						NA			NE		
Poaceae	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812	Brachypode penné						DD			DD		
Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i> (L., 1753)	Brome mou						LC			LC		
	<i>Bromus tectorum</i> (L., 1753)										LC		
Cucurbitaceae	<i>Bryonia cretica</i> (L., 1753)	Bryone dioïque						LC			LC		
Scrophulariaceae	<i>Buddleja davidii</i> (Franch., 1887)	Buddleja du père David, Arbre à papillon, Arbre aux papillons						NA		A5			
Poaceae	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth, 1788	Calamagrostide épigéios, Roseau des bois						LC			LC		
Campanulaceae	<i>Campanula patula</i> (L., 1753)	Campanule étoilée, Campanule étalée						LC			LC		
Brassicaceae	<i>Cardamine hirsuta</i> (L., 1753)	Cardamine hérissée, Cresson de muraille						LC			LC		
Asteraceae	<i>Carduus nutans</i> (L., 1753)	Chardon penché						LC			LC		
Cyperaceae	<i>Carex divulsa</i> (Stokes, 1787)	Laïche écartée						LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Cyperaceae	<i>Carex limosa</i> L., 1753	Laïche des tourbières, Laïche des vases, Laïche des boubiers		Art. 1		LC	LC	LC	ZH		EN		Z
Cyperaceae	<i>Carex pairae</i> F.W.Schultz, 1868	Laïche de Paira						LC			LC		
Cyperaceae	<i>Carex pendula</i> (Huds., 1762)	Laïche à épis pendants, Laïche pendante						LC	ZH		LC		
Cyperaceae	<i>Carex spicata</i> (Huds., 1762)	Laïche en épis						LC			LC		
Aizoaceae	<i>Carpobrotus edulis</i> (L.) N.E.Br.	Ficoide doux, Griffe de sorcière, Figuier des Hottentots						NA		LN NI			
Poaceae	<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb., 1953	Pâturin rigide, Desmazérie rigide						LC			LC		
Asteraceae	<i>Centaurea cyanus</i> (Hill, 1762)	Bleuet			C								
Asteraceae	<i>Centaurea jacea</i> (L., 1753)	Centauree jacée, Tête de moineau, Ambrette						LC			LC		
Caprifoliaceae	<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC., 1805	Centranthe rouge, Valériane rouge						LC					
Caryophyllaceae	<i>Cerastium glomeratum</i> (Thuill., 1799)	Céraiste aggloméré						LC			LC		
	<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834												
Papaveraceae	<i>Chelidonium majus</i> (L., 1753)	Grande chélidoine, Herbe à la verrue, Éclaire					LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Chondrilla juncea</i> L., 1753	Chondrille à tige de jonc, Chondrille effilée						LC			LC		
Asteraceae	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des champs, Chardon des champs						LC			LC		
Ranunculaceae	<i>Clematis vitalba</i> (L., 1753)	Clématite des haies, Herbe aux gueux						LC			LC		
Lamiaceae	<i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze, 1891	Calament glanduleux						LC			LC		
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> (L., 1753)	Liseron des champs, Vrillée						LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Cornaceae	<i>Cornus sanguinea</i> (L., 1753)	Cornouiller sanguin, Sanguine						LC			LC		
Betulaceae	<i>Corylus avellana</i> (L., 1753)	Noisetier, Avelinier				LC	LC	LC			LC		
Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i> (Jacq., 1775)	Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai				LC	LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Crepis biennis</i> (L., 1753)	Crépide bisannuelle						LC			LC		
Poaceae	<i>Cynosurus cristatus</i> (L., 1753)	Crételle						LC			LC		
Fabaceae	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	Genêt à balai, Juniesse						LC			LC		
Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i> (L., 1753)	Dactyle aggloméré, Pied-de-poule						LC			LC		
Apiaceae	<i>Daucus carota</i> (L., 1753)	Carotte sauvage, Daucus carotte				LC	LC	LC			LC		
Caryophyllaceae	<i>Dianthus armeria</i> (L., 1753)	Oeillet velu, Armoirie, Oeillet à bouquet						LC			LC	Art.1 & 2 (38, 26)	
Caprifoliaceae	<i>Dipsacus fullonum</i> (L., 1753)	Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage						LC			LC		
Dryopteridaceae	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	Fougère mâle					LC	LC			LC		
Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i> (L., 1753)	Vipérine commune, Vipérine vulgaire						LC			LC		
Elaeagnaceae	<i>Elaeagnus macrophylla</i> Thunb., 1784												
Poaceae	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934	Chiendent commun, Chiendent rampant						LC			LC		
Equisetaceae	<i>Equisetum arvense</i> (L., 1753)	Prêle des champs, Queue-de-renard				LC	LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804	Vergerette annuelle, Érigéron annuel						NA		A4			
Asteraceae	<i>Erigeron canadensis</i> (L., 1753)	Conyze du Canada						NA		A4			

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Asteraceae	<i>Erigeron sumatrensis</i> Retz.	Vergerette de Barcelone						NA		A4			
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789	Érodium à feuilles de cigue, Bec de grue, Cicutaire						LC			LC		
Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Pavot de Californie, Eschscholzie de Californie						NA		E2			
Celastraceae	<i>Euonymus europaeus</i> (L., 1753)	Bonnet-d'évêque					LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Eupatorium cannabinum</i> (L., 1753)	Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau						LC	ZH		LC		
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia amygdaloides</i> (L., 1753)	Euphorbe des bois, Herbe à la faux						LC			LC		
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia cyparissias</i> (L., 1753)	Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès						LC			LC		
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia lathyris</i> (L., 1753)	Euphorbe épurge, Euphorbe des jardins						LC					
Poaceae	<i>Festuca pratensis</i> Huds.										LC		
Poaceae	<i>Festuca rubra</i> (L., 1753)	Fétuque rouge					LC	LC			LC		
Ranunculaceae	<i>Ficaria verna</i> (Huds., 1762)	Ficaire à bulbilles					LC	LC			LC		
Moraceae	<i>Ficus carica</i> (L., 1753)	Figuier commun, Figuier de Carie, Caprifiguier, Figuier				LC	LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Filago arvensis</i> (L., 1753)	Immortelle des champs						LC			LC		
Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i> (Mill., 1768)	Fenouil commun					LC	LC			LC		
Oleaceae	<i>Forsythia</i> sp.												
Rosaceae	<i>Fragaria vesca</i> (L., 1753)	Fraisier sauvage, Fraisier des bois					LC	LC			LC		
Oleaceae	<i>Fraxinus excelsior</i> (L., 1753)	Frêne élevé, Frêne commun				NT	NT	LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Papaveraceae	<i>Fumaria bastardii</i> (Boreau, 1847)	Fumeterre de Bastard						LC			DD		
Papaveraceae	<i>Fumaria officinalis</i> (L., 1753)	Fumeterre officinale, Herbe à la veuve					LC	LC			LC		
Rubiaceae	<i>Galium album</i> (Mill., 1768)	Gaillet dressé						LC					
Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> (L., 1753)	Gaillet gratteron, Herbe collante					LC	LC			LC		
Rubiaceae	<i>Galium verum</i> (L., 1753)	Gaillet jaune, Caille-lait jaune					LC	LC			LC		
Geraniaceae	<i>Geranium dissectum</i> (L., 1755)	Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées						LC			LC		
Geraniaceae	<i>Geranium molle</i> (L., 1753)	Géranium à feuilles molles						LC			LC		
Geraniaceae	<i>Geranium pyrenaicum</i> (Burm.f., 1759)	Géranium des Pyrénées						LC			LC		
Geraniaceae	<i>Geranium robertianum</i> (L., 1753)	Herbe à Robert						LC			LC		
Geraniaceae	<i>Geranium rotundifolium</i> (L., 1753)	Géranium à feuilles rondes, Mauvette						LC			LC		
Rosaceae	<i>Geum urbanum</i> (L., 1753)	Benoîte commune, Herbe de saint Benoît					LC	LC			LC		
Lamiaceae	<i>Glechoma hederacea</i> (L., 1753)	Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre					LC	LC			LC		
Araliaceae	<i>Hedera helix</i> (L., 1753)	Lierre grimpant, Herbe de saint Jean					LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Helianthus tuberosus</i> (L., 1753)	Topinambour, Patate de Virginie				LC		NA		A4			
Apiaceae	<i>Heracleum sphondylium</i> (L., 1753)	Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce						LC			LC		
Poaceae	<i>Holcus lanatus</i> (L., 1753)	Houlque laineuse, Blanchard						LC			LC		
Poaceae	<i>Holcus mollis</i> (L., 1759)	Houlque molle, Avoine molle						LC			LC		
Poaceae	<i>Hordeum murinum</i> (L., 1753)	Orge sauvage, Orge Queue-de-rat				LC	LC	LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Cannabaceae	<i>Humulus lupulus</i> (L., 1753)	Houblon grimpant					LC	LC	ZH		LC		
Hypericaceae	<i>Hypericum calycinum</i> (L., 1767)	Millepertuis calycinal						NA					
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i> (L., 1753)	Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean					LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i> (L., 1753)	Porcelle enracinée						LC			LC		
Aquifoliaceae	<i>Ilex aquifolium</i> (L., 1753)	Houx				LC	LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Jacobaea vulgaris</i> (Gaertn., 1791)	Herbe de saint Jacques						LC			LC		
Juglandaceae	<i>Juglans regia</i> (L., 1753)	Noyer commun, Calottier				LC	LC	NA					
Caprifoliaceae	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828	Knautie des champs, Oreille-d'âne						LC			LC		
Fabaceae	<i>Laburnum anagyroides</i> (Medik., 1787)	Faux-ébénier, Cytise, Aubour				LC	LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i> (L., 1756)	Laitue scariote, Escarole					LC	LC			LC		
Lamiaceae	<i>Lamium album</i> (L., 1753)	Lamier blanc, Ortie blanche, Ortie morte					LC	LC			LC		
Lamiaceae	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759	Lamier jaune, Lamier Galéobdolon						LC			LC		
Lamiaceae	<i>Lamium purpureum</i> (L., 1753)	Lamier pourpre, Ortie rouge						LC			LC		
Asteraceae	<i>Lapsana communis</i> (L., 1753)	Lampsane commune, Graceline						LC			LC		
Fabaceae	<i>Lathyrus latifolius</i> (L., 1753)	Gesse à larges feuilles, Pois vivace				LC	LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Lathyrus pratensis</i> (L., 1753)	Gesse des prés						LC			LC		
Asteraceae	<i>Leontodon hispidus</i> (L., 1753)	Liondent hispide						LC			LC		
Asteraceae	<i>Leucanthemum vulgare</i> (Lam., 1779)	Marguerite commune, Leucanthème commun						DD			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Oleaceae	<i>Ligustrum vulgare</i> (L., 1753)	Troëne, Raisin de chien						LC			LC		
Plantaginaceae	<i>Linaria repens</i> (L.) Mill, var repens 1768	Linaire rampante											
Plantaginaceae	<i>Linaria vulgaris</i> (Mill., 1768)	Linaire commune						LC			LC		
Poaceae	<i>Lolium perenne</i> (L., 1753)	Ivraie vivace					LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Lotus angustissimus</i> (L., 1753)	Lotier grêle, Lotier à gousses très étroites						LC			LC		
Fabaceae	<i>Lotus corniculatus</i> (L., 1753)	Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée					LC	LC			LC		
Juncaceae	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805	Luzule champêtre				LC		LC			LC		
Lythraceae	<i>Lythrum salicaria</i> (L., 1753)	Salicaire commune, Salicaire pourpre				LC	LC	LC	ZH		LC		
Rosaceae	<i>Malus domestica</i> (Suckow) Borkh., 1803	Pommier cultivé											
Malvaceae	<i>Malva sylvestris</i> (L., 1753)	Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande mauve					LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Matricaria chamomilla</i> (L., 1753)	Matricaire Camomille					LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Medicago lupulina</i> (L., 1753)	Luzerne lupuline, Minette					LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Medicago sativa</i> (L., 1753)	Luzerne cultivée				LC	LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Melilotus albus</i> (Medik., 1787)	Méililot blanc					LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam., 1779	Méililot officinal, Méililot jaune					LC	LC			LC		
Lamiaceae	<i>Mentha suaveolens</i> (Ehrh., 1792)	Menthe à feuilles rondes				LC		LC	ZH		LC		
Euphorbiaceae	<i>Mercurialis annua</i> (L., 1753)	Mercuriale annuelle, Vignette						LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Moraceae	<i>Morus alba</i> (L., 1753)	Mûrier blanc, Mûrier blanc, Mûrier noir						NA		LG E2			
Asparagaceae	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768	Muscari à toupet, Muscari chevelu						LC			LC		
Boraginaceae	<i>Myosotis discolor</i> Pers., 1797	Myosotis bicolore, Myosotis changeant						LC			LC		
Boraginaceae	<i>Myosotis ramosissima</i> (Rochel, 1814)	Myosotis rameux						LC			LC		
Amaryllidaceae	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> (L., 1753)	Jonquille des bois						LC			LC	P26 /38	
Brassicaceae	<i>Nasturtium microphyllum</i> (Boenn.) Rchb., 1832	Cresson à petites feuilles					LC	DD	ZH		DD		
Onagraceae	<i>Oenothera biennis</i> (L., 1753)	Onagre bisannuelle						NA		LG NI E2			
Oxalidaceae	<i>Oxalis articulata</i> (Savigny, 1798)	Oxalis articulé						NA		E2			
Papaveraceae	<i>Papaver rhoeas</i> (L., 1753)	Coquelicot			C		LC	LC			LC		
Vitaceae	<i>Parthenocissus inserta</i> (A.Kern.) Fritsch, 1922	Vigne-vierge commune						NA		A4			
Vitaceae	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch., 1887	Vigne vierge à cinq feuilles, Vigne-vierge						NA					
Apiaceae	<i>Pastinaca sativa</i> (L., 1753)	Panais cultivé, Pastinacier						LC			LC		
Polygonaceae	<i>Persicaria maculosa</i> (Gray, 1821)	Renouée Persicaire				LC	LC	LC			LC		
Caryophyllaceae	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964	Oeillet prolifère, Petrorhagie prolifère						LC			LC		
Pinaceae	<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst., (1881)	Épicéa commun, Sérente				LC	LC	LC			LC		
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> (L., 1753)	Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures					LC	LC			LC		
Platanaceae	<i>Platanus x hispanica</i> (Mill. ex Münchh., 1770)	Platane d'Espagne								E2			

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Poaceae	<i>Poa annua</i> (L., 1753)	Pâturin annuel				LC		LC			LC		
Poaceae	<i>Poa bulbosa</i> (L., 1753)	Pâturin bulbeux						LC			LC		
Poaceae	<i>Poa nemoralis</i> (L., 1753)	Pâturin des bois, Pâturin des forêts						LC			LC		
Poaceae	<i>Poa pratensis</i> (L., 1753)	Pâturin des prés						LC			LC		
Poaceae	<i>Poa trivialis</i> (L., 1753)	Pâturin commun, Gazon d'Angleterre						LC			LC		
Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i> (L., 1753)	Renouée des oiseaux, Renouée Trainasse					LC	LC			LC		
Salicaceae	<i>Populus balsamifera</i> L.	Peuplier Baumier						NA					
Salicaceae	<i>Populus nigra</i> (L., 1753)	Peuplier commun noir, Peuplier noir				DD	DD	LC	ZH		LC		
Rosaceae	<i>Potentilla argentea</i> (L., 1753)	Potentille argentée						DD			LC		
Rosaceae	<i>Potentilla recta</i> (L., 1753)	Potentille dressée, Potentille droite						LC			LC		
Rosaceae	<i>Potentilla reptans</i> (L., 1753)	Potentille rampante, Quintefeuille						LC			LC		
Rosaceae	<i>Poterium sanguisorba</i> (L., 1753)	Pimprenelle à fruits réticulés						LC			LC		
Primulaceae	<i>Primula veris</i> (L., 1753)	Coucou, Primevère officinale, Brérelle					LC	LC			LC		
Primulaceae	<i>Primula vulgaris</i> (Huds., 1762)	Primevère acaule						LC			LC		
Rosaceae	<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	Merisier vrai, Cerisier des bois				LC	LC	LC			LC		
Rosaceae	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., 1784	Prunier myrobolan, Myrobolan					DD	NA					
Rosaceae	<i>Prunus domestica</i> (L., 1753)	Prunier domestique, Prunier				DD	DD	NA					
Rosaceae	<i>Prunus laurocerasus</i> (L., 1753)	Laurier-cerise, Laurier-palme				LC	LC	NA		E2			

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Rosaceae	<i>Prunus padus</i> (L., 1753)	Cerisier à grappes, Putiet, Merisier à grappes, Putier				LC	LC	LC	ZH		LC		
Rosaceae	<i>Prunus spinosa</i> (L., 1753)	Épine noire, Prunellier, Pelossier				LC	LC	LC			LC		
Rosaceae	<i>Pyracantha</i> sp												
Rosaceae	<i>Pyrus cordata</i> Desv., 1818	Poirier à feuilles en cœur, Poirasse					DD	LC					
Fagaceae	<i>Quercus robur</i> (L., 1753)	Chêne pédonculé, Gravelin				LC	LC	LC			LC		
Ranunculaceae	<i>Ranunculus bulbosus</i> (L., 1753)	Renoncule bulbeuse						LC			LC		
Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i> (L., 1753)	Ravenelle, Radis sauvage					LC	LC			LC		
Resedaceae	<i>Reseda alba</i> L.	Réséda blanc						LC					
Resedaceae	<i>Reseda lutea</i> (L., 1753)	Réséda jaune, Réséda bâtard						LC			LC		
Polygonaceae	<i>Reynoutria japonica</i> (Houtt., 1777)	Renouée du Japon						NA		A5 LN NI			
Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i> (L., 1753)	Robinier faux-acacia, Carouge				LC		NA		A5			
Rosaceae	<i>Rubus caesius</i> (L., 1753)	Rosier bleue, Ronce à fruits bleus, Ronce bleue					LC	LC	ZH		LC		
Rosaceae	<i>Rubus fruticosus</i> (L., 1753)	Ronce ligneuse, Ronce de Bertram, Ronce commune									DD		
Polygonaceae	<i>Rumex acetosa</i> (L., 1753)	Oseille des prés, Rumex oseille						LC			LC		
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> (L., 1753)	Petite oseille, Oseille des brebis					LC	LC			LC		
Polygonaceae	<i>Rumex conglomeratus</i> (Murray, 1770)	Patience agglomérée, Oseille agglomérée						LC	ZH		LC		
Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i> (L., 1753)	Patience crépue, Oseille crépue					LC	LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Salicaceae	<i>Salix alba</i> (L., 1753)	Saule blanc, Saule commun				LC	LC	LC	ZH		LC		
Salicaceae	<i>Salix aurita</i> (L., 1753)	Saule à oreillettes, Petit marsault						LC	ZH		LC		
Salicaceae	<i>Salix eleagnos</i> (Scop., 1772)	Saule drapé					LC	LC			LC		
Lamiaceae	<i>Salvia pratensis</i> (L., 1753)	Sauge des prés, Sauge commune						LC			LC		
Adoxaceae	<i>Sambucus nigra</i> (L., 1753)	Sureau noir, Sampéchier						LC			LC		
Poaceae	<i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	Fétuque des prés						LC					
Cyperaceae	<i>Scirpus sylvaticus</i> (L., 1753)	Scirpe des bois, Scirpe des forêts				LC	LC	LC	ZH		LC		
Scrophulariaceae	<i>Scrophularia nodosa</i> (L., 1753)	Scrophulaire noueuse					LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Senecio inaequidens</i> (DC., 1838)	Séneçon sud-africain						NA		A4			
Asteraceae	<i>Senecio vulgaris</i> (L., 1753)	Séneçon commun						LC			LC		
Caryophyllaceae	<i>Silene latifolia</i> (Poir., 1789)	Compagnon blanc, Silène à feuilles larges						LC			LC		
Caryophyllaceae	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869	Silène enflé, Tapotte				LC		LC			LC		
Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop., 1772	Herbe aux chantres, Sisymbre officinal					LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Sonchus oleraceus</i> (L., 1753)	Laiteron potager, Laiteron lisse						LC			LC		
Rosaceae	<i>Spiraea hypericifolia</i> (L., 1753)	Spirée à feuilles de millepertuis						LC					
Lamiaceae	<i>Stachys sylvatica</i> (L., 1753)	Épiaire des bois, Ortie à crapauds						LC			LC		
Caryophyllaceae	<i>Stellaria alsine</i> (Grimm, 1767)	Stellaire des sources						LC	ZH		LC		
Caryophyllaceae	<i>Stellaria graminea</i> (L., 1753)	Stellaire graminée						LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Asteraceae	<i>Tanacetum vulgare</i> (L., 1753)	Tanaisie commune, Sent-bon						LC			LC		
Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> (F.H.Wigg., 1780)	Pissenlit					LC	LC					
Lamiaceae	<i>Thymus pulegioides</i> (L., 1753)	Thym commun, Thym faux Pouliot						LC			LC		
Lamiaceae	<i>Thymus serpyllum</i> L., 1753	Serpolet à feuilles étroites, Thym Serpolet					LC	DD					
Malvaceae	<i>Tilia platyphyllos</i> (Scop., 1771)	Tilleul à grandes feuilles				LC	LC	LC			LC		
Apiaceae	<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link, 1821	Torilis des champs, Torilide des champs						LC			LC		
Asteraceae	<i>Tragopogon pratensis</i> (L., 1753)	Salsifis des prés						LC			LC		
Fabaceae	<i>Trifolium angustifolium</i> L., 1753	Trèfle à folioles étroites, Queue-de-renard				LC	LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Trifolium dubium</i> (Sibth., 1794)	Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune						LC			LC		
Fabaceae	<i>Trifolium incarnatum</i> (L., 1753)	Trèfle incarnat, Farouch, Farouche				LC	LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Trifolium pratense</i> (L., 1753)	Trèfle des prés, Trèfle violet				LC	LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip, 1844	Matricaire inodore						LC			LC		
Poaceae	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv, 1812	Trisetum commune, Avoine dorée						LC			LC		
Brassicaceae	<i>Turritis glabra</i> (L., 1753)	Arabette glabre, Tourelle						LC			LC		
Ulmaceae	<i>Ulmus minor</i> (Mill., 1768)	Petit orme, Orme cilié, Orme mineur, Orme champêtre, Ormeau				DD	DD	LC			LC		
Urticaceae	<i>Urtica dioica</i> (L., 1753)	Ortie dioïque, Grande ortie				LC	LC	LC			LC		
Caprifoliaceae	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr, 1821	Mache doucette, Mache						LC			LC		
Scrophulariaceae	<i>Verbascum nigrum</i> L., 1753	Molène noire, Cierge maudit						LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Scrophulariaceae	<i>Verbascum pulverulentum</i> (Vill., 1779)	Molène pulvérulente						LC			LC		
Verbenaceae	<i>Verbena officinalis</i> (L., 1753)	Verveine officinale, Verveine sauvage					LC	LC			LC		
Plantaginaceae	<i>Veronica arvensis</i> (L., 1753)	Véronique des champs, Velvete sauvage						LC			LC		
Plantaginaceae	<i>Veronica chamaedrys</i> (L., 1753)	Véronique petit chêne, Fausse Germandrée						LC			LC		
Plantaginaceae	<i>Veronica persica</i> (Poir., 1808)	Véronique de Perse						NA		1			
Fabaceae	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1821	Vesce hérissée, Ers velu									LC		
Fabaceae	<i>Vicia sativa</i> (L., 1753)	Vesce cultivée, Poisette				EN	LC	NA		1	LC		
Fabaceae	<i>Vicia sepium</i> (L., 1753)	Vesce des haies				LC	LC	LC			LC		
Apocynaceae	<i>Vinca major</i> (L., 1753)	Grande pervenche						LC		E2			
Violaceae	<i>Viola arvensis</i> (Murray, 1770)	Pensée des champs			C 1		LC	LC			LC		
Violaceae	<i>Viola canina</i> (L., 1753)	Violette des chiens					LC	LC			LC		
Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i> (L., 1753)	Vigne cultivée				LC	LC	LC			DD		
Poaceae	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821	Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux Brome						LC					

5 MESURES PRECONISEES

5.1 ADAPTATION DE LA PERIODE DES TRAVAUX SUR L'ANNEE

TR01 Adaptation de la période des travaux sur l'année	
Equivalence CEREMA	E4.1.a - Adaptation de la période des travaux sur l'année

Période de réalisation	Fréquence et durée	Phase de réalisation
-	Durée des travaux	Travaux

Intérêts et objectifs

Limiter les perturbations en période de reproduction ainsi que le risque de destruction d'un maximum d'individus d'espèces protégées en adaptant les périodes de travaux à leurs exigences écologiques.

Éviter la destruction des individus ainsi que la destruction ou la dégradation des habitats d'espèces à la période où ils assurent une fonction décisive dans l'accomplissement de leur cycle biologique.

Milieux, espèces et/ou cortèges cibles

Toutes les espèces faunistiques

Localisation

Ensemble de la zone d'emprise du projet.

Modalités techniques

La faune et la flore sont plus sensibles à certaines époques de l'année. La période la plus critique correspond à celle de la reproduction.

Un phasage des travaux est choisi, en prenant en compte les éléments suivants : le type de travaux, la durée ainsi que la période la plus optimale.

De mars à août, on peut considérer que la biodiversité présente une sensibilité particulière vis-à-vis d'éventuels travaux liés à la réalisation du projet (débroussaillage, abattage, fauche ...). Les travaux sont effectués par secteur et par type d'intervention en fonction du cycle biologique des espèces.

Les travaux de coupe, défrichement et débroussaillage des strates arbustives et arborescentes sont réalisés en dehors de la période la plus critique pour l'avifaune. Les oiseaux nichent de mars à août inclus. Les travaux sont effectués en dehors de cette période pour éviter :

- ▶ La destruction directe d'individus adultes ;
- ▶ Le dérangement, induisant un risque d'abandon des nids ;
- ▶ La destruction directe des jeunes oisillons qui ne sont pas mobiles.

Le tableau suivant indique les périodes les plus favorables aux travaux au regard des exigences écologiques des espèces qui fréquentent actuellement les milieux situés au niveau de la future emprise du projet.

Tableau 1. Tableau de synthèse représentant les périodes adéquates d'intervention.
Source : Verdi.

Thématique	Travaux	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Oiseaux nicheurs	Coupe, débroussaillage												
Mammifères	Fauche, débroussaillage												
Chiroptères	Coupe												
Reptiles	Fauchage, débroussaillage, défrichement												

	Période de moindre sensibilité pour le groupe concerné
	Période de sensibilité moyenne pour le groupe concerné
	Période de forte sensibilité pour le groupe concerné

TR01 Adaptation de la période des travaux sur l'année
Pour les oiseaux nicheurs : Les travaux de défrichements/déboisements des strates arborées, arbustives et buissonnantes seront proscrits pendant la période principale de nidification des oiseaux, qui s'étale entre le 15 mars et le 15 août. Il s'agit d'empêcher la destruction de nids occupés et d'individus (jeunes au nid et œufs), et d'éviter les dérangements susceptibles d'empêcher ou de perturber la nidification des espèces (abandon de couvées, etc.). Pour les reptiles : Il est nécessaire d'éviter les travaux de destruction des milieux (défrichements/déboisements) pendant la phase d'hivernage qui s'étale entre le 15 novembre et le 1er mars. En dehors de ces périodes, leur capacité de fuite devrait limiter les destructions d'individus. Pour les mammifères terrestres : Il est nécessaire d'éviter les travaux de destruction des milieux (défrichements/déboisements) pendant la phase d'hibernation du Hérisson qui s'étale entre le 15 novembre et le 1er avril. En dehors de ces périodes, la capacité de fuite de l'espèce devrait limiter les destructions d'individus. Pour les chiroptères : Il est nécessaire d'éviter les travaux de destruction des milieux (défrichements/déboisements) pendant la phase d'hibernation qui s'étale entre le 1er novembre et le 15 mars et pendant la phase de reproduction qui s'étale entre le 1er mai et le 1er septembre. Il s'agit d'empêcher la destruction des individus pendant les phases critiques de leur cycle de vie. Synthèse : D'une manière générale, les mois de septembre-octobre constituent la période la plus en adéquation avec les exigences écologiques du maximum d'espèces ou groupes d'espèces pour la réalisation de la première phase de déboisement/défrichement. En effet, à cette période, les oiseaux, les mammifères, les amphibiens et les reptiles ont terminé leur reproduction et sont suffisamment actifs pour fuir en cas de dérangement. Recommandation : il sera préférable dans la mesure du possible que les boisements utilisés comme gîte potentiel pour les chiroptères seront prioritairement défrichés avant l'hiver avant début novembre. Le reste des emprises pourra être déboisé entre septembre et janvier. Le maître d'ouvrage intégrera ces contraintes dans la planification du chantier. Le reste des travaux est possible de novembre à février. Une fois l'emprise du projet mise à nue, il est nécessaire de maintenir le milieu défavorable aux espèces pour éviter que celles-ci ne viennent la fréquenter. Dans l'hypothèse où le planning ne pourrait pas être respecté, l'emprise des travaux sera « stérilisée » grâce à un décapage préalable de la terre végétale en période propice, entre mi-août et octobre.
Moyens humains et matériels
Entrepreneurs du paysage Débroussailleuse, Tronçonneuse, Tracteurs et remorques, Tractopelle
Indicateurs de suivis
Vérification du respect des prescriptions Tableau de suivi des périodes de travaux ou d'exploitation sur l'année par secteur avec cartographie

5.2 GESTION DE L'ECLAIRAGE

TR02 Gestion de l'éclairage		
Equivalence CEREMA	E4.1 Evitement temporel en phase travaux	
Période de réalisation	Fréquence et durée	Phase de réalisation
Dès le début des travaux	Durée des travaux	Travaux/Exploitation
Intérêts et objectifs		
Eviter les éclairages de nuit pour ne pas perturber les cycles biologiques des espèces		
Milieux, espèces et/ou cortèges cibles		
Oiseaux, chiroptères et mammifères terrestres		
Localisation		
Ensemble de la zone d'emprise du projet		
Modalités techniques		
D'une manière générale, cette mesure s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le gaspillage énergétique et la conservation des espèces sensibles à la pollution lumineuse. Les éclairages publics sont généralement équipés d'ampoules à vapeur de mercure qui émettent beaucoup de rayons ultraviolets. Ces rayons ont la propriété d'attirer les insectes (Lépidoptères nocturnes notamment) et affectent les cycles biologiques de nombreuses espèces (animales, mais aussi végétales). Du fait de l'intolérance à la lumière de certains chiroptères et de certains insectes, le développement des éclairages nocturnes (publics et privés) pourrait ainsi être responsable d'une modification de la structure des peuplements de chiroptères et d'insectes. Seul un éclairage sur des phases exceptionnelles de chantiers à durée limitée (construction d'ouvrages d'art exceptionnel ou ouvrages sous circulation) est conseillé. En ce sens, les dispositions suivantes seront prises afin de réduire cet impact temporaire de l'éclairage sur les chiroptères et l'avifaune : ▶ neutraliser les projecteurs éclairant au-delà des zones de chantiers concernées; ▶ utiliser la bonne quantité de lumière (ajuster la puissance des lampes et la valeur de l'éclairement en fonction des réels besoins) ; ▶ utiliser des lampes peu polluantes : préférer à toutes autres, les lampes au sodium basse pression (quasiment monochromatiques). Eviter l'usage de lampes à vapeur de sodium haute pression ou à vapeur de mercure haute pression ; ▶ éclairer du haut vers le bas et non pas du bas vers le haut. En phase d'exploitation, les éclairages devront être réduits au minimum et ne pas être dirigés vers la ripisylve afin de limiter la perturbation des chiroptères. Une extinction des éclairages devra être effective entre minuit et 4h du matin, comme sur la majorité de la métropole de Saint-Etienne. Si possible, elle pourra être élargie de 23h à 6h du matin. Exemples d'éclairage directionnel :		
Trois grandes catégories d'éclairage © 2002 The University of Texas McDonald Observatory Bon • éclairage le plus efficace • dirige la lumière là où c'est nécessaire • l'ampoule est masquée • réduit l'éblouissement • limite l'intrusion de la lumière vers les propriétés voisines • aide à préserver le ciel nocturne Mauvais • gaspille l'énergie et renvoie la lumière vers le ciel • provoque l'éblouissement • l'ampoule est visible • gêne le voisinage Très mauvais • gaspille l'énergie et renvoie la lumière vers le ciel • provoque l'éblouissement • gêne le voisinage et en plus... • mauvaise efficacité de l'éclairage • gaspillage très important Source FRAPNA, 2010		
Moyens humains et matériels		
Entrepreneurs du bâtiment		
Tri flash		
Indicateurs de suivis		
Vérification du respect des prescriptions (dispositifs présents et conformes)		

5.3 VERIFICATION DES ARBRES AVANT ABATTAGE

TR03 Vérification des arbres avant abattage	
Equivalence CEREMA	R2.1k - Dispositif de limitation des nuisances envers la faune

Période de réalisation	Fréquence de réalisation	Phase de réalisation
En amont de l'abattage, si possible pendant l'hiver	Une seule fois	Travaux
Intérêts et objectifs		
Eviter la destruction de chiroptères et des insectes saproxylophages		
Milieux, espèces et/ou cortèges cibles		
Chiroptères, insectes saproxylophages		
Localisation		
Tous les arbres sur l'ensemble de la zone d'emprise du projet sont concernés		
Modalités techniques		

L'emprise du chantier, du projet, et le passage des engins pourrait nécessiter l'abattage d'arbres.




Illustration 1. Protocole d'expertise des arbres présentant des cavités.

Ainsi, il sera vérifié l'absence de cavités susceptibles d'abriter des chiroptères. Les gîtes arboricoles peuvent être utilisés à différentes périodes de l'année par les chiroptères. En été, il peut s'agir de colonies de mises-bas ou des individus isolés. En hiver, certaines espèces peuvent y hiberner. Les cavités sont plus visibles l'hiver, cette période sera donc favorable pour la détection de gîtes arboricoles.

En cas d'absence absolue certaine d'individus dans l'arbre, les gîtes sont condamnés (fermeture, remplissage), ou détruits (retirer les écorces etc). Le colmatage peut être effectué au plus tôt, une heure après le dernier envol. Pour le colmatage, du papier journal mouillé en fibres végétales et sans encre peut être utilisé, ou des gaines d'isolation thermique de tuyaux de chauffage. Toutefois des insectes peuvent encore utiliser cet habitat malgré la présence de papier ; ainsi il est nécessaire de ne pas combler les cavités de manière trop dense. L'abattage de l'arbre (ou l'élagage de la branche) peut ensuite être réalisé.


En cas de doute ou si l'inspection ne permet pas de voir l'ensemble de la cavité, les gîtes sont équipés de dispositifs anti-retour (permettent aux individus de sortir mais pas de rentrer).

L'abattage des arbres concernés, préalablement marqués par l'écologue de chantier, se fera de manière douce : soit en sanglant l'arbre à la cime et en son pied à un engin de travaux qui pourra ralentir la chute de l'arbre et le descendre au sol en douceur, soit en coupant les branches au fur et à mesure puis faire tomber le tronc comme dit précédemment. Les arbres devront ensuite être laissés au sol pendant une durée de 48h afin de permettre aux individus présents à l'intérieur d'en partir. L'abattage doit être réalisé entre septembre et octobre, c'est-à-dire en dehors de la période de reproduction du Lucane cerf-volant et de la mise bas des chiroptères et hors de la période d'hibernation des chiroptères.

Les arbres favorables aux insectes saproxyliques, ou déjà colonisés, devront être identifiés par marquage. Les grumes et branches de ces arbres devront être déposées au soleil en bordure de haie ou de lisières, à proximité des emprises. Ces grumes favorables ne devront pas toucher le sol, et seront

TR03 Vérification des arbres avant abattage
posées perpendiculairement sur deux autres grumes non favorables. Elles seront conservées ainsi jusqu'au mois de juillet de l'année suivant l'abattage.
Moyens humains et matériels
Chiroptérologue agréé grimpeur, écologue
Indicateurs de suivis
Vérification du respect des prescriptions (dispositifs présents et conformes)

5.4 VERIFICATION DES BATIMENTS AVANT DEMOLITION

TR04 Vérification des bâtiments avant démolition		
Equivalence CEREMA	R2.1k - Dispositif de limitation des nuisances envers la faune	
Période de réalisation	Fréquence de réalisation	Phase de réalisation
En amont de la destruction, si possible pendant l'hiver	Une seule fois	Travaux
Intérêts et objectifs		
Eviter la destruction de chiroptères et d'oiseaux		
Milieux, espèces et/ou cortèges cibles		
Chiroptères, insectes saproxylophages		
Localisation		
Tous les bâtiments sur l'ensemble de la zone d'emprise du projet sont concernés		
Modalités techniques		
L'emprise du chantier, du projet, et le passage des engins pourrait nécessiter la démolition de bâtiments. Ainsi, il sera vérifié l'absence de trous, fissures ou rebords susceptibles d'abriter des chiroptères ou des oiseaux dans les bâtiments.  <pre>graph LR A[Diagnostic simple Recherche visuelle des indices de présence, recherche d'endroits pouvant accueillir des individus (trous, fissures, nids...)] --> B[Absence des éléments listés (individus, fissures, trous...)] A --> C[Présence d'un ou plusieurs éléments] B --> D[Déroulement normal du chantier] C --> E[Réalisation d'une expertise complémentaire du bâtiment par des experts faunistes] E --> F[Absence avérée d'espèces protégées] E --> G[En cas de présence avérée d'individus d'espèces protégées] F --> H[Déroulement normal du chantier] G --> I[Abandon du projet car trop d'enjeux] G --> J[Poursuite du projet] J --> K[Échange avec la DREAL Réalisation des dossiers réglementaires (formulaires CERFA, dossier de demande de dérogation...)]</pre>		
Illustration 2. Protocole d'expertise des bâtiments favorables.		
Pour les chiroptères, les gîtes peuvent être utilisés à différentes périodes de l'année. En été, il peut s'agir de colonies de mises-bas ou des individus isolés. En hiver, certaines espèces peuvent y hiberner. Les cavités sont plus visibles l'hiver, cette période sera donc favorable pour la détection de gîtes. Pour les oiseaux, les bâtiments peuvent être utilisés en période de reproduction pour la nidification. La présence de nids peut être observée tout au long de l'année, une visite en hiver permet cependant de ne pas créer de dérangement. Là encore, s'il y a une absence absolument certaine d'individus dans les bâtiments, les fissures et cavités peuvent être colmatées. La démolition peut alors se dérouler sans autre contrainte spécifique. Dans le cas où le bâtiment est occupé, les périodes à éviter seront d'avril à septembre (inclus) pour la nidification des oiseaux et la parturition des chiroptères ; et de décembre à février (inclus) pour l'hibernation des chiroptères. Un système anti-retour pourra être mis en place dans les cavités où des individus ont été observés. Il permettra de laisser la possibilité aux individus encore présents de quitter le gîte sans pouvoir y revenir. Le système doit être en place au minimum 48h avant la démolition afin de laisser le temps aux individus présents de s'enfuir. Une dernière inspection sera nécessaire le jour de la démolition pour confirmer l'absence d'individus.		
Moyens humains et matériels		
Chiroptérologue agréé grimpeur, écologue		
Indicateurs de suivis		
Vérification du respect des prescriptions (dispositifs présents et conformes)		

5.5 DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

TR04 Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (actions préventives et curatives)	
Equivalence CEREMA	R2.1f - Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (actions préventives et curatives)

Période de réalisation	Fréquence et durée	Phase de réalisation
Avant le début des travaux	Toute la durée des travaux	Phase travaux
Intérêts et objectifs		
Cette opération permettra une identification exacte des zonages à prendre en compte pour éviter toutes propagations d'EEE et limiter la régénération et le développement de ces espèces après les travaux. Cette mesure vise en une réduction de l'uniformisation des paysages et de fragmentation des continuités écologiques.		
Milieux, espèces et/ou cortèges cibles		
Habitats naturels et flore		
Localisation		
Ensemble de la zone d'emprise du projet		
Modalités techniques		
La mesure intégrera plusieurs dispositions : 1) Limiter les risques d'extension d'espèces envahissantes déjà présentes sur le site Le site étudié présente 13 espèces exotiques envahissantes. Un balisage des secteurs d'invasives est d'abord à mettre en place pour éviter la propagation dans les milieux alentours (stations, pieds et foyers d'EEE balisés par jalons/piquets/rubalise ...). Les espèces occupant l'emprise du projet seront traitées. Les modalités de traitements à appliquer sont adaptées, en fonction des caractéristiques biologiques des espèces. Le coordinateur environnemental en charge du suivi de chantier veillera à l'absence de ces espèces, ou d'autres espèces éventuelles, au sein des remblais. En cas de constatation visuelle de présence, la destruction des espèces sera immédiate et devra respecter des procédures particulières et adaptées aux espèces en présence. Il est important de prêter attention lors de l'arrachage des plantes afin d'en limiter la propagation. Pour tout apport de terre végétale extérieur, il sera demandé au fournisseur un certificat de qualité sur ce point. Afin de ne pas offrir de milieux propices à l'installation d'espèces envahissantes, les mesures suivantes seront mises en place : ▶ Les zones tassées sont rapidement remises en état et ensemencées à l'aide d'un mélange de graminées et de légumineuses adapté pour préparer la restitution agricole des terrains ou les talus de la voirie. La densité du semis sera de 15 à 20 kg/ha. ▶ Les stocks de terres végétales provisoires seront également ensemencés pour éviter la colonisation par les espèces envahissantes. Un suivi de la recolonisation éventuelle du site par des espèces exotiques envahissantes sera réalisé par un coordinateur environnemental pendant et après les travaux. Celui-ci visitera tous les secteurs ayant fait l'objet de travaux, évaluera la recolonisation par les espèces exotiques et proposera un protocole d'éradication adapté le cas échéant. Les interventions d'éradication seront ensuite réalisées et/ou encadrées par l'organisme en charge de la gestion des espaces naturels, ou par des entreprises spécialisées (jardiniers, paysagistes...) missionnées par le maître d'ouvrage sur les conseils de la structure en charge de l'assistance environnementale. 2) Limiter les risques d'introduction en favorisant des végétaux locaux Afin de supprimer le risque de propagation d'espèces envahissantes, les espèces végétales utilisées pour les aménagements paysagers seront de provenance génétique locale et adaptée aux conditions locales. La liste des espèces végétales proposées pour les aménagements paysagers sera validée par une instance compétente (CBN, DREAL...). La revégétalisation devra ainsi éviter les espèces ornementales et favoriser les espèces autochtones afin de recréer un milieu naturel fonctionnel pour la faune. Il est en outre important de respecter		

TR04 Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (actions préventives et curatives)

l'écologie des habitats du site en utilisant au maximum les espèces déjà présentes sur l'emprise du projet.



Dans ce cadre, le label Végétal local peut-être intéressant. Cette marque est un outil de traçabilité des végétaux sauvages et locaux. Ils sont issus de collecte en milieu naturel et n'ont pas subi de sélection par l'homme ni de croisement. Ils sont naturellement présents dans la région d'origine considérée.

Le terme « local » réfère ici à la notion de région écologique, la région d'origine du végétal, c'est-à-dire là où il a été collecté. Les 11 grandes régions écologiques ont été définies dans le cadre de la marque végétal local.

L'objectif est de garantir la traçabilité de ces végétaux et la conservation de leur diversité génétique afin d'avoir des gammes adaptées pour la restauration des écosystèmes et des fonctionnalités écologiques. Cela est possible grâce à leurs adaptations génétiques spécifiques.

L'usage de végétaux sauvages d'origine locale permettent entre autres de :

- ▶ Participer à la fonctionnalité écologique des milieux ;
- ▶ Conserver le potentiel adaptatif vis-à-vis des changements globaux ;
- ▶ Permettre l'accueil et l'interaction avec la faune sauvage ;
- ▶ Améliorer la résistance aux maladies et ravageurs ;
- ▶ Favoriser la résilience des écosystèmes.

3) Transport et stockage

Un plan de circulation sera défini afin d'éviter le risque de dispersion de l'espèce exotique envahissante sur l'emprise du chantier. Un emplacement spécial, confiné sera délimité et balisé, où seront entreposés les produits de coupes, décapage... Les rémanents d'EEE et les terres infestées (par les rhizomes de Renouées par exemple) ne seront pas mélangés avec des terres saines, ni avec des résidus de végétaux indigènes.

Les terres contaminées et les produits de coupes seront par la suite envoyés dans un centre de traitement agréé.

Le transport des produits de coupe ainsi que des terres infestées sera effectué en camion bâché. Cette mesure sera appliquée sur l'emprise du chantier, ainsi que lors du transport vers le centre d'incinération/traitement agréé.

Des bordereaux de suivis seront fournis au Maître d'Ouvrage.

Le stockage des EEE doit être de préférence effectué dans des sacs étanches (big bag).

4) Nettoyage des engins

Tous les engins en contact direct avec les EEE seront systématiquement nettoyés au jet à haute pression, sur une plateforme de nettoyage prévue à cet effet. Il faudra s'assurer avant leurs mises en circulation, qu'aucun élément n'est encore infesté (godet, container, roue, chenille...). Les eaux de nettoyage seront filtrées et les boues de lavage séchées seront envoyées en centre de traitement.

5) Surveillance de la zone

TR04 Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (actions préventives et curatives)
Le site d'étude devra faire l'objet d'un suivi post-chantier pour analyser l'évolution et la dynamique du site. Des mesures seront prises en cas de recolonisation par les EEE. Cas spécifiques par espèces : La grande variété d'espèces exotiques envahissantes présentes nécessite des protocoles adaptés pour chacune des espèces. Des protocoles sont présentés de manière succincte dans le tableau pa ge suivante. Parmi les espèces avérées, modérément ou fortement envahissantes on retrouve les espèces suivantes : l'Erable négundo (<i>Acer negundo</i>), l'Ailanthé (<i>Ailanthus altissima</i>), l'Ambroisie (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), l'Armoise de Chine (<i>Artemisia verlotorium</i>), le Buddleja de David (<i>Buddleja davidii</i>), la Vergerette annuelle, du Canada et de Barcelone (<i>Erigeron annuus</i>, <i>E. canadensis</i>, <i>E. sumatrensis</i>), le Topinambour (<i>Helianthus tuberosus</i>), la Vigne-Vierge (<i>Parthenocissus inserta</i>), la Renouée du Japon (<i>Reynoutria japonica</i>), le Robinier faux-acacia (<i>Robinia pseudoacacia</i>), et le Sénéçon du Cap (<i>Senecio inaequidens</i>). Différentes méthodes sont possibles selon les stades de colonisation ainsi que le stade de développement des plants, elles devront être adaptées au site d'étude et à la période d'intervention.
Moyens humains et matériels
Entrepreneurs du paysage Piquets, marteau, carte, pointeur GPS
Indicateurs de suivis
Suivi du balisage et de la gestion des EEE par un écologue Certificats de traçabilité de l'origine des plants à fournir à la DREAL Bordereaux de suivis pour le transport des EEE et fiche de transport en centre de traitement spécifique Absence d'expansion des EEE

Espèce	Stade de développement du plant	Traitements	Période de mise en œuvre	Réurrence et répétition de la technique	Réalisation	Limites de la mise en œuvre	Mesures complémentaires	Elimination des déchets
Robinier faux-acacia (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	<u>Jeunes plants</u>	Arrachage manuel en veillant à enlever les racines	Dès mars	1 seul passage		Fastidieux	Végétaliser les sols mis à nu avec des espèces indigènes : frêne, charme, sureau, sorbier ...	Forte capacité de reproduction végétative par ses racines → - bois et feuilles peuvent être laissés sur place - le bois peut être valorisé (chauffage, piquets, construction navale ...) 1) Incinération : évacuation en usine d'incinération des ordures ménagères (UIOM) 2) Compostage avec hygiénisation ou méthanisation dans une compostière professionnelle (les compostières doivent être averties à l'avance en cas d'apport de quantités importantes de matières végétales infestées de néophytes)
		Débroussaillage possible si et seulement s'il pourra être effectué 5x minimum par an.	1 ^{er} passage début d'été,	5 passages / an + durant la saison de végétation	Le plus au ras du sol possible	Nombre de passages importants, limités aux jeunes plants		
	<u>Arbres Ø<10 cm</u>	Arrachage mécanique en veillant à enlever les racines	Dès mars	1 seul passage		Uniquement sur sols peu compactés, milieu peu sensible, accessibilité, matériel lourd		
	<u>Arbres Ø> 10 cm</u>	Ecorçage afin de couper la circulation de la sève élaborée et accélérer la sénescence de l'arbre	Début de l'automne	Durant les trois années qui suivent l'écorçage, 2 passages / an sont prévus pour arracher les rejets et gourmands qui repartent depuis la souche et le tronc		Long processus		
		Méthode GAMAR : coupe des sujets + tronçonnage de la partie sommitale de la souche afin d'assurer que les canaux de sève ne sont pas colmatés + écorçage du pourtour supérieur de la souche sur 5 à 10cm de largeur + application d'un boudin de mastic biodégradable qui servira de joint d'étanchéité + agrafage immédiat d'une bande de caoutchouc (hauteur 30cm) + raccorder la bande de caoutchouc à la souche + fermeture du dispositif sur le haut (colle) pour obtenir un manchon imperméable + remplissage du manchon avec une solution pénétrant les canaux de circulation de sève + vérification indispensable de l'étanchéité	été / avant la descente de sève	1 seul passage		Technicité importante et <u>méthode brevetée</u>		

Espèce	Stade de développement du plant	Traitements	Période de mise en œuvre	Récurrence et répétition de la technique	Réalisation	Limites de la mise en œuvre	Mesures complémentaires	Elimination des déchets
Vigne-vierge commune (<i>Parthenocissus inserta</i>)	<u>Liane</u>	Dispersion des baies très facile - Impossibilité d'entreprendre des actions de luttés d'envergure → Arrachage : si possible	Avant floraison, en hiver	1 seul passage	-	-	-	Les fragments peuvent prendre racine et former de nouveaux individus → 1) Incinération : évacuation en usine d'incinération des ordures ménagères (UIOM) 2) Compostage avec hygiénisation thermophile ou méthanisation thermophile
Renouée du Japon (<i>Reynoutria japonica</i>)	<u>Jeunes pousses</u>	Arrachage manuel	Printemps sur sol humide si possible		Creuser pour déterrifier le rhizome enfoui			Incinération : évacuation en usine d'incinération des ordures ménagères (UIOM)
	<u>Plants adultes</u>	Fauchage intensif		Toutes les 3 semaines	Toutes les 3 semaines de mai à septembre, sur plusieurs années	Ne pas faire de fauche occasionnelle : elle augmente la densité de plants		
Vergerette annuelle/du Canada/de Barcelone (<i>Erigeron annuus/canaden sis/sumatrensis</i>)	<u>Plants isolés ou petites populations / élimination rapide</u>	Arrachage manuel	Mai à octobre	Toutes les 3-4 semaines			Vérification de la mesure durant l'année de l'intervention, puis dans les années qui suivent. Végétaliser (semis, plants) après élimination de la plante afin de limiter la colonisation par d'autres EEE	Si ni fleurs, ni graines : compostage normal Si fleurs et/ou graines + racines : Compostage avec hygiénisation thermophile ou méthanisation thermophile
	<u>Grandes populations</u>	Fauche basse et répétée	1ère fauche en mai	Tous les mois		Une fauche seule ne permet pas d'éliminer la plante. Pour empêcher la dissémination par graines, la fauche doit se répéter sur plusieurs années		
	<u>Grandes populations</u>	Fauche + Arrachage	Avant maturité des graines (de mai à octobre)		Arrachage sur la zone périphérique , et fauche dans la zone centrale.			

Espèce	Stade de développement du plant	Traitements	Période de mise en œuvre	Réurrence et répétition de la technique	Réalisation	Limites de la mise en œuvre	Mesures complémentaires	Elimination des déchets
Ambroisie (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>)	<u>Plants isolés</u>	Arrachage manuel	Avant la floraison (avant juillet)		Arracher avec les racines et annoncer à la personne responsable de la commune	Couteux		Avant le 15 septembre, les déchets peuvent être laissés sur place. Toutefois, si les déchets sont récoltés, ils seront mis en sac à destination de la déchetterie pour compostage Après le 15 septembre, les déchets doivent être exportés (après mise en sac) et impérativement être traités par incinération. Le brûlage sur place des déchets n'est possible que dans les départements où l'arrêté préfectoral relatif à la lutte contre l'ambrosie l'autorise.
	<u>Grandes populations</u>	Fauchage, tonte, gyrobroyage	Avant la floraison (avant juillet)	3 fois par an : avril-mai / fin juillet / fin août	Couper les pieds à ras (2 à 6 cm)	Une fauche n'est pas suffisante pour contrôler les émissions de pollen et de semences. Deux fauches permettent un effet répressif sur la quantité de pollens, mais pas sur l'effet d'invasion Trois fauches permettent un effet répressif sur l'invasion		
		Désherbage thermique				Efficace seulement sur plantules Emissions de CO2 et de COV		
Sénéçon du Cap (<i>Senecio inaequidens</i>)	<u>Plants isolés</u>	Arrachage manuel	Avant la fructification (avant avril-mai)		Arracher avec les racines (possibilité d'ameublir le sol à la fourche au préalable)		Laisser sécher le matériel végétal sans fleurs. Le matériel avec fleur doit être éliminé dans une usine d'incinération Limitier le surpâturage :	Compostage avec hygiénisation thermophile ou méthanisation thermophile

Espèce	Stade de développement du plant	Traitements	Période de mise en œuvre	Récurrence et répétition de la technique	Réalisation	Limites de la mise en œuvre	Mesures complémentaires	Elimination des déchets
	<u>Grandes populations</u>	Fauchage		Fauche à répéter pendant plusieurs années, toutes les 6 semaines à ras (le plus court possible)		La fauche ne permet pas d'éliminer la population, mais réduit simplement la propagation	c'est l'une des causes de sa prolifération Limiter l'écobuage : technique utilisée pour la gestion de débroussaillage mais qui favorise le séneçon	
		Lutte biologique			Semis dense de légumineuses ou de graminées indigènes sur les sols infectés	Peu efficace car le séneçon produit des substances allélopathiques négatives		
Erable negundo (<i>Acer negundo</i>)	<u>Jeunes arbres</u>	Cerclage	Début de l'automne	1 seul passage	2 Entailles du tronc à hauteur d'homme	Risque de chute d'arbre, éviter ce type de méthode dans les lieux fréquentés		Eliminer les déchets par incinération ou laisser sécher hors de toute zone inondable.
		Pâturage ovin	Toute l'année		Broutage des jeunes plants et des germinations			
	<u>Arbres adultes</u>	Coupe intégrale		Une fois par an sur 3 ans	Coupe de l'arbre et élimination des rejets l'année suivante			
Ailanthé (<i>Ailanthus altissima</i>)	<u>Jeunes pousses</u>	Arrachage manuel						Eliminer les déchets par incinération ou laisser sécher hors de toute zone inondable.
	<u>Plants adultes</u>	Arrachage mécanique en veillant à enlever les racines	Avant la floraison (avant juin)	1 seul passage		Ne peut être réalisé dans les zones humides ou sur les terrains meubles		

Espèce	Stade de développement du plant	Traitements	Période de mise en œuvre	Récurrence et répétition de la technique	Réalisation	Limites de la mise en œuvre	Mesures complémentaires	Elimination des déchets
		Coupes répétées	Pendant la floraison	Une fois par an jusqu'à épuisement des individus	Coupe de l'arbre chaque année			
		Cerclage	Début de l'automne	1 seul passage	2 Entailles du tronc à hauteur d'homme	Risque de chute d'arbre, éviter ce type de méthode dans les lieux fréquentés		
Armoise de Chine (<i>Artemisia verlotorium</i>)	<u>Jeunes pousses</u>	Arrachage manuel	Avant la floraison (avant juillet)	1 seul passage		Convient uniquement aux surfaces faiblement infestées		Les déchets peuvent être concassés, brûlés ou compostés tant que la gestion a été réalisée avant la production de semences. Les graines doivent être ensachées et éliminées, et tous les rhizomes doivent être soigneusement écrasés ou séchés.
	<u>Plants adultes</u>	Fauche répétée	Avant la floraison (avant juillet)	3 fois par an		Ne permet pas l'éradication totale		
Buddleia de David (<i>Buddleja davidii</i>)	<u>Jeunes plants</u>	Arrachage manuel en veillant à enlever les racines				Uniquement sur de petites populations isolées		L'élimination des plantes arrachées ou coupées doit impérativement se faire par incinération et non par compostage.
	<u>Plants adultes</u>	Dessouchage et tronçonnage	Avant la fructification (avant juin)	fauche 2 fois par an	Après arrachage, des fauches répétées des jeunes plants et des rejets doivent avoir lieu 2 fois par an, dès le début de la floraison.	Uniquement sur de faibles peuplements au stade initial d'envahissement		
Topinambour (<i>Helianthus tuberosus</i>)	<u>Plants adultes</u>	Fauchage	Avant la fructification (avant septembre)	3 fois par an	Fauche jusqu'à épuisement de la plante			L'élimination des plantes arrachées ou coupées doit impérativement se faire par incinération et non par compostage.

