DEMATHIEU BARD IMMOBILIER

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

VILLE DE DIEPPE

PROJET D'AMÉNAGEMENT BONNE NOUVELLE



ÉTUDE FAUNE-FLORE, SIMONT 2025

OCTOBRE, 2025

écotone
ING&NIERIE

SOMMAIRE

I. ÉTUDE FAUNE, FLORE, PATRIMOINE NATUREL ET ZONES HUMIDES 3

I.1. METHODES 3

I.2. INVENTAIRE FLORE 6

I.3. OCCUPATION DU SOL 13

I.4. UNITÉS DE VEGETATION PROSPECTIONS ET SENSIBILITÉ ÉCOLOGIQUE 2024 15

I.5. UNITÉS DE VEGETATION PROSPECTIONS ET SENSIBILITÉ ÉCOLOGIQUE 2025 20

I.6. INVENTAIRE FAUNE 27

I.7. INVENTAIRE AVIFAUNE 30

I.8. ENJEUX 36

PLANCHES

planche 1 : Cartographie des prospections naturalistes pour la flore en fonction des dates 8
planche 2 : Cartographie des prospections naturalistes pour les espèces des zones humides 10
Planche 3 : Cartographie des prospections naturalistes pour les espèces invasives 12
planche 4 : *Évolution de l 'occupation du sol* 14
planche 5 : Cartographie des unités de végétation (2024) 18
planche 6 : Cartographie de la sensibilité écologique (2024) 19
planche 7 : Cartographie des unités de végétation (2025) 25
planche 8 : Cartographie de la sensibilité écologique (2025) 26
planche 9 : Cartographie des prospections naturalistes pour les espèces de la faune 29
planche 10 : Cartographie des prospections naturalistes pour les espèces de l'avifaune 31
planche 11 : Cartographie du projet avec la sensibilite des habitats 38

ANNEXES

- La liste des espèces,
- Photographie du site

I. ÉTUDE FAUNE, FLORE, PATRIMOINE NATUREL ET ZONES HUMIDES

Cette étude s'inscrit dans le cadre d'un projet d'aménagement immobilier situé sur la commune de Dieppe. L'objectif de cette étude est de réaliser un diagnostic écologique patrimonial basé sur l'inventaire de la faune et des habitats naturels.



Photographie aérienne du site

I.1. METHODES

Cet inventaire a été réalisé par le bureau d'étude VINCENT SIMONT lors de 5 passages :

- Passage en automne : 02 et 03 octobre 2024,
- Passage au printemps : 3 mars 2025 et 6 mai 2025,
- Passage en été : 04 juillet 2025


La météo était favorable los des 5 passages sur le site. Leur inventaire se base sur la recherche spécifique par groupe taxinomique.

- **Taxons**

Leur inventaire a été conduits sur les groupes taxinomiques suivants :

- *Flore et habitats naturels ;*
- *Oiseaux ;*
- *Mammifères ;*
- *Odonates (Libellules et demoiselles) ;*
- *Lépidoptères diurnes (Papillons de jour).*
- *Orthoptères (Grillons, Criquets, Sauterelles)*

Les résultats pour chaque groupe va dépendre de la période d'observation, des éléments présents sur le site (eau pour les Odonates et les Batraciens), des dates de passages. Le tableau ci-dessous résume pour chaque groupe d'espèces les périodes les plus favorables d'inventaires (source : Vincent Simont) :



- **Flore**

La première observation d'un taxon se fait à la vue avec la notation des points GPS pour obtenir un nuage de point. Les espèces très communes sont répertoriées une seule fois sur la parcelle, à contrario les espèces patrimoniales ou avec des enjeux vont être indiquées à plusieurs reprises. Pour la flore lors de son inventaire des prélèvements des espèces sont effectuées puis elles sont identifiées au laboratoire pour les espèces compliquées à analyser.

Les milieux qui sont jugés les plus intéressants par le naturaliste vont être prospectés plus dans le détail comme un boisement calcicole, un espace boisé. A contrario des espaces bâtis ou une friche seront jugés comme moins intéressants et les enjeux seront plus faibles.

- **Faune**

La prospection des espèces se fait tout au long de la sortie du naturaliste par exemple les oiseaux peuvent être observés dans les zones de friche, au niveau des bâtiments, dans les zones boisées alors qu'ils sont présents dans la haie.

- Mammifères

Les recherches sur les mammifères ont consisté à parcourir l'ensemble du site et ses différents habitats. Leur étude nécessite des investigations particulières comme le piégeage des micromammifères, la pose de pièges photographiques, *etc*. Seules les méthodes d'observations directes et la recherche d'indices ont été entreprises. Les observations peuvent se faire par la trace des fèces.

- Avifaune

Les prospections ont été conduites sur le site au printemps, en été et en automne. La totalité du site a été prospectée. À cette occasion, les indices laissés par les oiseaux (nid, plumes, fientes, pelotes de rejection…) sont identifiés. Ils permettent de compléter l'inventaire. Les oiseaux sont également reconnus à l'ouïe et quand l'espèce n'est pas reconnue le son est enregistré, pour être analysé en laboratoire afin d'obtenir le nom du taxon.

La méthode utilisée pour ces prospections découle de celle des plans quadrillés qui consiste à localiser sur une carte l'ensemble des observations réalisées. L'observateur parcourt la zone d'étude sans contraintes temporelle, d'heure ou de trajet précis. Cette méthode itinérante permet à l'observateur expérimenté de localiser directement les données de terrain sur un plan.

- Invertébrés

Les invertébrés forment un vaste groupe faunistique difficile d'étude. Parmi eux, les papillons de jours (Lépidoptères rhopalocères), les libellules et demoiselles (odonates) et les sauterelles, grillons et criquets (orthoptères), sont les groupes les plus abordés dans ce type d'étude.

L'inventaire des papillons de jour a été effectué par prospection "à vue" sur l'ensemble du site, avec si besoin, capture au filet pour identification. Les chenilles et les informations connexes qui s'y rapportent (plantes hôtes, cocons…) sont prises en compte dans l'inventaire. Le comportement des adultes en vol est également noté, lorsqu'il apporte une indication sur l'utilisation du site par l'espèce (parade nuptiale, accouplement, rassemblement…).

L'inventaire des Odonates est basé sur l'observation directe des adultes, capturés si nécessaire au filet pour identification ou aux jumelles.

L'inventaire des Orthoptères est basé sur l'observation directe des adultes, capturés au filet fauchoir ou la nappe de battage pour identification et à l'écoute des émissions sonores.

- **Inventaires des espèces**

Dans leurs inventaires les taxons sont répertoriés avec la nomenclature taxonomique utilisée par le Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN, TaxRef 18.0) de Paris et reprise dans la base de données SERENA (développée par RNF). Quand, ils ont identifié les taxons directement sur le terrain lorsque cela est possible. Toutefois, des prélèvements peuvent être réalisés pour les taxons nécessitant un examen attentif en laboratoire.

Quand, ils n'ont pas identifié l'espèce le mention « sp » est utilisée. Les autres taxons sont identifiés au rang d'espèce, c'est-à-dire au sens strict et excluant les complexes d'espèces.

- **Statut de rareté des espèces SIMONT (Avifaune/Faune)**

Dans le cadre de leur inventaire, les espèces ont été classées en fonction de leur statut de rareté.

« Les statuts de rareté ont été élaborés à partir d'une échelle « d'expert » à partir de connaissance de terrain et de la bibliographie disponible. L'échelle suivante a été appliquée pour caractériser le statut de rareté des espèces : Très rare, Rare, Assez rare, Peu commune, Assez commune, Commune, Très commune. Cette échelle peut dans certains cas être simplifiée pour des groupes taxonomiques peu connus. »

Les références bibliographiques ci-dessous correspondent aux principales ressources documentaires sur lesquelles s'est basée le Bureau d'étude VINCENT Simont l'élaboration des statuts de rareté.

« Il est important de préciser que quelle que soit l'échelle de cotation adoptée, les seuils choisis contiennent toujours une part d'arbitraire. L'essentiel n'est pas tant d'établir une « cotation absolue », mais d'identifier les taxons les plus intéressants dans un système hiérarchisé.


Par ailleurs, il ne faut pas dogmatiser l'apparente précision mathématique de ce type de classification. Une analyse critique est évidemment nécessaire, en particulier pour les espèces dont la fréquence est proche d'un seuil. Par exemple, la régression ou l'extension d'un taxon et de son biotope sont des facteurs importants.

Inversement, il faut également noter qu'une espèce peut présenter une aire de répartition assez dense mais des habitats et des populations de petites tailles, disséminés sur l'ensemble du territoire. C'est le cas souvent pour différentes espèces d'amphibiens par exemple. Dans ce cas, la fréquence peut éventuellement être pondérée. Cette catégorie d'espèces concerne surtout les degrés assez communs à assez rare et correspond globalement à la définition suivante : « *Espèce peu commune, liée à un habitat ou groupe d'habitats spécialisés et/ou encore présente dans de nombreux milieux mais aux populations très faibles* ». »

- **Statut liste rouge (Flore/avifaune/faune)**

Chaque taxon a également été classé en fonction de la liste rouge. La liste rouge correspond à un indicateur pour suivre l'état de la biodiversité. Elle a été mise en place par l'IUCN (Union internationale pour la conservation de la nature).

Le système de l'IUCN est caractérisé par neuf catégories qui sont indiquées dans la figure suivante :



- **Statut liste CBN (flore/avifaune)**


Pour compléter les données de la liste rouge pour chaque espèce, les statuts du conservatoire botanique d'espace naturel de Haute Normandie ont été utilisés. Les espèces patrimoniales sont un ensemble d'espèces protégées, menacées et rare. Ce statut n'est pas considéré comme légal car le classement est effectué en fonction

I.2. INVENTAIRE FLORE

Au total 151 taxons de végétaux supérieurs ont été répertoriés. La liste complétée des taxons se situe en annexe. Le graphique ci-dessous présente les différents statuts de rareté des taxons à l'échelle de la Normandie orientale (CBNBl, 2023).

La légende indique :

- ? = indéterminées,
- CC= Très commun
- C= Commun
- AC= Assez-commun
- PC= Peu commun
- AR= Assez-rare
- R= Rare
- Rare ? = Présumé Rare
- RR= Très rare
- E= Exceptionnel
- P = attribué uniquement aux ordres et aux classes pour lesquels aucune rareté n'a été définie.



Les résultats mettent en évidence une richesse spécifique assez faible avec une mosaïque d'habitat peu diversifié comme du bâti, une friche, un secteur de décharge, un coteau calcaire et un « espace boisé ».

Un secteur a été fauché lors des derniers inventaires. Il est localisé sur la parcelle 037.

Concernant les taxons, d'après la liste du CBNBl,2023, trois sont considérés comme patrimoniaux en Normandie et déterminante ZNIEFF. Les taxons sont :

Les taxons d'après la liste rouge sont en préoccupation mineur : les taxons sont : *Iris foetidissim*a (Iris fétide), *Sedum album* (Orpin blanc) et *Valerianella locusta* (Mâche potagère).

L'Iris fétide est une vivace décorative appréciée pour ses fruits rouges/oranges en automne et en hiver, apportant couleur et structure aux massifs. L'Orpin blanc est une plante succulente tapissante qui forme un couvre-sol attrayant, avec des fleurs blanches délicates en été et un feuillage texturé. La mâche potagère, bien que comestible, offre un intérêt ornemental grâce à sa rosette de feuilles vert tendre, idéale pour ajouter verdure et relief aux massifs ou jardins d'hiver. Les trois plantes peuvent être des échappées de jardin.


Iris foetidissima


Sedum album


Valerianella locusta

Une espèce est considérée comme assez-rare par le statut du Conservatoire Botanique national de Baneuil. Il s'agit du Cotonéaster horizontal (*Cotoneaster horizontalis*) qui a un comportement invasif sur le site. Cette espèce est un arbuste utilisé comme plante ornementale.



Cotonéaster horizontal

Un taxon est considéré comme très-rare, il s'agit d'*Héliotrope d'hiver est t*rès parfumé, ajoute des fleurs violettes décoratives et peut parfois apparaître spontanément dans les friches, bien que ce soit rare.



Héliotrope d'hiver


Concernant les taxons aucun taxon ne présente de statut en danger au sein de la liste rouge. Aucun taxon n'est protégé régionalement.

ING&NIERIE

PROJET D'AMÉNAGEMENT
SUR LA COMMUNE DE DIEPPE

Cartographie des prospections naturalistes pour la flore (2025)

DEMATHIEU BARD IMMOBILIER



✓ ZONES HUMIDES


Dans le cadre du projet aucune zone humide n'est présente d'après la pédologie et l'étude faune-flore. Toutefois des espèces caractéristiques des zones humides sont présentes sur le site.

Les espèces indicatrices des zones humides sont classées à l'échelle nationale (légende : XX), les espèces avec une indication XXpp sont indicatrices des zones humides mais pour partie dans le document national de référence ZH. Ces espèces sont classées selon l'arrêté du 24 juin 2008 au sein de l'annexe 2.

Le nombre de taxons caractéristiques des zones humides est de 13 sur 151 espèces. Le pourcentage d'espèce de zone humide est de 9 %. Les espèces caractéristiques des zones humides sont : *Agrostis stolonifera, Argentina anserina, Cardamine flexuosa, Eupatorium cannabinum, Humulus lupulus, Petasites pyrenaicus, Ranunculus repens, Rumex conglomeratus, Salix atrocinerea, Solanum dulcamara*

La légende indique :

- X = indicatrice à l'échelle nationale,
- XXpp = indicatrices des zones humides mais pour partie,
- Non
- - = indéterminées




ING&NIERIE

PROJET D'AMÉNAGEMENT SUR LA COMMUNE DE DIEPPE

Cartographie des prospections naturalistes pour les espèces des zones humides

DEMATHIEU BARD IMMOBILIER



✓ ESPÈCES POTENTIELLEMENT INVASIVES

Le site, en raison de son état de friche, abrite de nombreuses stations d'espèces invasives. Cinq taxons y ont été identifiés comme tels, dont un qui, bien que non reconnu comme avéré invasif par le CBNBL, présente un caractère invasif sur ce site. La localisation des taxons recensés n'est toutefois pas exhaustive.

Les espèces invasives sur le site sont indiquées dans le tableau ci-dessous toutes les espèces sont avérées comme invasives sauf le *Cotoneaster horizontalis*, toutefois sont comportements sur le site est potentiellement invasif.

Nom scientifique (TaxRef 17.0)	Nom vernaculaire	EEE Normandie orientale (CBNBl, 2023)
Buddleja davidii Franch., 1887	Arbre aux papillons	Avéré
Cotoneaster horizontalis Decne., 1879	Cotonéaster horizontal	Potentiel sur le site
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922	Vigne-vierge commune	Potentiel
Prunus laurocerasus L., 1753	Laurier cerise	Avéré
Senecio inaequidens DC., 1838	Séneçon du Cap	Avéré

Concernant la localisation de tous les pieds des espèces invasives sur le site, cela n'est pas possible car le site est en grande partie envahi par ces espèces.

Le détail du comportement des espèces se situe ci-dessous :



- *Buddleja davidii* (Arbre aux papillons) est une espèce exotique invasive, elle peut rapidement former des peuplements monospécifiques, qui peuvent exclure localement d'autres espèces. Elle pose problème dans les ripisylves (source : *http://especes-exotiques-envahissantes.fr).* Dans la liste des plantes vasculaire invasives de Basse-Normandie cette espèce se situe dans la catégorie des taxons potentiellement invasifs (*BOUSQUET T.*, et al. 2016).




- *Cotoneaster horizontalis* (Cotonéaster horizontal) est une espèce potentiellement invasive, elle va pousser sur des sols secs, pauvres en nutriments et riche en bases. On va le trouver naturalisé dans des jardins, des parcs et sur des murs en milieu urbain. Cette espèce est rampante et va venir fournir un tapis dense qui recouvre les tapis et les rocailles.



- *Parthenocissus inserta* (Vigne-vierge commune) est une espèce invasive avec un fort comportement grimpant. Elle s'est échappée des habitations et s'est retrouvée dans le milieu naturel. Elle se sert des arbustes, des arbres, des murs comme un support pour venir les recouvrir. En hiver, elle a une couleur rouge.



- *Prunus laurocerasus* (Laurier cerise) est une espèce invasive qui est dense et va fortement ombrager les secteurs. Cette espèce va venir empêcher les espèces vivant dans les sous-bois de se développer et les taxons vont être incapables de se développer ainsi que de survivre.




- *Senecio inaequidens* (Séneçon du Cap) est une espèce invasive avec un système racinaire qui va former un réseau dense et superficiel qui fait que la plante se développe sur des sols peu épais. Cette espèce a été introduite accidentellement d'Afrique du Sud. Le stock des semences a une durée de vie de deux ans.

ING&NIERIE

PROJET D'AMÉNAGEMENT SUR LA COMMUNE DE DIEPPE

Cartographie des prospections naturalistes pour les espèces des invasives

DEMATHIEU BARD IMMOBILIER



I.3. OCCUPATION DU SOL

L'emprise du projet comprend les parcelles cadastrales numérotées 036, 037, 041, 042 et 0170 appartenant au secteur AH dont le tout représente une surface de 4,45 ha.

Comme on peut le voir au travers des photographies de la planche suivante, le site d'étude depuis les années 1965 est un site industriel. Ce site au cours des années a été laissé l'abandon puis il est devenu une friche avec des espèces invasives.

Les photographies ci-dessous permettent d'observé l'évolution du site pendant environ 70 ans :

- **Années 1965 :** Le site était occupé par des industries en 1965 et les alentours n'étaient pas encore construits hormis avec des usines.

- **Années 1990 :** Le site était également occupé par des industries, les deux bâtiments ronds ne sont plus présents laissant place à une zone vague sans construction avec un sol à nu. Les usines semblaient encore être exploitées. Des bâtiments ont été construits tous autour et la route était présente.

- **Années 2003 :** Les activités industrielles sur le secteur semblaient être encore en activité, la végétation commençait à doucement coloniser le milieu surtout au niveau de la parcelle au nord et le terrain est actuellement utilisé par les gens du voyage. L'ancien secteur avec les bâtiments rond de 1965 était similaire aux années 1990.

- **Années 2007 :** Les usines semblaient ne plus être en activité et l'ancienne zone avec les bâtiments ronds. Le sol était de plus en plus occupé par de la végétation mais uniquement un couvert végétal vert avec des espèces pionnières (cf photo-aérienne). Dans le secteur au sud, la végétation devenait plus dense.

- **Années 2014 :** Les activités industrielles sont toujours inactives hormis les bâtiments avec les associations mais la végétation commençait à se densifier avec des secteurs encore non colonisés. La végétation typique des friches commençait à prendre de plus en plus d'ampleur. Le site n'accueillait pas encore les gens du voyage d'après les images aériennes aucune caravane n'était présente sur le site.

- **Années 2018** : La végétation se densifie et l'état du site reste le même.

- **Années 2020** : Le secteur au nord était utilisé par les gens du voyage et la végétation se développait allant vers des successions végétales plus importantes. Le site semblait être de plus en plus colonisés par des arbres et non des arbustes. La zone du projet est une friche industrielle avec un couvert végétal plus important avec quelques arbustes qui se développent.

- **Années 2022** : La zone du projet est une friche industrielle avec un couvert végétal plus important avec quelques arbres qui se développent. Le secteur était toujours utilisé par des gens du voyage.

Le site a longtemps été à vocation industrielle mais au fur et à mesure des années son état s'est enfriché avec un fort développement de la végétation devenant très dense. Le site est maintenant squatté par les gens du voyage et les autres bâtiments sont utilisés par des associations. Les secteurs en friche contiennent des déchets et des excréments humains.

Le milieu est en grande partie envahi par des espèces invasives comme l'arbre à papillons, le cotonéaster horizontal, la vigne-vierge commune, le laurier cerise, et le séneçon du cap.

ING&NIERIE

PROJET D'AMÉNAGEMENT
SUR LA COMMUNE DE DIEPPE

Cartographie de l'occupation du sol

DEMATHIEU BARD IMMOBILIER

















I.4. UNITÉS DE VEGETATION PROSPECTIONS ET SENSIBILITÉ ÉCOLOGIQUE 2024

Dans son étude faune/flore le naturaliste à mis en avant les unités de végétation qui vont être différentes en fonction des secteurs du projet.

Les unités de végétations sont :

- Bâti,
- Friche,
- Décharge,
- Boisement calcicole
- Espace boisé

➢ **Bâti**

Le secteur est bâti avec des anciens bâtiments industriels, les bâtiments au nord de la parcelle sont désaffectés. Un bâtiment est un utilisé par une personne comme un « squat » un cadenas a été installé par la personne. Les bâtiments au sud sont exploités par trois associations. **La sensibilité écologique est faible.**

La zone du nord est utilisée par les gens du voyage en tant qu'aire de stationnement pour les caravanes.









- **Friche,**

Les secteurs en friche sur le terrain vont correspondre à des zones qui ont été exploitées par l'homme précédemment puis abandonnées et colonisées par la végétation. Les parcelles correspondent à des friches industrielles. Les espèces invasives sont nombreuses sur le site. La répartition de tous les pieds n'est pas possible car le site est en grande partie colonisé. Dans la friche il y a de nombreux excréments d'origine humaine. **La sensibilité écologique est faible.**






- **Décharge,**


Dans le secteur sud une décharge est présente sur les photos aériennes, elle n'est pas visible. Les déchets sont en tous genres avec des métaux, du plastique. **La sensibilité écologique de ce secteur est faible.**



➢ **Boisement calcicole**

Le site se situe en bordure de falaise avec un boisement dense avec un fort dénivelé. Ce secteur est considéré comme un corridor dans un secteur urbanisé et avec des anciennes usines désaffectées. Les corridors vont permettre de diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels. Des espèces typiques des pelouses calcaires pourraient vivre dans cet habitat. Dans les pelouses calcaires on peut trouver des orchidées et une diversité remarquable pour la faune. **La sensibilité écologique de cet habitat est moyenne. Le boisement calcicole à une superficie de 8 636 m².** La mise en valeur du coteau calcicole serait un véritable atout pour le projet, et un petit coup de rajeunissement pourrait lui insuffler un nouveau dynamisme.







➢ **Espace boisé**

Cette unité de végétation se situe au centre et dans le secteur au sud du projet. **D'un point de vue sensibilité écologique cette zone est considérée comme moyenne**. Le secteur sera surement à débroussailler un peu mais a conservée dans la mesure du possible. Les espaces boisés vont être des secteurs avec une biodiversité importante. Les membres des associations ont vue sur le site des cervidés comme des Chevreuils. **La superficie est de 2 771 m².**

➢ **Conclusion**

Pour conclure, le secteur du projet contient une sensibilité écologique allant de faible à moyenne en fonction des milieux. Elle va être plus élevée au niveau des espaces boisés et du boisement calcicole, à contrario au niveau des zones de friche, la décharge et le bâti la sensibilité est faible. Les secteurs avec une sensibilité moyenne sont des îlots de quiétude avec des espaces propices pour les espèces et l'enjeu est important pour l'écologie urbaine.

ING&NIERIE

PROJET D'AMÉNAGEMENT
SUR LA COMMUNE DE DIEPPE

Cartographie des unités de végétation (2024)

DEMATHIEU BARD IMMOBILIER



ING&NIERIE

PROJET D'AMÉNAGEMENT
SUR LA COMMUNE DE DIEPPE

Cartographie de la sensibilité écologique (2024)

DEMATHIEU BARD IMMOBILIER



I.5. UNITÉS DE VEGETATION PROSPECTIONS ET SENSIBILITÉ ÉCOLOGIQUE 2025

Dans son étude faune/flore le naturaliste à mis en avant les unités de végétation qui vont être différentes en fonction des secteurs du projet. Les unités de végétation ont peu évolué.

Les unités de végétations sont :

- Bâti (un bâtiment a été démoli),
- Grotte,
- Tunnel,
- Friche (un secteur a été fauché)
- Décharge,
- Boisement calcicole
- Espace boisé


➢ **Bâti**

Le secteur est bâti avec des anciens bâtiments industriels, les bâtiments au nord de la parcelle sont désaffectés. Un bâtiment est un utilisé par une personne comme un « squat » un cadenas a été installé par la personne. Les bâtiments au sud sont exploités par trois associations. Un bâtiment a été démoli. La zone du nord n'est plus utilisée par les gens du voyage. Au sein du bâti aucun chiroptère n'a été observé.

La sensibilité écologique est très faible.









- **Grotte**

Une grotte a été observée au sein de la parcelle 0042, elle est limitrophe avec les parcelles 0036 et 0037. La grotte se situe en pied de la falaise. La grotte est accessible par l'homme.

Lors de l'observation aucun chiroptère n'a été observé. Toutefois, la grotte possède un potentiel pour les chiroptères. Elle devra être prise en compte dans le cadre du projet.

La sensibilité écologique est moyenne.

La figure ci-contre indique la localisation de la grotte :











➢ **Tunnel**

Un tunnel est présent sous le bâtiment au niveau de la parcelle 0170. Le tunnel contient de nombreux déchets humains comme : des canettes d'alcool, une table, des palettes, des ampoules, des ustensiles de cuisine. Le tunnel contient une sensibilité écologique faible.

La photographie ci-contre permet d'avoir une localisation approximative du tunnel.











➢ **Friche**

Les secteurs en friche sur le terrain vont correspondre à des zones qui ont été exploitées par l'homme précédemment puis abandonné et colonisé par la végétation. Les parcelles correspondent à des friches industrielles. Une évolution a été observée au niveau de la friche. Les parties ouvertes de la parcelle 0037, ont été gyrobroyés. Les espèces étaient principalement herbacées avec une section qui se développer en ligneux avec des ronces et des rosiers.

Les espèces invasives sont nombreuses sur le site. La répartition de tous les pieds n'est pas possible car le site est en grande partie colonisé. **La sensibilité écologique est très faible.**






➢ **Décharge**

Dans le secteur sud une décharge est présente sur les photos aériennes, elle n'est pas visible. Les déchets sont en tous genres avec des métaux, du plastique. **La sensibilité écologique de ce secteur est très faible.**



➢ **Boisement calcicole**

Le site se situe en bordure de falaise avec un boisement dense avec un fort dénivelé. Ce secteur est considéré comme un corridor dans un secteur urbanisé et avec des anciennes usines désaffectées. Les corridors vont permettre de diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels. Des espèces typiques des pelouses calcaires pourraient vivre dans cet habitat. Dans les pelouses calcaires on peut trouver des orchidées et une diversité remarquable pour la faune. **La sensibilité écologique de cet habitat est moyenne. Le boisement calcicole à une superficie de 8 636 m². Ce secteur est à conserver.**



➢ **Espace boisé**

Cette unité de végétation se situe au centre et dans le secteur au sud du projet. **D'un point de vue sensibilité écologique cette zone est considérée comme moyenne**. Le secteur sera surement à débroussailler un peu mais a conservé si c'était possible. Les espaces boisés vont être des secteurs avec une biodiversité importante. Les membres des associations ont vue sur le site des cervidés comme des Chevreuils. **La superficie est de 2 771 m².**

➢ **Conclusion**

Pour conclure entre 2024 et 2025, le site a peu évolué. La sensibilité écologique est très faible à moyenne. Les enjeux sont principalement au niveau de l'espace boisé, du boisement calcicole et la grotte. Leur préservation est nécessaire. Ils vont être des îlots de quiétude avec des espaces propices pour les espèces et l'enjeu est important pour l'écologie urbaine.

ING&NIERIE

PROJET D'AMÉNAGEMENT
SUR LA COMMUNE DE DIEPPE

Cartographie des unités de végétation (2025)

DEMATHIEU BARD IMMOBILIER



ING&NIERIE

PROJET D'AMÉNAGEMENT
SUR LA COMMUNE DE DIEPPE

Cartographie de la sensibilité écologique (2025)

DEMATHIEU BARD IMMOBILIER



I.6. INVENTAIRE FAUNE

- **MAMMIFÈRES**

Sur le site uniquement, un taxon de mammifère a été observé, il s'agit de *Felis catus (le chat haret).* Il s'agit d'une espèce domestique.

- **INVERTÉBRÉS**

Les invertébrés forment un vaste groupe faunistique difficile d'étude. Parmi eux, les papillons de jours (Lépidoptères rhopalocères), les libellules et demoiselles (odonates) et les sauterelles, grillons et criquets (orthoptères), sont les groupes les plus abordés dans ce type d'étude.)

- LÉPIDOPTÈRES

L'inventaire des papillons de jour a été effectué par prospection "à vue" sur l'ensemble du site, avec si besoin, capture au filet pour identification. Les chenilles et les informations connexes qui s'y rapportent (plantes hôtes, cocons…) sont prises en compte dans l'inventaire. Le comportement des adultes en vol est également noté, lorsqu'il apporte une indication sur l'utilisation du site par l'espèce (parade nuptiale, accouplement, rassemblement…).

Lors des différents inventaires 9 espèces ont été observées. Le site contient un petit potentiel pour les lépidoptères. Sur le site 6 taxons sont très communs : *Aglais io* (Paon-du-jour)*, Pararge aegeria* (Tircis)*, Pieris brassicae* (Piéride du Chou), *Polyommatus icarus (*Azuré de la Bugrane), *Vanessa atalanta* (Vulcain), *Vanessa cardui* (Belle-dame).

Ces papillons vivent dans des milieux variés. Certains préfèrent les jardins, champs et prairies (Paon-du-jour, Piéride, Azuré, Belle-dame), d'autres les forêts et lisières (Tircis). Le Vulcain, lui, est très adaptable et peut se rencontrer un peu partout, souvent près des fleurs ou des fruits.

Les deux taxons communs sont : *Celastrina argiolus* (Azuré des Nerpruns) et *Polygonia c-album* (Robert-le-diable). L'Azuré des Nerpruns fréquente surtout les jardins, haies et lisières de forêts, près des arbustes comme le nerprun ou le houx. Le Robert-le-diable, lui, se rencontre dans les lisières, haies et friches, où poussent notamment les orties et autres plantes nourricières.

Un seul taxon est considéré comme assez-commun, il s'agit de *Melanargia galathea* (Demi-deuil). Le Demi-deuil fréquente les prairies fleuries et pelouses sèches ensoleillées.

Aucune espèce n'est protégée d'un point de vue nationale.

Nom scientifique (TaxRef 18.0)	Nom vernaculaire	Rareté Normandie (Simont, 2025)	LR Normandie
Aglais io (Linnaeus, 1758)	Paon-du-jour	TC	LC
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)	Azuré des Nerpruns	C	LC
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)	Demi-deuil	AC	LC
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)	Tircis	TC	LC
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)	Piéride du Chou	TC	LC
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)	Robert-le-diable	C	LC
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)	Azuré de la Bugrane	TC	LC
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)	Vulcain	TC	LC
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)	Belle-Dame	TC	LC

- **ODONATES**

Aucune espèce n'a été observée sur le site.

- ORTHOPTÈRES

L'inventaire des Orthoptères est basé sur l'observation directe des adultes, capturés au filet pour identification et à l'écoute des émissions sonores.

Sur le site deux taxons sont très communs : *Gomphocerippus biguttulus* (Criquet mélodieux) vit dans les prairies sèches et herbeuses, dans des zones ouvertes. Il évite les bois et les milieux humides. *Tettigonia viridissima* (Grande Sauterelle verte) se rencontre dans les prairies hautes, les haies et les arbustes. Elle préfère une végétation dense pour se cacher et chasser.



GOMPHOCERIPPUS BIGUTTULUS

Une espèce est considérée comme commune, il s'agit de *Conocephalus fuscus* (Conocéphale bigarré) qui vit dans les prairies sèches et les pelouses ensoleillées à végétation basse, et évite les bois et les zones humide



-HYMÉNOPTÈRE

Aucune espèce n'a été observée sur le site.

- **AMPHIBIENS ET REPTILES**


Aucune n'a été observée sur le site.

ING&NIERIE

PROJET D'AMÉNAGEMENT
SUR LA COMMUNE DE DIEPPE

Cartographie des prospections naturalistes pour les espèces de la faune

DEMATHIEU BARD IMMOBILIER



I.7. INVENTAIRE AVIFAUNE

- **Généralités**

Pendant, l'inventaire de l'Avifaune réalisé par le bureau d'études de VINCENT SIMONT, lors des différents passages sur le site 25 espèces ont été observée a plusieurs périodes : au printemps, en été et en automne. Concernant les passages les espèces ont été contactés en période de reproduction, de migration ou en simple transite.


➢ **Statut de richesse de spécifique**

La méthode utilisée pour ces prospections découle de celle des plans quadrillés qui consiste à localiser sur une carte l'ensemble des observations réalisées. L'observateur parcourt la zone d'étude sans contrainte temporelle, d'heure ou de trajet précis. Cette méthode itinérante permet à l'observateur expérimenté de localiser directement les données de terrain sur un plan.

Pour chaque espèce d'oiseaux, un indice de statut de rareté est indiqué :

La légende indique :

- ? = indéterminées,
- TC : très commun,
- C = commun,
- AC= assez-commun,
- PC= peu commun,
- AR= assez-rare,
- TR= Très-rare.



La Buse variable (rapace au plumage très variable), n'a pas été observée directement sur le site, mais sa présence à proximité est suggérée par des observations en dehors de celui-ci, ce qui correspond à son comportement plutôt discret et solitaire. Le Goéland argenté, oiseau marin opportuniste au plumage gris et blanc, a été observé en vol sur le site, indiquant que la zone peut être utilisée comme corridor ou zone de chasse. Enfin, un Faisan de Colchide, gallinacé terrestre au mâle au plumage coloré, a été trouvé mort sur le site avec ses plumes visibles, ce qui peut témoigner de la pression de prédation ou de l'activité humaine dans la zone. Ces trois taxons sont considérés comme peu-commun.

Quatre espèces vont être considérées comme assez commune, il s'agit de la Bergeronnette grise (*Motacilla alba Linnaeus*) et de la Chouette effraie (*Tyto alba*). La bergeronnette grise a été observée en train de crier et des pelotes de la Chouette effraie ont été retrouvées. L'espèce commune est la Mésange charbonnière (*Parus major*). La bergeronnette grise vit dans les jardins et près des eaux et mange des insectes. Le rougequeue noir habite les zones ouvertes et les villes et mange insectes et graines. Le pic vert vit dans les forêts et vergers et mange surtout des insectes. La chouette effraie fréquente les champs et granges et chasse la nuit les petits animaux.

Les autres espèces sont classées comme très communes : la Corneille noire (*Corvus corone*), le Pic épeiche (*Dendrocopos major),* le Pouillot véloce *(Phylloscopus collybita),* la Pie bavarde (*Pica pica*), le Troglodyte mignon (*Troglodytes troglodytes*).

D'après la liste rouge de Normandie Orientale, 24 espèces sont en sécurité, une espèce est classée en vulnérable (Goéland argenté). Une espèce est classée en danger dans la liste rouge des hivernants de Normandie (Pic épeiche).


Les espèces sont protégées nationalement hormis Pigeon ramier, Corneille noire, Faisan de Colchide, Pie bavarde, Tourterelle turque, Merle noir, Grive musicienne

ING&NIERIE

PROJET D'AMÉNAGEMENT
SUR LA COMMUNE DE DIEPPE

Cartographie des prospections naturalistes pour les espèces de l'avifaune en fonction de leur statut de rareté

DEMATHIEU BARD IMMOBILIER



- **Statut**

La méthode utilisée pour ces prospections découle de celle des plans quadrillés qui consiste à localiser sur une carte l'ensemble des observations réalisées. L'observateur parcourt la zone d'étude sans contrainte temporelle, d'heure ou de trajet précis. Cette méthode itinérante permet à l'observateur expérimenté de localiser directement les données de terrain sur un plan.

Pour chaque espèce d'oiseaux, un indice de reproduction est attribué :

- N : lorsqu'un indice probant de reproduction a été observé : jeunes, transport de matériaux pour le nid, *etc.* ;
- NP : Nicheur probable, lorsqu'aucun indice sûr de reproduction n'a été observé mais que l'espèce fréquente la zone d'étude pendant la période de reproduction par exemple, chante, *etc.* ;
- M : Migrateur ;
- NoN : Non nicheur, lorsque l'espèce utilise la zone d'étude pour se nourrir par exemple mais ne niche pas ;

- **Statut de migrateur (octobre 2024)**

Les espèces migratrices sur le site sont peu nombreuses. Elles ont été observées en période de vol ou posées.

En Normandie, la Bergeronnette grise et le Pouillot véloce effectuent une migration de courte distance, tandis que la Mésange charbonnière et le Troglodyte mignon sont sédentaires et restent sur place toute l'année. Il convient de nuancer la considération de ces espèces comme migratrices sur le site. Toutes ces espèces sont également des nicheuses potentielles.

➢ **Statut de reproduction sur le site**

- **Passage en début de période de nidification (nicheurs précoces sédentaires) (début mars)**

Lors du passage sur le site plusieurs taxons nicheurs-possibles ont été observés. La plupart des taxons ont été observés sur le site au niveau des zones arborées actuellement.

Sur le site, plusieurs espèces ont été entendues en chantant. La mésange bleue et la mésange charbonnière sont des nicheuses possibles dans les arbres du projet, utilisant des cavités naturelles ou des nichoirs. Le troglodyte mignon, également entendu en chantant, pourrait éventuellement nicher dans les buissons denses du coteau, nichant bas dans la végétation. Enfin, la grive musicienne pourrait également nicher dans les arbustes et petits arbres, son nid restant bien camouflé.

Concernant les statuts de rareté des taxons, ils sont communs et très communs pour ceux situés sur le site.

Toutes les espèces considérées comme nicheuses possibles sur le site ne sont pas menacées d'après la liste rouge.

- **Passage en période de nidification (mai-juillet)**

Lors du passage sur le site plusieurs taxons nicheurs-possibles ont été observés. La plupart des espèces nicheuses-possibles sont situés au niveau des espaces arborés, dans la friche ou niveau des bâtiments.

L'ensemble des espèces observées peut être considéré comme potentiellement nicheur sur le site. La majorité se concentre dans les zones arborées ou arbustives, ainsi que dans la friche, où la densité végétale offre des possibilités de nidification variées. Les strates boisées accueillent notamment le Pouillot véloce, la Fauvette à tête noire, la Mésange bleue, la Mésange charbonnière, le Troglodyte mignon, le Rougegorge familier, le Pinson des arbres, la Linotte mélodieuse et le Verdier d'Europe.

Les zones plus ouvertes ou en lisière sont exploitées par le Rougequeue noir, tandis que le Merle noir s'adapte indifféremment aux friches, haies ou lisières.

Enfin, les bâtiments et structures anthropiques constituent des supports favorables pour le Moineau domestique, la Pie bavarde et le Pigeon ramier. Parmi cette communauté, trois espèces se démarquent par leur forte fréquence relative (Merle noir, Moineau domestique, Mésange charbonnière), tandis que le Rougegorge familier apparaît comme la seule espèce classée "assez commune", traduisant une bonne représentativité des espèces généralistes typiques des milieux semi-naturels et urbanisés.

Les comportements relevés témoignent majoritairement d'activités de chant, avec de nombreux individus identifiés comme chanteurs, complétés par quelques individus posés, plusieurs émissions de cris, dont certains cris d'alarme, ainsi que quelques observations en vol.

Le site abrite une communauté d'oiseaux variée, majoritairement composée d'espèces généralistes adaptées aux milieux semi-naturels et urbanisés, avec des possibilités de nidification dans toutes les strates végétales et structures anthropiques.

Le tableau ci-dessous contient les espèces nicheuses potentielles sur le site :

Nom scientifique (TaxRef 17.0)	Nom vernaculaire	Statut reproduction Oiseaux	Rareté Normandie orientale (Simont, 2024)
Chloris chloris (Linnaeus, 1758)	Verdier d'Europe	NP	C
Columba palumbus Linnaeus, 1758	Pigeon ramier	NP	TC
Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)	Mésange bleue	NP	C
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)	Rougegorge familier	NP	TC
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758	Pinson des arbres	NP	TC
Linaria cannabina (Linnaeus, 1758)	Linotte mélodieuse	NP	TC
Motacilla alba Linnaeus, 1758	Bergeronnette grise	NP	AC
Parus major Linnaeus, 1758	Mésange charbonnière	NP	C
Passer domesticus (Linnaeus, 1758)	Moineau domestique	NP	TC
Phoenicurus ochruros (S.G. Gmelin, 1774)	Rougequeue noir	NP	AC
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)	Pouillot véloce	NP	TC
Pica pica (Linnaeus, 1758)	Pie bavarde	NP	TC
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)	Fauvette à tête noire	NP	TC
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)	Troglodyte mignon	NP	TC
Turdus merula Linnaeus, 1758	Merle noir	NP	TC
Turdus philomelos C.L. Brehm, 1831	Grive musicienne	NP	TC

➢ **Espèces protégées**

Le site va contenir des espèces protégées de l'avifaune. Dans cette section seront indiquées les espèces qui sont nicheuses, nicheuses possibles et migratrices. Quand des individus de la même espèce ont été observés en tant que nicheur et nicheur-possible, nous conservons le statut nicheur.

Lors des inventaires du naturaliste 25 individus ont été observés. En retirant les taxons non protégés, il reste 18 taxons protégés nationalement (NO3 Prot. oiseaux Art3). Toutefois dans le tableau nous présenterons uniquement les taxons qui ont été observés sur le site lors des différents inventaires. Le tableau contient 18 taxons protégés.

Le diagnostic a montré un léger enjeu au niveau de l'avifaune. Un enjeu moyen concerne les espèces protégées, puisqu'il n'y a pas d'espèces patrimoniales fortes. Les espèces protégées sont concentrées dans les secteurs arborés, la friche et quelques zones avec le bâti.

Toutes les espèces au niveau des statut de la liste rouge sont soit en préoccupation mineure et une espèce est vulnérable. La plupart des espèces ont un statut avec une préoccupation mineure.

Le tableau ci-dessous permet de connaître les espèces protégées :

Nom vernaculaire	Nom scientifique (Taxref 16.0)	Statut de reproduction	Statut de la liste rouge	Protection nationale (France métropolitaine)
Buteo buteo (Linnaeus, 1758)	Buse variable	NoN	LC	NO3 Oiseaux protégés : Article 3
Chloris chloris (Linnaeus, 1758)	Verdier d'Europe	NP	LC	NO3 Oiseaux protégés : Article 3
Cyanistes caeruleus	Mésange bleue	NP	LC	NO3 Oiseaux protégés : Article 3
Dendrocopos major	Pic épeiche	NoN	LC	NO3 Oiseaux protégés : Article 3
Erithacus rubecula (	Rougegorge familier	NP	LC	NO3 Oiseaux protégés : Article 3
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758	Pinson des arbres	NP	LC	NO3 Oiseaux protégés : Article 3
Hirundo rustica Linnaeus, 1758	Hirondelle rustique	NoN	LC	NO3 Oiseaux protégés : Article 3
Larus argentatus Pontoppidan, 1763	Goéland argenté	NoN	VU	NO3 Oiseaux protégés : Article 3
Linaria cannabina (Linnaeus, 1758)	Linotte mélodieuse	NP	LC	NO3 Oiseaux protégés : Article 3
Motacilla alba Linnaeus, 1758	Bergeronnette grise	NP	LC	NO3 Oiseaux protégés : Article 3
Parus major Linnaeus, 1758	Mésange charbonnière	NP	LC	NO3 Oiseaux protégés : Article 3
Passer domesticus (Linnaeus, 1758)	Moineau domestique	NP	LC	NO3 Oiseaux protégés : Article 3
Phoenicurus ochruros (S.G. Gmelin, 1774)	Rougequeue noir	NP	LC	NO3 Oiseaux protégés : Article 3
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)	Pouillot véloce	NP	LC	NO3 Oiseaux protégés : Article 3
Picus viridis Linnaeus, 1758	Pic vert	NoN	LC	NO3 Oiseaux protégés : Article 3
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)	Fauvette à tête noire	NP	LC	NO3 Oiseaux protégés : Article 3
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)	Troglodyte mignon	NP	LC	NO3 Oiseaux protégés : Article 3
Tyto alba (Scopoli, 1769)	Chouette effraie	NoN	LC	NO3 Oiseaux protégés : Article 3

➢ **Conclusion**

Le site abrite une avifaune variée, principalement composée d'espèces généralistes adaptées aux milieux semi-naturels et urbanisés. Plusieurs espèces sont nicheuses ou nicheuses potentielles, utilisant arbres, arbustes, friches et structures bâties. Parmi les 18 taxons protégés observés, la majorité présente une préoccupation mineure, avec une seule espèce vulnérable. L'enjeu global pour l'avifaune est léger à moyen, concentré sur les zones arborées, la friche et quelques structures.

- **Projet et avifaune**

La majorité des espèces observées se situe dans des habitats non directement impactés, mais certains taxons, y compris de l'avifaune protégée, ont été détectés dans les zones concernées par les aménagements. Il est donc essentiel que le projet prenne en compte la présence de ces espèces afin de limiter les perturbations et de maintenir la diversité biologique du site.

Pour réduire l'impact sur les oiseaux, plusieurs mesures peuvent être envisagées :

- Conserver au maximum les espaces verts, qui offrent des zones de nidification, d'alimentation et de refuges indispensables pour les espèces sédentaires, migratrices et protégées.
- Installer des nichoirs et abris artificiels, afin de compenser la perte éventuelle de cavités naturelles et de soutenir la reproduction des nicheurs, y compris les espèces protégées.
- Maintenir la végétation arbustive et les lisières, constituant des corridors écologiques favorables aux déplacements, à la protection et à l'alimentation des oiseaux.
- Limiter les perturbations durant la période de reproduction (mars à juillet), notamment les travaux bruyants ou la coupe de végétation, pour protéger les nids et les jeunes oiseaux.

Ces mesures permettront de préserver les fonctionnalités écologiques du site, de protéger l'avifaune protégée, de soutenir les populations d'oiseaux et de concilier les aménagements avec la conservation de la biodiversité locale.

I.8. ENJEUX

↳ **Habitats**

Entre 2024 et 2025, le site a connu **peu d'évolutions significatives**. Les différentes unités de végétation ont globalement conservé leur configuration, avec quelques changements ponctuels, comme la démolition d'un bâtiment et la fauche d'un secteur de friche. De nouvelles unités telles que la **grotte** et le **tunnel** ont été identifiées, mais elles n'ont pas profondément modifié la structure écologique globale du site.

La **sensibilité écologique du site** reste évaluée comme **très faible à moyenne**. Certains éléments présentent toutefois un **intérêt écologique spécifique** et nécessitent une attention particulière :

- **L'espace boisé**, offrant un couvert végétal structurant et un refuge pour de nombreuses espèces.
- **Le boisement calcicole**, habitat riche pour certaines espèces végétales et animales spécialisées.
- **La grotte**, qui constitue un abri naturel pour la faune locale, notamment pour les chauves-souris et d'autres espèces cavernicoles. Pour faciliter sa protection tout en permettant l'accès à la faune, **une porte avec des barreaux peut être installée**, laissant passer les animaux tout en sécurisant l'ouvrage.

La **préservation de ces éléments** est recommandée. Ils représentent des **îlots de quiétude** et des **espaces favorables à la biodiversité**, contribuant à la **qualité écologique du milieu urbain**. Leur maintien permet de soutenir les populations d'espèces locales et de renforcer les **continuités écologiques** et la **connectivité entre habitats**.

En résumé, bien que le site ayant peu changé entre 2024 et 2025, les unités boisées et la grotte présentent des **enjeux écologiques moyens**. Leur conservation contribue à maintenir la biodiversité et à soutenir la qualité environnementale dans un contexte urbain.

↳ **Flore**

Le site présente une faible diversité spécifique avec une mosaïque d'habitats peu variés. Les taxons patrimoniaux sont rares et sans statut de protection majeur, et certaines espèces peuvent être des échappées de jardin. La gestion du site devra prioritairement cibler le contrôle des espèces invasives, notamment *Buddleja davidii, Prunus laurocerasus, et Senecio inaequidens,* ainsi que surveiller le comportement invasif du *Cotoneaster horizontalis et de la Vigne-vierge commune.*

↳ **Faune**

- Avifaune : Certaines zones du projet accueillent des taxons d'avifaune protégée, bien que la majorité des espèces se trouve dans des habitats non impactés. Il est donc essentiel de préserver les espaces verts, maintenir la végétation, installer des nichoirs et limiter les perturbations pendant la période de reproduction, afin de protéger spécifiquement ces espèces protégées et de préserver la biodiversité locale.
- Mammifères : Sur le site, un mammifère domestique (Felis catus, chat haret) a été observé, tandis que des cervidés ont également été signalés lors des passages de 2024 par les associations. Aucune espèce n'a été observée sur le site. Toutefois des cervidés ont été observés par les membres des associations présentes sur le site. L'enjeu est faible.
- Invertébrés :
  - Lépidoptères : Sur le site, 9 espèces de papillons ont été observées, principalement très communes, fréquentant jardins, prairies, lisières et friches, avec un petit potentiel global pour les lépidoptères. L'enjeu est faible.
  - Odonates : Aucune espèce n'a été observée sur le site. L'enjeu est faible.
  - Orthoptères : Deux espèces ont été observées et sont très communes. L'enjeu est faible.
  - Hyménoptères : Aucun n'est présent sur le site, l'enjeu est faible.
  - Amphibiens et reptiles : Aucun n'est présent sur le site et l'enjeu est faible sur la parcelle.

Le tableau ci-dessous permet de visualiser les enjeux d'un point de vue faunistique et floristique :


GROUPES	NOMBRES	ENJEUX
HABITATS	7	Modéré
FLORE	150	Faible
AVIFAUNE	25	Modéré
MAMMIFÈRES	1	Faible
LÉPIDOPTÈRES	9	Faible
ORTHOPTÈRES	2	Faible
ODONATES	0	Faible
HYMÉNOPTÈRES	0	Faible
AMPHIBIENS ET REPTILES	0	Faible

ING&NIERIE

PROJET D'AMÉNAGEMENT
SUR LA COMMUNE DE DIEPPE

Cartographie du projet avec la sensibilité des habitats

DEMATHIEU BARD IMMOBILIER





ANNEXES

- **La liste des taxons,**
- **Photographie du site.**

Groupe taxonomique	Nom scientifique (TaxRef 18.0)	Nom vernaculaire	Rareté Normandie (Simont, 2025)	LR Normandie	Protection nationale (France métropolitaine)
Lépidoptères (Lepidoptera)	Aglais io (Linnaeus, 1758)	Paon-du-jour	TC	LC	
Lépidoptères (Lepidoptera)	Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)	Azuré des Nerpruns	C	LC	
Lépidoptères (Lepidoptera)	Melanargia galathea (Linnaeus, 1758	Demi-deuil	AC	LC	
Lépidoptères (Lepidoptera)	Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)	Tircis	TC	LC	
Lépidoptères (Lepidoptera)	Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)	Piéride du Chou	TC	LC	
Lépidoptères (Lepidoptera)	Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)	Robert-le-diable	C	LC	
Lépidoptères (Lepidoptera)	Polyommatus icarus (Rottemburg, 17	Azuré de la Bugrane	TC	LC	
Lépidoptères (Lepidoptera)	Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)	Vulcain	TC	LC	
Lépidoptères (Lepidoptera)	Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)	Belle-Dame	TC	LC	
Mammifères (Mammalia)	Felis catus Linnaeus, 1758	Chat haret	N	NA	
Orthoptères (Orthoptera)	Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 17	Criquet mélodieux	TC	LC	
Orthoptères (Orthoptera)	Conocephalus fuscus (Fabricius, 179	Conocéphale bigarré	C	LC	
Orthoptères (Orthoptera)	Gomphocerippus biguttulus (Linnaeu	Criquet mélodieux	TC	LC	
Orthoptères (Orthoptera)	Tettigonia viridissima (Linnaeus, 175	Grande Sauterelle verte	TC	LC	

Date	Nom scientifique (TaxRef 18.0)	Nom vernaculaire	Statut reproduction sur le site	Commentaire	Rareté Normandie orientale (Simont, 2025)	Liste Rouge Normandie (GONm, 2024)	LR Migr Norm (GONm, 2016)	LR Hiv Norm (GONm, 2016)	Protection nationale (France métropolitaine)	Latitude	Longitude
03/03/2025	Buteo buteo (Linnaeus, 1758)	Buse variable	NoN	1 ind. en vol hors site	PC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,91673	1,101298
06/05/2025	Buteo buteo (Linnaeus, 1758)	Buse variable	NoN	1 en vol	PC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,9180873	1,097943
06/05/2025	Chloris chloris (Linnaeus, 1758)	Verdier d'Europe	NP	un chanteur	C	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,9187453	1,0967777
03/03/2025	Columba palumbus Linnaeus, 1758	Pigeon ramier	NoN	1 ind. posé	TC	LC	-	-		49,916156	1,098933
03/03/2025	Columba palumbus Linnaeus, 1758	Pigeon ramier	NoN	2 ind. s'envolent	TC	LC	-	-		49,916591	1,099587
03/03/2025	Columba palumbus Linnaeus, 1758	Pigeon ramier	NoN	1 ind. en vol vers boisem	TC	LC	-	-		49,91774	1,097606
03/03/2025	Columba palumbus Linnaeus, 1758	Pigeon ramier	NoN	1 ind. mort (plumée)	TC	LC	-	-		49,917725	1,098022
03/03/2025	Columba palumbus Linnaeus, 1758	Pigeon ramier	NoN	2 ind. posés	TC	LC	-	-		49,918937	1,097553
03/03/2025	Columba palumbus Linnaeus, 1758	Pigeon ramier	NoN	1 ind. en vol	TC	LC	-	-		49,918483	1,096721
06/05/2025	Columba palumbus Linnaeus, 1758	Pigeon ramier	NP	2 posés	TC	LC	-	-		49,9170039	1,0978518
03/10/2024	Corvus corone Linnaeus, 1758	Corneille noire	NoN	une en vol	TC	LC	-	-		49,9153091	1,0995179
03/03/2025	Corvus corone Linnaeus, 1758	Corneille noire	NoN	3 ind. en vol	TC	LC	-	-		49,915921	1,098773
02/10/2024	Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)	Mésange bleue	NoN		C	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,9174841	1,0982544
03/03/2025	Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)	Mésange bleue	NP	1 ind. chanteur	C	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,915872	1,098638
03/03/2025	Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)	Mésange bleue	NoN	4 ind. posés	C	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,916039	1,099282
03/03/2025	Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)	Mésange bleue	NP	1 ind. chanteur	C	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,916848	1,09811
03/03/2025	Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)	Mésange bleue	NP	1 ind. chanteur	C	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,916183	1,09928
03/03/2025	Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)	Mésange bleue	NP	1 ind. chanteur	C	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,917108	1,098399
06/05/2025	Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)	Mésange bleue	NP	cris	C	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,9184025	1,0967653
02/10/2024	Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)	Pic épeiche	NoN	en vol	TC	LC	-	EN	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,9173752	1,0982032
03/10/2024	Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)	Pic épeiche	NoN	un cri	TC	LC	-	EN	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,9158221	1,1002691
03/03/2025	Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)	Rougegorge familier	NP	1 ind. chanteur	TC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,915384	1,099213
03/03/2025	Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)	Rougegorge familier	NP	1 ind. chanteur	TC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,916826	1,099131
03/03/2025	Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)	Rougegorge familier	NP	1 ind. chanteur	TC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,916689	1,097906
03/03/2025	Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)	Rougegorge familier	NoN	1 ind. posé	TC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,915319	1,099251
03/03/2025	Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)	Rougegorge familier	NP	1 ind. chanteur	TC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,917543	1,098224
03/03/2025	Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)	Rougegorge familier	NP	1 ind. chanteur	TC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,918416	1,096731
06/05/2025	Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)	Rougegorge familier	NP	un chanteur	TC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,9170039	1,0978518
06/05/2025	Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)	Rougegorge familier	NP	un chanteur	TC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,9180111	1,0982358
06/05/2025	Fringilla coelebs Linnaeus, 1758	Pinson des arbres	NP	un chanteur	TC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,9185929	1,0965772
06/05/2025	Hirundo rustica Linnaeus, 1758	Hirondelle rustique	NoN	en chasse	C	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,9182852	1,0967037
03/03/2025	Larus argentatus Pontoppidan, 1763	Goéland argenté	NoN	Par petits groupes en vo	PC	VU	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,915915	1,098933
06/05/2025	Larus argentatus Pontoppidan, 1763	Goéland argenté	NoN	en vol	PC	VU	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,918105	1,0979509
06/05/2025	Linaria cannabina (Linnaeus, 1758)	Linotte mélodieuse	NP	en vol	TC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,9182245	1,0968132
03/10/2024	Motacilla alba Linnaeus, 1758	Bergeronnette grise	NP	un cri	AC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,9155522	1,099138
02/10/2024	Parus major Linnaeus, 1758	Mésange charbonnière	NP		C	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,9170814	1,098532
03/03/2025	Parus major Linnaeus, 1758	Mésange charbonnière	NP	1 ind. chanteur	C	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,915803	1,098735
03/03/2025	Parus major Linnaeus, 1758	Mésange charbonnière	NP	1 ind. chanteur	C	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,917536	1,09772
03/03/2025	Parus major Linnaeus, 1758	Mésange charbonnière	NP	1 ind. chanteur	C	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,917229	1,097965
06/05/2025	Parus major Linnaeus, 1758	Mésange charbonnière	NP	cris	C	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,9184266	1,0966369
04/07/2025	Passer domesticus (Linnaeus, 1758)	Moineau domestique	NP		TC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,9179853	1,0971334
03/03/2025	Phasianus colchicus Linnaeus, 1758	Faisan de Colchide	NoN	1 ind. mort (plumée)	PC	LC	-	-		49,917644	1,09768
06/05/2025	Phoenicurus ochruros (S.G. Gmelin, 1774)	Rougequeue noir	NP	un chanteur	AC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,9156107	1,0995498
02/10/2024	Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)	Pouillot véloce	NP	cris	TC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,9170346	1,098853
03/10/2024	Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)	Pouillot véloce	NP	un chanteur	TC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,9153572	1,0991418
03/03/2025	Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)	Pouillot véloce	NoN	1 ind. posé	TC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,91747	1,097493
03/03/2025	Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)	Pouillot véloce	NoN	1 ind. posé	TC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,918734	1,097636
06/05/2025	Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)	Pouillot véloce	NP	un chanteur	TC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,9170282	1,0976568
06/05/2025	Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)	Pouillot véloce	NP	un chanteur	TC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,9171856	1,0985497
06/05/2025	Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)	Pouillot véloce	NP	un chanteur	TC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,9186952	1,0968917
06/05/2025	Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)	Pouillot véloce	NP	un chanteur	TC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,9161258	1,0997999
06/05/2025	Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)	Pouillot véloce	NP	un chanteur	TC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,9165884	1,0992897
04/07/2025	Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)	Pouillot véloce	NP	un chanteur	TC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,9166748	1,0993808
03/10/2024	Pica pica (Linnaeus, 1758)	Pie bavarde	NoN	une en vol	TC	LC	-	-		49,9155569	1,1000458

03/03/2025	Pica pica (Linnaeus, 1758)	Pie bavarde	NoN	1 ind. posé	TC	LC	-	-	49,916145	1,098981
03/03/2025	Pica pica (Linnaeus, 1758)	Pie bavarde	NoN	7 ind. posés	TC	LC	-	-	49,915918	1,100399
04/07/2025	Pica pica (Linnaeus, 1758)	Pie bavarde	NP		TC	LC	-	-	49,9173574	1,0979604
03/03/2025	Picus viridis Linnaeus, 1758	Pic vert	NoN	1 ind. entendu hors site	AC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,91679	1,10003
03/03/2025	Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)	Tourterelle turque	NoN		TC	LC	-	-	49,9158123	1,0994609
06/05/2025	Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)	Fauvette à tête noire	NP	un chanteur	TC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,91677	1,0987384
06/05/2025	Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)	Fauvette à tête noire	NP	un chanteur	TC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,9175474	1,0974017
06/05/2025	Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)	Fauvette à tête noire	NP	un chanteur	TC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,9186317	1,0971935
04/07/2025	Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)	Fauvette à tête noire	NP	un chanteur	TC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,9172147	1,0975857
02/10/2024	Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)	Troglodyte mignon	NP		TC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,9177921	1,0980206
03/03/2025	Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)	Troglodyte mignon	NP	1 ind. chanteur	TC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,918639	1,096727
06/05/2025	Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)	Troglodyte mignon	NP	un chanteur	TC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,9185987	1,0974087
06/05/2025	Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)	Troglodyte mignon	NP	cris d'alarme	TC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,9184834	1,096702
03/03/2025	Turdus merula Linnaeus, 1758	Merle noir	NoN	1 ind. posé	TC	LC	-	-		49,915863	1,098741
03/03/2025	Turdus merula Linnaeus, 1758	Merle noir	NoN	2 ind. posés	TC	LC	-	-		49,916852	1,099001
03/03/2025	Turdus merula Linnaeus, 1758	Merle noir	NoN	1 ind. en vol	TC	LC	-	-		49,917155	1,09786
03/03/2025	Turdus merula Linnaeus, 1758	Merle noir	NoN	1 ind. posé	TC	LC	-	-		49,917761	1,098165
03/03/2025	Turdus merula Linnaeus, 1758	Merle noir	NP	1 ind. chanteur	TC	LC	-	-		49,918532	1,096877
03/03/2025	Turdus merula Linnaeus, 1758	Merle noir	NoN	1 ind. mort (plumée)	TC	LC	-	-		49,918646	1,096837
06/05/2025	Turdus merula Linnaeus, 1758	Merle noir	NP	un cri d'alarme	TC	LC	-	-		49,9174908	1,0984722
06/05/2025	Turdus merula Linnaeus, 1758	Merle noir	NP	1 posé	TC	LC	-	-		49,9153087	1,0993749
03/03/2025	Turdus philomelos C.L. Brehm, 1831	Grive musicienne	NP	1 ind. chanteur	TC	LC	-	-		49,918938	1,097427
03/10/2024	Tyto alba (Scopoli, 1769)	Chouette effraie	NoN	Pelotes	AC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,9156606	1,099767
06/05/2025	Tyto alba (Scopoli, 1769)	Chouette effraie	NoN	pelotes récentes	AC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3	49,9156711	1,0995478

Nom scientifique (TaxRef 18.0)	Nom vernaculaire	Rareté Normandie orientale	Liste Rouge Normandie (GONm, 2024)	LR Migr Norm (GONm, 2016)	LR Hiv Norm (GONm, 2016)	Protection nationale
Buteo buteo (Linnaeus, 1758)	Buse variable	PC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3
Chloris chloris (Linnaeus, 1758)	Verdier d'Europe	C	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3
Columba palumbus Linnaeus, 1758	Pigeon ramier	TC	LC	-	-	
Corvus corone Linnaeus, 1758	Corneille noire	TC	LC	-	-	
Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)	Mésange bleue	C	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)	Pic épeiche	TC	LC	-	EN	NO3 Oiseaux protégés : Article 3
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)	Rougegorge familier	TC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758	Pinson des arbres	TC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3
Hirundo rustica Linnaeus, 1758	Hirondelle rustique	C	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3
Larus argentatus Pontoppidan, 1763	Goéland argenté	PC	VU	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3
Linaria cannabina (Linnaeus, 1758)	Linotte mélodieuse	TC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3
Motacilla alba Linnaeus, 1758	Bergeronnette grise	AC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3
Parus major Linnaeus, 1758	Mésange charbonnière	C	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3
Passer domesticus (Linnaeus, 1758)	Moineau domestique	TC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3
Phasianus colchicus Linnaeus, 1758	Faisan de Colchide	PC	LC	-	-	
Phoenicurus ochruros (S.G. Gmelin, 1774)	Rougequeue noir	AC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)	Pouillot véloce	TC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3
Pica pica (Linnaeus, 1758)	Pie bavarde	TC	LC	-	-	
Picus viridis Linnaeus, 1758	Pic vert	AC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)	Tourterelle turque	TC	LC	-	-	
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)	Fauvette à tête noire	TC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)	Troglodyte mignon	TC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3
Turdus merula Linnaeus, 1758	Merle noir	TC	LC	-	-	
Turdus philomelos C.L. Brehm, 1831	Grive musicienne	TC	LC	-	-	
Tyto alba (Scopoli, 1769)	Chouette effraie	AC	LC	-	-	NO3 Oiseaux protégés : Article 3

Date	Nom scientifique (TaxRef 18.0)	Nom vernaculaire	Rareté Normandie orientale (CBNBl, 2023)	Patrimonialité Normandie orientale (CBNBl, 2023)	LR Normandie orientale (CBNBl, 2023)	Déterminant ZNIEFF	ZH	EEE Normandie orientale (CBNBl, 2023)	Protection régionale	Validité de l'identification
03/03/2025	Acer campestre L., 1753	Erable champêtre	CC	-	LC	-	-	-	-	
02/10/2024	Acer pseudoplatanus L., 1753	Érable sycomore	CC	-	LC	-	-	-	-	
02/10/2024	Achillea millefolium L., 1753	Achillée millefeuill	CC	-	LC	-	-	-	-	
03/10/2024	Agrimonia eupatoria L., 1753	Aigremoine	CC	-	LC	-	-	-	-	
02/10/2024	Agrostis stolonifera L., 1753	Agrostide stolonifè	CC	-	LC	-	X	-	-	
03/03/2025	Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913	Alliaire officinale	C	-	LC	-	-	-	-	
02/10/2024	Alopecurus pratensis L., 1753	Vulpin des prés	C	-	LC	-	-	-	-	
03/03/2025	Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934	Brome stérile	CC	-	LC	-	-	-	-	
03/03/2025	Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814	Cerfeuil des bois	CC	-	LC	-	-	-	-	
02/10/2024	Argentina anserina (L.) Rydb., 1899	Potentille ansérine	CC	-	LC	-	X	-	-	
02/10/2024	Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl,	Fromental élevé	CC	-	LC	-	-	-	-	
02/10/2024	Artemisia vulgaris L., 1753	Armoise commune	CC	-	LC	-	-	-	-	
03/03/2025	Arum maculatum L., 1753	Gouet tacheté	CC	-	LC	-	-	-	-	
02/10/2024	Asplenium scolopendrium L., 1753	Scolopendre	C	-	LC	-	-	-	-	
04/07/2025	Asplenium scolopendrium L., 1753	Scolopendre	C	-	LC	-	-	-	-	
02/10/2024	Bellis perennis L., 1753	Pâquerette	CC	-	LC	-	-	-	-	
02/10/2024	Betula pendula Roth, 1788	Bouleau verruqueı	CC	-	LC	-	-	-	-	
02/10/2024	Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817	Brachypode penné	C	-	LC	-	-	-	-	
03/10/2024	Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812	Brachypode des bc	CC	-	LC	-	-	-	-	
02/10/2024	Buddleja davidii Franch., 1887	Arbre aux papillon	C	-	NA	-	-	Avéré	-	
02/10/2024	Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788	Calamagrostide ép	AC	-	LC	-	-	-	-	
02/10/2024	Cardamine flexuosa With., 1796	Cardamine flexueı	C	-	LC	-	X	-	-	
03/03/2025	Cardamine hirsuta L., 1753	Cardamine hirsute	CC	-	LC	-	-	-	-	
03/10/2024	Castanea sativa Mill., 1768	Châtaignier	C	-	NA	-	-	-	-	
03/03/2025	Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953	Catapode raide	PC	-	LC	-	-	-	-	ı cours de validation
02/10/2024	Centaurea L., 1753 [nom. cons.]	Centaurée	P	-	-	-	-	-	-	
04/07/2025	Centaurea scabiosa L., 1753	Centaurée scabieu	AC	-	LC	-	-	-	-	
02/10/2024	Centaurium erythraea Rafn, 1800	Petite centaurée	C	-	LC	-	-	-	-	
02/10/2024	Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter &	Céraiste commun	CC	-	LC	-	-	-	-	
02/10/2024	Cirsium arvense (L.) Scop., 1772	Cirse des champs	CC	-	LC	-	-	-	-	
03/03/2025	Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838	Cirse commun	CC	-	LC	-	-	-	-	
02/10/2024	Clematis vitalba L., 1753	Clématite des haie	CC	-	LC	-	-	-	-	
02/10/2024	Clinopodium vulgare L., 1753	Clinopode commu	C	-	LC	-	-	-	-	
02/10/2024	Cornus sanguinea L., 1753	Cornouiller sangui	CC	-	LC	-	-	-	-	
03/03/2025	Corylus avellana L., 1753	Noisetier	CC	-	LC	-	-	-	-	
02/10/2024	Cotoneaster horizontalis Decne., 1879	Cotonéaster horizc	AR	-	NA	-	-	-	-	
02/10/2024	Crataegus monogyna Jacq., 1775	Aubépine à un styl	CC	-	LC	-	-	-	-	
02/10/2024	Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800	Cymbalaire des mu	C	-	NA	-	-	-	-	
02/10/2024	Dactylis glomerata L., 1753	Dactyle aggloméré	CC	-	LC	-	-	-	-	
03/10/2024	Daphne laureola L., 1753	Laurier des bois	AC	-	LC	-	-	-	-	
02/10/2024	Daucus carota L., 1753	Carotte sauvage	CC	-	LC	-	-	-	-	
02/10/2024	Dipsacus fullonum L., 1753	Cabaret des oiseau	C	-	LC	-	-	-	-	
03/03/2025	Draba verna L., 1753	Drave printanière	CC	-	LC	-	-	-	-	
02/10/2024	Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834	Fougère mâle	CC	-	LC	-	-	-	-	

02/10/2024	Echium vulgare L., 1753	Vipérine vulgaire	AC	-	LC	-	-	-	-
03/03/2025	Epilobium L., 1753	Epilobe	P	-	-	-	-	-	-
02/10/2024	Epilobium tetragonum L., 1753	Épilobe à quatre a	CC	-	LC	-	Xpp	-	-
02/10/2024	Erigeron canadensis L., 1753	Conyze du Canada	CC	-	NA	-	-	-	-
03/03/2025	Euonymus europaeus L., 1753	Fusain d'Europe	CC	-	LC	-	-	-	-
02/10/2024	Eupatorium cannabinum L., 1753	Eupatoire chanvrir	CC	-	LC	-	X	-	-
03/03/2025	Euphorbia characias L., 1753	Euphorbe characia	-	-	-	-	-	-	-
03/03/2025	Euphorbia peplus L., 1753	Euphorbe des jard	CC	-	LC	-	-	-	-
02/10/2024	Fagus sylvatica L., 1753	Hêtre	CC	-	LC	-	-	-	-
02/10/2024	Festuca rubra L., 1753	Fétuque rouge	CC	-	LC	-	Xpp	-	-
03/03/2025	Ficaria verna Huds., 1762	Ficaire	CC	-	LC	-	-	-	-
02/10/2024	Fragaria vesca L., 1753	Fraisier sauvage	C	-	LC	-	-	-	-
02/10/2024	Fraxinus excelsior L., 1753	Frêne commun	CC	-	LC	-	-	-	-
03/03/2025	Galium album Mill., 1768	Gaillet blanc	CC	-	LC	-	-	-	-
02/10/2024	Galium aparine L., 1753	Gaillet gratteron	CC	-	LC	-	-	-	-
04/07/2025	Galium mollugo L., 1753	Gaillet commun	-	-	-	-	-	-	-
03/03/2025	Geranium dissectum L., 1755	Géranium découpe	CC	-	LC	-	-	-	-
03/03/2025	Geranium molle L., 1753	Géranium à	CC	-	LC	-	-	-	-
03/03/2025	Geranium robertianum L., 1753	Herbe à Robert	CC	-	LC	-	-	-	-
03/03/2025	Geum urbanum L., 1753	Benoîte commune	CC	-	LC	-	-	-	-
02/10/2024	Glechoma hederacea L., 1753	Lierre terrestre	CC	-	LC	-	-	-	-
02/10/2024	Hedera helix L., 1753	Lierre grimpant	CC	-	LC	-	-	-	-
03/03/2025	Helleborus foetidus L., 1753	Ellébore fétide	AC	-	LC	-	-	-	-
02/10/2024	Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973	Picride fausse-vipé	C	-	LC	-	-	-	-
03/03/2025	Holcus lanatus L., 1753	Houlque laineuse	CC	-	LC	-	-	-	-
04/07/2025	Humulus lupulus L., 1753	Houblon	AC	-	LC	-	X	-	-
02/10/2024	Hypericum perforatum L., 1753	Millepertuis perfo	CC	-	LC	-	-	-	-
03/03/2025	Hypochaeris radicata L., 1753	Porcelle enracinée	CC	-	LC	-	-	-	-
02/10/2024	Ilex aquifolium L., 1753	Houx	CC	-	LC	-	-	-	-
03/03/2025	Iris foetidissima L., 1753	Iris fétide	PC	X	LC	X	-	-	-
02/10/2024	Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 18(	Séneçon à feuilles	AC	-	LC	-	-	-	-
02/10/2024	Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791	Séneçon jacobée	CC	-	LC	-	-	-	-
04/07/2025	Knautia arvensis (L.) Coult., 1828	Knautie des champ	C	-	LC	-	-	-	-
03/03/2025	Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791	Laitue des murailles	C	-	LC	-	-	-	-
02/10/2024	Lamium album L., 1753	Lamier blanc	CC	-	LC	-	-	-	-
03/03/2025	Lapsana communis L., 1753	Lampsane commu	CC	-	LC	-	-	-	-
03/10/2024	Lathyrus latifolius L., 1753	Pois vivace	AC	-	NA	-	-	-	-
03/03/2025	Leucanthemum ircutianum DC., 1838	Grande marguerite	CC	-	LC	-	-	-	-
02/10/2024	Ligustrum vulgare L., 1753	Troène commun	CC	-	LC	-	-	-	-
03/03/2025	Lolium perenne L., 1753	Ray-grass	CC	-	LC	-	-	-	-
02/10/2024	Lotus corniculatus L., 1753	Lotier corniculé	CC	-	LC	-	-	-	-
03/10/2024	Melilotus albus Medik., 1787	Mélilot blanc	AC	-	LC	-	-	-	-
03/03/2025	Mercurialis annua L., 1753	Mercuriale annuel	C	-	LC	-	-	-	-
03/03/2025	Muscari Mill., 1754	Muscari	P	-	-	-	-	-	- cours de validation
02/10/2024	Origanum vulgare L., 1753	Origan commun	C	-	LC	-	-	-	-
03/10/2024	Parietaria judaica L., 1756	Pariétaire des mur	AC	-	LC	-	-	-	-
03/10/2024	Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922	Vigne-vierge comn	PC	-	NA	-	-	Potentiel	-
02/10/2024	Pastinaca sativa L., 1753	Panais cultivé	AC	-	LC	-	-	-	-
03/03/2025	Petasites pyrenaicus (L.) G.López, 1986	Héliotrope d'hiver	RR	-	NA	-	X	-	-

02/10/2024 Picris hieracioides L., 1753	Picride fausse-épe	C	-	LC	-	-	-	-
02/10/2024 Pinus sylvestris L., 1753	Pin sylvestre	AC	-	NA	-	-	-	-
03/03/2025 Plantago coronopus L., 1753	Plantain corne-de-	AC	-	LC	-	-	-	-
04/07/2025 Plantago coronopus L., 1753	Plantain corne-de-	AC	-	LC	-	-	-	-
02/10/2024 Plantago lanceolata L., 1753	Plantain lancéolé	CC	-	LC	-	-	-	-
02/10/2024 Plantago major L., 1753	Plantain majeur	CC	-	LC	-	Xpp	-	-
03/03/2025 Poa trivialis L., 1753	Pâturin commun	CC	-	LC	-	-	-	-
03/10/2024 Polypodium vulgare L., 1753	Polypode vulgaire	AC	-	LC	-	-	-	-
02/10/2024 Populus L., 1753	Peuplier	P	-	-	-	-	-	-
03/03/2025 Primula vulgaris Huds., 1762	Primevère acaule	C	-	LC	-	-	-	-
02/10/2024 Prunella vulgaris L., 1753	Brunelle commune	CC	-	LC	-	-	-	-
04/07/2025 Prunella vulgaris L., 1753	Brunelle commune	CC	-	LC	-	-	-	-
03/10/2024 Prunus avium (L.) L., 1755	Merisier sauvage	CC	-	LC	-	-	-	-
03/10/2024 Prunus laurocerasus L., 1753	Laurier cerise	PC	-	NA	-	-	Avéré	-
02/10/2024 Prunus spinosa L., 1753	Prunellier	CC	-	LC	-	-	-	-
02/10/2024 Quercus robur L., 1753	Chêne pédonculé	CC	-	LC	-	-	-	-
03/03/2025 Ranunculus bulbosus L., 1753	Renoncule bulbeus	AC	-	LC	-	-	-	-
03/10/2024 Ranunculus repens L., 1753	Renoncule rampar	CC	-	LC	-	X	-	-
03/03/2025 Rosa arvensis Huds., 1762	Rosier des champs	C	-	LC	-	-	-	-
02/10/2024 Rosa canina L., 1753	Rosier des chiens	?	?	DD	-	-	-	-
03/03/2025 Rosa L., 1753 [nom. et typ. cons.]	Rosier	P	-	-	-	-		
02/10/2024 Rubus L., 1753 [nom. et typ. cons.]	Ronce	P	-	-	-	-	-	-
03/03/2025 Rumex acetosa L., 1753 [nom. et typ. cons.]	Grande oseille	CC	-	LC	-	-	-	-
03/03/2025 Rumex conglomeratus Murray, 1770	Patience agglomér	C	-	LC	-	X	-	-
03/10/2024 Rumex obtusifolius L., 1753	Patience à feuilles	CC	-	LC	-	-	-	-
03/03/2025 Sagina L., 1753	Sagine	P	-	-	-	-	-	-
02/10/2024 Salix atrocinerea Brot., 1804	Saule roux	AC	-	LC	-	X	-	-
02/10/2024 Salix caprea L., 1753	Saule marsault	CC	-	LC	-	-	-	-
03/10/2024 Sambucus nigra L., 1753	Sureau noir	CC	-	LC	-	-	-	-
03/10/2024 Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824 [no	Fétuque roseau	CC	-	LC	-	-	-	-
03/03/2025 Sedum acre L., 1753	Orpin âcre	C	-	LC	-	-	-	-
03/03/2025 Sedum album L., 1753	Orpin blanc	PC	X	LC	X	-	-	-
02/10/2024 Senecio inaequidens DC., 1838	Séneçon du Cap	PC	-	NA	-	-	Avéré	-
04/07/2025 Senecio inaequidens DC., 1838	Séneçon du Cap	PC	-	NA	-	-	Avéré	-
03/03/2025 Senecio vulgaris L., 1753	Séneçon commun	CC	-	LC	-	-	-	-
02/10/2024 Solanum dulcamara L., 1753	Morelle douce-am	CC	-	LC	-	X	-	-
03/03/2025 Sonchus asper (L.) Hill, 1769	Laiteron épineux	CC	-	LC	-	-	-	-
02/10/2024 Sonchus oleraceus L., 1753	Laiteron potager	CC	-	LC	-	-	-	-
04/07/2025 Sonchus oleraceus L., 1753	Laiteron potager	CC	-	LC	-	-	-	-
02/10/2024 Stachys sylvatica L., 1753	Épiaire des bois	CC	-	LC	-	-	-	-
03/03/2025 Stellaria media (L.) Vill., 1789	Mouron des oiseau	CC	-	LC	-	-	-	-
02/10/2024 Tanacetum vulgare L., 1753	Tanaisie commune	C	-	LC	-	-	-	-
02/10/2024 Taraxacum F.H.Wigg., 1780	Pissenlit	P	-	-	-	-	-	-
02/10/2024 Trifolium dubium Sibth., 1794	Trèfle douteux	C	-	LC	-	-	-	-
02/10/2024 Trifolium pratense L., 1753	Trèfle des prés	CC	-	LC	-	-	-	-
03/03/2025 Trifolium repens L., 1753	Trèfle rampant	CC	-	LC	-	-	-	-
02/10/2024 Tussilago farfara L., 1753	Tussilage	C	-	LC	-	-	-	-
02/10/2024 Ulmus L., 1753	Orme	P	-	-	-	-	-	-
02/10/2024 Urtica dioica L., 1753	Ortie dioïque	CC	-	LC	-	-	-	-

03/03/2025 Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821	Mâche potagère	C	X	LC	X	-	-	-
03/03/2025 Verbascum L., 1753	Molène	P	-	-	-	-	-	-
03/10/2024 Verbascum thapsus L., 1753	Molène bouillon-b	C	-	LC	-	-	-	-
03/10/2024 Verbena officinalis L., 1753	Verveine officinale	C	-	LC	-	-	-	-
03/03/2025 Veronica persica Poir., 1808	Véronique de Pers	CC	-	NA	-	-	-	-
03/03/2025 Vicia sativa L., 1753	Vesce cultivée	R?	-	NA	-	-	-	-
02/10/2024 Vinca L., 1753	Pervenche	P	-	-	-	-	-	-
03/03/2025 Vinca minor L., 1753	Petite pervenche	AC	-	LC	-	-	-	-
03/03/2025 Viola hirta L., 1753	Violette hérissée	C	-	LC	-	-	-	-


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


L., 1753_BonneNouvelle_Die


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_



_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


/elle_Dieppe_76_03-03-2024_


/elle_Dieppe_76_03-03-2024_


/elle_Dieppe_76_03-03-2024_


/elle_Dieppe_76_03-03-2024_


/elle_Dieppe_76_03-03-2024_


/elle_Dieppe_76_03-03-2024_


/elle_Dieppe_76_03-03-2024_


/elle_Dieppe_76_03-03-2024_


/elle_Dieppe_76_03-03-2024_



/elle_Dieppe_76_03-03-2024_


/elle_Dieppe_76_03-03-2024_


/elle_Dieppe_76_03-03-2024_


/elle_Dieppe_76_03-03-2024_



/elle_Dieppe_76_03-03-2024_


velle_Dieppe_76_03-03-2024_


velle_Dieppe_76_03-03-2024_


velle_Dieppe_76_03-03-2024_


velle_Dieppe_76_03-03-2024_


velle_Dieppe_76_03-03-2024_


velle_Dieppe_76_03-03-2024_



velle_Dieppe_76_03-03-2024_


velle_Dieppe_76_03-03-2024_


velle_Dieppe_76_03-03-2024_


velle_Dieppe_76_03-03-2024_



velle_Dieppe_76_03-03-2024_


velle_Dieppe_76_03-03-2024_


velle_Dieppe_76_03-03-2024_


velle_Dieppe_76_03-03-2024_


velle_Dieppe_76_03-03-2024_


velle_Dieppe_76_03-03-2024_



velle_Dieppe_76_03-03-2024_


velle_Dieppe_76_03-03-2024_


velle_Dieppe_76_03-03-2024_


velle_Dieppe_76_03-03-2024_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_



_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_



_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_


_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_

_BonneNouvelle_Dieppe(76)_