




CG de l'Oisans

Le Bourg-d'Oisans

Périmètre d'étude de Bassey

Projet de création d'un merlon

—

Site de Bassey

—

Diagnostic environnemental

—

2025



MAITRE D'OUVRAGE :
Agence RTM Alpes du Nord
Hôtel des administrations
9 quai Créqui
38026 GRENOBLE



REALISATION :
Expertise et rédaction : Théo Aurand, chef de projet
environnement - UP Etudes Isère
Crédits photographiques : ONF



Sommaire

I. Introduction.....	2
A. CONTEXTE ET OBJECTIF.....	2
B. LOCALISATION.....	2
II. Méthode	3
A. ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE	3
B. EXPERTISE DE TERRAIN	3
III. Resultats.....	3
A. ZONAGES REGLEMENTAIRES.....	3
B. AUTRES ZONAGES	5
C. FLORE	6
D. FAUNE	7
IV. Synthèse des enjeux	10
V. Annexes.....	11

I. Introduction

A. Contexte et objectif

Le service RTM est responsable de la composante protection de la Forêt Domaniale RTM des Grandes-Rousses. Cette FD RTM se trouve en amont direct de notre site d'étude, situé juste au-dessus du hameau de Bassey, et recoupant les territoires communaux essentiellement du Bourg d'Oisans, mais aussi de La Garde à la marge.

Il est prévu par la commune de Bourg d'Oisans, avec le soutien de l'Etat, de réaliser des travaux de protection contre les aléas rocheux et torrentiels en créant un merlon protégeant le hameau de Bassey.

En tant que maître d'œuvre, le service RTM a souhaité disposer d'une étude permettant de poser le contexte réglementaire lié à l'environnement, d'identifier, hiérarchiser et localiser les enjeux écologiques, afin d'adapter son cahier des charges pour la réalisation des travaux. Des conseils de gestion seront également formulés

B. Localisation

Le site d'étude (contour rouge ci-dessous) est donc situé entièrement en dehors de la FD (fond vert). Une zone tampon de quelques dizaines de mètres de part et d'autre de l'emprise du projet de merlon a été créée sous SIG et constitue la zone étudiée.




Figure 1 : Localisation du site d'étude de Bassey

II. Méthode

A. Analyse bibliographique

La première étape de ce travail a été de recenser toutes les données bibliographiques déjà existantes, nous avons dans un premier temps cherché les zonages réglementaires et d'inventaires concernant l'environnement existants sur le secteur dans un rayon proche autour du projet.

Dans un second temps, nous avons étudié les formulaires de données associés à ces zonages afin d'extraire les informations importantes pour le projet.

Dans un troisième temps, nous avons extrait les données biodiversité du secteur renseignées dans la base de données naturalistes de l'ONF (BDN), et la base de données publique Biodiv'AURA (plateforme régionale du SINP qui compile toutes les données naturalistes publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes).

Un premier aperçu concernant les espèces patrimoniales a donc pu être constitué

B. Expertise de terrain

L'étape de recherche bibliographique a été par la suite complétée par plusieurs passages d'un écologue sur le terrain afin d'expertiser la zone, confirmer les potentialités apportées par la bibliographie, et identifier de nouvelles espèces et problématiques.

Les passages terrain se sont organisés autour de 2 thèmes principaux :

La flore vasculaire : les prospections de terrain ont pris la forme d'un inventaire avec géolocalisation de chaque nouvelle espèce. Les espèces exotiques envahissantes et les espèces patrimoniales ont pour leur part été systématiquement géolocalisées.

La faune : le format limité de cette étude ne permettait pas de viser l'exhaustivité, mais toutes les espèces animales vues, entendues, ou dont des traces étaient identifiables ont systématiquement été géolocalisées.

III. Resultats

A. Zonages réglementaires

Le site d'étude se trouve intégralement inclus au sein du site Natura 2000 de la Plaine de l'Oisans.

Le projet est donc a minima soumis à une évaluation d'incidence Natura 2000 simplifiée.




Figure 2: Localisation du site au sein de la ZSC Natura 2000 de la Plaine de l'Oisans

Concernant la loi sur l'eau, le site coupe un ruisseau classé cours d'eau au sens de la police de l'eau. Si le projet est susceptible de toucher ce ruisseau, une déclaration loi sur l'eau sera a minima nécessaire.




Figure 3: Cours d'eau au sens de la police de l'eau à proximité du site

B. Autres zonages

Il existe de nombreux zonages renseignant sur l'importance de certains espaces vis-à-vis de l'environnement, même s'ils n'ont aucune portée réglementaire.

Le site n'est pas concerné par l'inventaire des zones humides, ni celui des pelouses sèches, ni par le réseau FRENE. Il n'est pas non plus compris dans une ZNIEFF de type 1.

On signalera tout de même la proximité du site avec les ZNIEFF de type 1 du Versant rocheux de Côte Alamèle au nord et celle du rocher de l'Armentier au sud-est (en vert foncé sur la carte ci-dessous).




Figure 4: ZNIEFF I et II associées au site d'étude

On peut également ajouter que le site est quasi-intégralement inclus dans la ZNIEFF de Type 2 des Adrets de la Romanche (ci-dessus en vert clair) ainsi que dans l'aire d'adhésion du Parc National des Ecrins (ci-dessous en vert kaki).




Figure 5 : Position du site au sein de l'aire d'adhésion du Parc National des Ecrins

Le site d'étude est compris dans un espace de perméabilité lié à la biodiversité forestière identifié dans le SRADDET, c'est-à-dire comme espace de déplacement perméable utilisé par la biodiversité liée à la trame verte.

L'inclusion du site dans la ZNIEFF de type 2 des Adrets de la Romanche est un argument de plus dans ce sens, les ZNIEFF de type 2 ayant pour fonction de signaler de grands ensembles naturels biologiquement riches et peu modifiés.

C. Flore

La flore du site est riche, typique des boisements de cet étage et de cette exposition, enrichie par la présence de milieux ouverts avec les zones d'interface qui en résultent. Une certaine influence thermique est également observable avec la présence d'espèces à affinités plus méridionales.

La flore est malgré tout très commune, aucune espèce patrimoniale n'a été contactée. On notera cependant la présence de 2 espèces invasives.

Un bilan rapide est proposé ci-dessous :

- Pas d'espèces protégées
- Pas d'espèces sur Liste rouge
- Pas d'espèces déterminantes ZNIEFF en zone biogéographique alpine de la région
- 2 espèces exotiques envahissantes

Les 2 espèces invasives repérées sont le Robinier faux-acacia (*Robinia pseudoacacia*) et le Buddléia de David (*Buddleja davidii*).

L'enjeu est surtout lié au risque de favoriser la dispersion de ces espèces au moment des travaux, notamment en exportant des matériaux. Ce procédé devra être évité dans la mesure du possible.




Figure 6 : Localisation de la flore exotique envahissante

D. Faune

Les données concernant la faune sont incomplètes mais l'extraction des bases de données accompagnées des passages terrain ont toutefois permis de dégager quelques enjeux.

Ainsi, des données sont disponibles pour les groupes suivants : avifaune, mammifères et lépidoptères.

Concernant les oiseaux, le statut de nicheur est inconnu, on ne parlera donc ici que de potentialités.

Concernant les mammifères, on peut supposer la présence d'autres espèces typiques des zones forestières comme le renard, le sanglier, le chevreuil et le cerf notamment.

Malgré les informations fragmentaires, on peut identifier dans ou à proximité directe du site 6 espèces animales protégées, dont une patrimoniale, le détail est résumé ci-dessous :

Lépidoptères :

- Pas d'espèces protégées
- Pas d'espèces sur Liste Rouge AURA
- Pas d'espèces déterminantes ZNIEFF en zone biogéographique alpine de la région

Mammifères :

- Pas d'espèces protégées
- Pas d'espèces sur Liste rouge
- Pas d'espèces déterminantes ZNIEFF en zone biogéographique alpine de la région

Avifaune :

- 6 espèces protégées au niveau national
- 1 espèce inscrite à l'Annexe I de la Directive Oiseaux
- Pas d'espèces sur Liste rouge
- 1 espèce déterminante de ZNIEFF pour la zone biogéographique alpine de la région

Tableau 1 : Faune patrimoniale du site

Nom scientifique	Nom français	DO1	PN	PR	LR Nat	LR Rég	ZNIEFF
Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)	Mésange bleue	Non	Oui		LC		Non
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)	Pic Epeiche	Non	Oui		LC		Non
Gyps fulvus (Hablizl, 1783)	Vautour fauve	Oui	Oui		LC		Oui
Lophophanes cristatus (Linnaeus, 1758)	Mésange huppée	Non	Oui		LC		Non
Phoenicurus ochruros (S.G. Gmelin, 1774)	Rougequeue noir	Non	Oui		LC		Non
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)	Troglodyte mignon	Non	Oui		LC		Non

Légende :

PN: Protection Nationale; Liste Rouge: LC: Préoccupation mineure; NT: Quasi-menacée; VU: Vulnérable; CR: En danger critique; DH2: Annexe 2 de la directive habitats faune flore; DO1: Annexe 1 de la directive oiseaux




Figure 7: Localisation de la faune patrimoniale

L'ensemble des espèces faunistiques protégées et patrimoniales du site sont des oiseaux. L'espèce la plus intéressante est le Vautour fauve (*Gyps fulvus*), cependant, il s'agit d'une espèce rupicole qui niche certainement dans les falaises bien en amont du site, cette espèce est donc seulement de passage mais ne niche pas sur le site.

Parmi les 5 autres espèces d'oiseaux protégées, aucune ne présente un intérêt patrimonial particulier, il s'agit d'espèces très communes.

La probabilité de nichage du Rougequeue noir sur le site est faible, il s'agit également d'une espèce plutôt liée aux falaises et milieux rocheux, cet oiseau niche donc certainement à proximité mais pas au sein du site.

Les 4 espèces restantes: Mésange bleue, Mésange huppée, Troglodyte mignon et Pic épeiche sont quant à elles typiquement forestières et nichent possiblement sur le site.

Pour l'ensemble de ces espèces d'oiseaux, il s'agit là d'espèces protégées, leur destruction directe ainsi que celle de leur habitat est donc strictement interdite.

Cependant, il s'agit d'espèces très mobiles, aucun nid n'a été repéré, et le projet de travaux étant relativement léger, il n'est pas de nature à compromettre la présence de ces espèces dans le secteur.

Enfin, bien que non protégé et sans intérêt patrimonial particulier, un terrier important à plusieurs entrées de Blaireau européen est présent sur le site. Sans parler d'une exigence réglementaire particulière, il serait bénéfique de ne pas détruire cet habitat dans la mesure du possible lors des travaux.



Figure 8 : Localisation du terrier de blaireau

IV. Synthèse des enjeux

De manière globale, l'enjeu relatif au site lui-même vis-à-vis de la préservation de la biodiversité locale est plutôt de conserver sa fonctionnalité écologique. Par sa qualité biologique, sa naturalité et sa faible artificialisation, le site fait partie d'un corridor écologique, qu'on peut aussi qualifier de trame permettant le déplacement de la faune mais également de la flore à une échelle de temps plus longue. Le projet de travaux n'est pas de nature à modifier de manière non négligeable cette fonction.

Quelques enjeux « espèces » plus ciblés méritent toutefois d'être cités :

- Pour l'avifaune principalement, les travaux devront impérativement être effectués en dehors des périodes critiques, soit entre octobre et février.
- Pour la flore, l'évitement des stations d'espèces exotiques envahissantes afin de prévenir leur dissémination accidentelle, notamment au moment des déplacements et de potentiels imports-exports de matériaux contaminés.
- Pour le Blaireau européen, le projet de travaux pourrait intégrer dans son cahier des charges de ne porter aucun impact sur le terrier présent sur le site.
- Ponctuellement, certains arbres bios peuvent être présents sur la zone. Si des abattages sont nécessaires au cours des travaux, il conviendra de prêter attention à ces dendromicrohabitats en évitant les arbres porteurs dans la mesure du possible.

Tableau 2 : Bilan des connaissances de la faune et de la flore du site

Groupes taxonomiques		Nombre d'espèces
Flore vasculaire	Ptéridophytes	3
	Spermaphytes	114
	Sous-total	117
Invertébrés	Lépidoptères	33
	Sous-total	33
Vertébrés	Mammifères	2
	Oiseaux	7
	Sous-total	9
Total		159

Enfin, il est nécessaire de remplir les obligations réglementaires liées au site Natura 2000.

Ce site est géré par la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'animatrice actuelle est Myriam Ribert (06 20 12 87 28 - myriam.ribert@auvergnerhonealpes.fr).

Suite au contact pris avec l'animatrice, le DOCOB confirme qu'il n'y a pas d'espèces patrimoniales connues sur l'emprise du site (note technique Natura 2000 en annexes). Cependant, un habitat d'intérêt communautaire est présent (6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires). L'impact sur cet habitat doit être signalé dans le formulaire d'évaluation d'incidences simplifié (fourni en pièce jointe à ce rapport).

Ce formulaire sera à remettre à Myriam Ribert, ainsi qu'à la DDT (Jean-Baptiste Butin - jean-baptiste.butin@isere.gouv.fr), qui confirmera si cette procédure est suffisante compte tenu des impacts sur les pelouses d'intérêt communautaire.

V. Annexes

Annexe 1 : Flore inventoriée sur le site

Taxon	Espèce	EEE	PN	PR	LR Nat	LR RA	ZNIEFF
Abies alba Mill., 1768	Sapin blanc, Sapin pectiné	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Acer campestre L., 1753	Érable champêtre, Acéraille	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Acer monspessulanum L., 1753	Érable de Montpellier, Agas, Azerou	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Acer opalus Mill., 1768	Érable à feuilles d'obier, Érable opale, Érable d'Italie	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Acer pseudoplatanus L., 1753	Érable sycomore, Grand Érable, Érable faux platane	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Achillea millefolium L., 1753	Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Achnatherum calamagrostis (L.) P.Beauv., 1812	Calamagrostide argentée, Stipe calamagrostide, Achnathère calamagrostide, Calamagrostis argenté	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Amelanchier ovalis Medik., 1793	Amélanchier ovale, Amélanchier commun, Amélanchier à feuilles ovales	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Aria edulis (Willd.) M.Roem., 1847	Alisier blanc, Alisier de Bourgogne, Alouchier, Sorbier des Alpes	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	Fromental élevé, Avoine élevée, Fromental, Fénasse, Ray-grass français	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Asperula cynanchica L., 1753	Aspérule à l'esquinancie, Herbe à l'esquinancie, Aspérule des sables	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Asplenium fontanum (L.) Bernh., 1799	Doradille des fontaines, Doradille de Haller, Doradille des sources	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Asplenium trichomanes L., 1753	Doradille des murailles, Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire rouge	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Astragalus monspessulanus L., 1753	Astragale de Montpellier, Esparcette bâtarde	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Berberis vulgaris L., 1753	Épine-vinette commune, Épine-vinette, Vinettier commun, Berbérís commun	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Betula pendula Roth, 1788	Bouleau pleureur, Bouleau verruqueux, Boulard	Non	Non	Non	LC	LC	Non

Taxon	Espèce	EEE	PN	PR	LR Nat	LR RA	ZNIEFF
Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762	Blackstonie perfoliée, Chlorette, Chlore perfoliée	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817	Brachypode rupestre, Brachypode des rochers	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812	Brachypode des forêts, Brachypode des bois, Brome des bois	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Briza media L., 1753	Brize intermédiaire, Amourette commune, Amourette	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869	Brome érigé, Brome dressé, Faux brome érigé, Faux brome dressé	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Buddleja davidii Franch., 1887	Buddleia de David, Buddleia du père David, Arbre-à-papillon, Arbre-aux-papillons	Oui	Non	Non	NAa		Non
Buphthalmum salicifolium L., 1753	Buphtalme à feuilles de saule, Buphtalme ½il-de-boeuf, ¼il-de-boeuf	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Bupleurum falcatum L., 1753	Buplèvre en faux, Buplèvre à feuilles en faux, Percefeuille	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Campanula rotundifolia L., 1753	Campanule à feuilles rondes	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Carex flacca Schreb., 1771	Laîche glauque	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Carlina vulgaris L., 1753	Carline commune, Chardon doré	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Castanea sativa Mill., 1768	Châtaignier cultivé, Châtaignier, Châtaignier commun	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Centaurea jacea L., 1753	Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 1888	Céphalanthère à feuilles longues, Céphalanthère à longues feuilles, Céphalanthère à feuilles en épée	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772	Cirse des champs, Chardon des champs, Calcide	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Clematis vitalba L., 1753	Clématite des haies, Clématite vigne blanche, Herbe aux gueux	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Cornus sanguinea L., 1753	Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Corylus avellana L., 1753	Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier	Non	Non	Non	LC	LC	Non

Taxon	Espèce	EEE	PN	PR	LR Nat	LR RA	ZNIEFF
Crataegus monogyna Jacq., 1775	Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Dactylis glomerata L., 1753	Dactyle aggloméré, Pied-de-poule	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, 1962	Dactylorhize de Fuchs, Orchis de Fuchs, Orchis tacheté des bois, Orchis de Meyer, Orchis des bois	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó, 1962	Dactylorhize sureau, Orchis sureau	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Daphne laureola L., 1753	Daphné lauréole, Laurier des bois	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Daucus carota L., 1753	Carotte sauvage, Carotte commune, Daucus carotte	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Digitalis lutea L., 1753	Digitale jaune	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Eupatorium cannabinum L., 1753	Eupatoire chanvrine, Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Euphorbia amygdaloides L., 1753	Euphorbe faux amandier, Euphorbe des bois, Herbe à la faux	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Euphorbia cyparissias L., 1753	Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux cyprès, Petite ésule	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Fagus sylvatica L., 1753	Hêtre des forêts, Hêtre, Fayard, Hêtre commun, Fouteau	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Fragaria vesca L., 1753	Fraisier sauvage, Fraisier des bois	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Frangula alnus Mill., 1768	Bourdaie, Bois noir, Frangule de Dodone, Bourdaie de Dodone, Bourdaie aulne, Bourgène	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Fraxinus excelsior L., 1753	Frêne élevé, Frêne commun, Frêne, Frêne d'Europe	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Galium album Mill., 1768	Gaillet blanc, Gaillet dressé	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Galium verum L., 1753	Gaillet vrai, Gaillet jaune, Caille-lait jaune	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Genista pilosa L., 1753	Genêt poilu, Genêt velu, Genette	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Globularia bisnagarica L., 1753	Globulaire ponctuée, Globulaire de Willkomm, Globulaire de Bisnagar	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Globularia nudicaulis L., 1753	Globulaire à tiges nues	Non	Non	Non	LC	LC	Non

Taxon	Espèce	EEE	PN	PR	LR Nat	LR RA	ZNIEFF
Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768	Hélianthème nummulaire, Hélianthème jaune, Hélianthème commun	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Helleborus foetidus L., 1753	Ellébore fétide, Pied-de-griffon	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Hippocrepis comosa L., 1753	Hippocrépide chevelue, Hippocrépide fer-à-cheval, Fer-à-cheval, Hippocrépide à toupet, Hippocrépide en ombelle, Hippocrépis chevelu	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989	Hippocrépide faux baguenaudier, Séné batard, Coronille faux séné, Hippocrépis faux baguenaudier	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Hypericum perforatum L., 1767	Millepertuis perforé, Millepertuis cilié	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Inula conyzae (Greiss.) DC., 1836	Inule conyze, Inule squarreuse, Herbe aux mouches, Inule commune, Herbe aux punaises	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Juglans regia L., 1753	Noyer royal, Noyer, Noyer anglais, Noyer commun	Non	Non	Non	NAa		Non
Juniperus communis L., 1753	Genévrier commun, Genièvre, Peteron	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Knautia arvensis (L.) Coult., 1828	Knautie des champs, Oreille-d'âne	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791	Laitue des murs, Mycélide des murs, Mycélis des murs, Pendrille	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Laserpitium gallicum L., 1753	Laserpitium de France, Laser de Gaule, Laser de France, Laser odorant	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Leontodon saxatilis Lam., 1779	Liondent des rochers, Liondent faux pissenlit, Thrincie, Liondent à tige nue	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Leucanthemum vulgare Lam., 1779	Marguerite commune	Non	Non	Non	DD	LC	Non
Ligustrum vulgare L., 1753	Troène commun, Troène, Raisin de chien	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Linum catharticum L., 1753	Lin purgatif	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Linum tenuifolium L., 1753	Lin à feuilles ténues, Lin à feuilles menues, Lin à petites feuilles	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Lonicera xylosteum L., 1753	Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies, Chèvrefeuille camérisier, Camérisier à balais	Non	Non	Non	LC	LC	Non

Taxon	Espèce	EEE	PN	PR	LR Nat	LR RA	ZNIEFF
Lotus corniculatus L., 1753	Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Melampyrum cataunicum Freyn, 1884	Mélampyre de Catalogne, Mélampyre du Pays de Vaud	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Melilotus albus Medik., 1787	Mélilot blanc	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842	Muscari négligé, Muscari à grappes, Muscari négligé	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817	Néottie nid-d'oiseau, Herbe aux vers	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh., 1837	Néottie ovale, Grande Listère, Double-feuille, Listère à feuilles ovales, Listère ovale	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Onobrychis viciifolia Scop., 1772	Sainfoin à feuilles de vesce, Sainfoin, Esparcette, Sainfoin cultivé, Esparcette cultivée	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Ononis natrix L., 1753	Bugrane gluante, Bugrane jaune, Bugrane fétide, Coquesigrue	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Ononis rotundifolia L., 1753	Bugrane à feuilles rondes, Bugrane à grandes fleurs	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Origanum majorana L., 1753	Origan marjolaine, Marjolaine, Origan des jardins	Non	Non	Non	NAa		Non
Origanum vulgare L., 1753	Origan commun, Marjolaine sauvage	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Picea abies (L.) H.Karst., 1881	Épicéa commun, Sérente	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Pinus sylvestris L., 1753	Pin sylvestre	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Plantago lanceolata L., 1753	Plantain lancéolé, Petit plantain, Herbe Caroline, Ti-plantain	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Plantago major L., 1753	Plantain élevé, Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817	Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Poa nemoralis L., 1753	Pâturin des bois, Pâturin des forêts	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Polygala comosa Schkuhr, 1796	Polygale chevelu, Polygale chevelu, Polygale à toupet	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Polygaloides chamaebuxus (L.) O.Schwarz, 1949	Faux polygale petit buis, Polygale petit buis, Faux Buis	Non	Non	Non	LC	LC	Non

Taxon	Espèce	EEE	PN	PR	LR Nat	LR RA	ZNIEFF
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 1906	Sceau-de-Salomon odorant, Polygonate officinal, Sceau-de-Salomon officinal	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Polypodium vulgare L., 1753	Polypode commun, Réglisse des bois, Polypode vulgaire	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Populus nigra L., 1753	Peuplier noir, Peuplier commun noir	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Populus tremula L., 1753	Peuplier tremble, Tremble	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856	Potentille stérile, Potentille faux fraisier	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Poterium sanguisorba L., 1753	Potérium sanguisorbe, Pimprenelle à fruits réticulés, Petite sanguisorbe, Petite pimprenelle, Sanguisorbe mineure	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Prunus avium (L.) L., 1755	Prunier merisier, Cerisier	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Quercus petraea (Matt.) Liebl., 1784	Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Quercus pubescens Willd., 1796	Chêne pubescent, chêne humble	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Rhamnus cathartica L., 1753	Nerprun purgatif	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Ribes alpinum L., 1753	Groseillier des Alpes	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Robinia pseudoacacia L., 1753	Robinier faux-acacia, Acacia blanc, Robinier, Robinier faux acacia	Oui	Non	Non	NAa		Non
Rumex acetosa L., 1753	Patience oseille, Oseille des prés, Rumex oseille, Grande oseille, Oseille commune, Surelle	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Salix purpurea L., 1753	Saule pourpre, Osier rouge, Osier pourpre	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Salvia pratensis L., 1753	Sauge des prés, Sauge commune	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Scabiosa columbaria L., 1753	Scabieuse colombarie, ¼il-de-perdrix	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Serratula tinctoria L., 1753	Serratule des teinturiers, Sarrette	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869	Silène commun, Silène enflé, Tapotte	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Sorbus aucuparia L., 1753	Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage, Sorbier des oiseaux	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Stachys recta L., 1767	Épiaire droit	Non	Non	Non	LC	LC	Non
Teucrium montanum L., 1753	Germandrée des montagnes	Non	Non	Non	LC	LC	Non

Taxon	Espèce	EEE	PN	PR	LR Nat	LR RA	ZNIEFF
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771	Tilleul à grandes feuilles, Tilleul à feuilles larges, Tilleul à larges feuilles	Non	Non	Non	LC	LC	Non
<i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753	Salsifis des prés	Non	Non	Non	LC	LC	Non
<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés, Trèfle violet	Non	Non	Non	LC	LC	Non
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	Trisetum jaunissant, Trisetum commun, Avoine dorée, Avoine jaunâtre, Trisetum jaunâtre	Non	Non	Non	LC	LC	Non
<i>Tussilago farfara</i> L., 1753	Tussilage pas-d'âne, Tussilage, Pas-d'âne, Herbe de Saint-Quirin	Non	Non	Non	LC	LC	Non
<i>Verbascum nigrum</i> L., 1753	Molène noire, Cierge maudit	Non	Non	Non	LC	LC	Non
<i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau, 1857	Violette de Reichenbach, Violette des bois	Non	Non	Non	LC	LC	Non

Annexe 2 : Lépidoptères inventoriés sur le site

Nom scientifique	Nom français	PN	PR	LR Nat	LR Rég	ZNIEFF
<i>Acasis viretata</i> (Hubner, 1799)	Lobophore verdatre	Non	Non			Non
<i>Acronicta megacephala</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Noctuelle megacephale	Non	Non			Non
<i>Anania hortulata</i> (Linnaeus, 1758)	Botys de l'ortie	Non	Non			Non
<i>Aplocera plagiata</i> (Linnaeus, 1758)	Triple Raie (La), Rayure commune (La)	Non	Non			Non
<i>Calliteara pudibunda</i> (Linnaeus, 1758)	Pudibonde (La), Patte-Etendue (La)	Non	Non			Non
<i>Charissa ambiguata</i> (Duponchel, 1830)	Gnophos ambiguë (La), Gnophos incertaine (La)	Non	Non			Non
<i>Chiasmia clathrata</i> (Linnaeus, 1758)	Réseau (Le), Géomètre à barreaux (La)	Non	Non			Non
<i>Cleora cinctaria</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Boarmie ceinte (La)	Non	Non			Non
<i>Cyclophora annularia</i> (Fabricius, 1775)	Ephyre omicron (L'), Phalène mariée (La)	Non	Non			Non
<i>Deltote pygarga</i> (Hufnagel, 1766)	Albule (L')	Non	Non			Non
<i>Dendrolimus pini</i> (Linnaeus, 1758)	Bombyx du Pin (Le)	Non	Non			Non
<i>Drepana falcatoria</i> (Linnaeus, 1758)	Faucille (La)	Non	Non			Non
<i>Egira conspicillaris</i> (Linnaeus, 1758)	Conspicillaire (La)	Non	Non			Non
<i>Epirrhoe rivata</i> (Hubner, 1813)	Mélanippe claire (La)	Non	Non			Non
<i>Horisme tersata</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Horisme élégant	Non	Non			Non
<i>Horisme vitalbata</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Horisme rayé (L')	Non	Non			Non
<i>Hyloicus pinastri</i> (Linnaeus, 1758)	Sphinx du Pin (Le)	Non	Non			Non

Nom scientifique	Nom français	PN	PR	LR Nat	LR Rég	ZNIEFF
Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763)	Boarmie pointillée (La)	Non	Non			Non
Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766)	Noctuelle du Genêt (La)	Non	Non			Non
Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)	Bordure entrecoupée (La), Marginée (La)	Non	Non			Non
Macaria liturata (Clerck, 1759)	Philobie effacée (La)	Non	Non			Non
Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758)	Phalène de la Ronce (La), Blanchâtre (La)	Non	Non			Non
Mythimna sicula (Treitschke, 1835)	Leucanie sicilienne (La)	Non	Non			Non
Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761)	Double-Ligne (La), Bipoint (Le)	Non	Non			Non
Pheosia tremula (Clerck, 1759)	Porcelaine (La)	Non	Non			Non
Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767)	Phalène linéolée (La), Numérie ligneuse (La)	Non	Non			Non
Pterostoma palpina (Clerck, 1759)	Museau (Le)	Non	Non			Non
Rheumaptera cervinalis (Scopoli, 1763)	Phalène couleur de cerf (La)	Non	Non			Non
Scopula umbelaria (Hubner, 1813)	Acidalie des ombelles (L')	Non	Non			Non
Selenia lunularia (Hubner, 1788)	Ennomos lunaire (L') , Croissant (Le)	Non	Non			Non
Tethea or (Denis & Schiffermuller, 1775)	Or (L'), Double-Bande brune (La)	Non	Non			Non
Thera variata (Denis & Schiffermuller, 1775)	Corythée variée (La)	Non	Non			Non
Wittia sororcula (Hufnagel, 1766)	Manteau jaune (Le)	Non	Non			Non

Annexe 3 : Avifaune inventoriée sur le site

Nom scientifique	Nom français	DO1	PN	PR	LR Nat	LR Rég	ZNIEFF
Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)	Mésange bleue	Non	Oui		LC		Non
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)	Pic Epeiche	Non	Oui		LC		Non
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)	Geai des chênes	Non	Non		LC		Non
Gyps fulvus (Hablizl, 1783)	Vautour fauve	Oui	Oui		LC		Oui
Lophophanes cristatus (Linnaeus, 1758)	Mésange huppée	Non	Oui		LC		Non
Phoenicurus ochruros (S.G. Gmelin, 1774)	Rougequeue noir	Non	Oui		LC		Non
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)	Troglodyte mignon	Non	Oui		LC		Non

Annexe 4 : Mammifères inventoriés sur le site

Nom scientifique	Nom français	PN	PR	LR Nat	LR Rég	ZNIEFF
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)	Chevreuil européen	Non	Non	LC		Non
Meles meles (Linnaeus, 1758)	Blaireau européen	Non	Non	LC		Non


Annexe 5 : Note technique Natura 2000



NOTE TECHNIQUE NATURA 2000

Objet : Porter à connaissance Natura 2000 – Merlon de protection Hameau de Bassey
Territoire communal concerné : Le Bourg d'Oisans
Date : 19/08/2025
Visite de terrain : non
Site Natura 2000 : Plaine de Bourg d'Oisans et ses versants (FR8201738)
The map is a topographic representation of the Bourg d'Oisans area. A legend in the top-left corner, titled 'Localisation du projet', shows a grey rectangle representing the 'Périmètre Vallée Bourg d'Oisans'. A red circle on the map, labeled 'Secteur concerné par le projet', indicates the specific area of interest. The map includes contour lines, roads, and a scale bar in the bottom-right corner marked 0, 1, and 2 km.

Habitats d'intérêt communautaire susceptibles d'être affectés par le projet (données issues du DOCOB du site) :



Habitats	Code Natura 2000	Répartition dans le site	Ecologie	Menaces globales
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires	6210*	Répondues sur le site Natura 2000 (475 ha soit 14% de la superficie du site Natura 2000). Les stations principales se trouvent sur les communes de La Garde et Auris.	Ces pelouses sont installées sur des terrains bien ensoleillés, et sur des sols présentant une réserve utile en eau moyenne à faible. Mauvais état de conservation	• Abandon du pâturage • Intensification (apport d'engrais, chargement élevé) qui modifie la flore • Plantation forestière • Aménagements
Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles	8130	Peu répandus sur le site Natura 2000 (115 ha)	Ces éboulis instables sont composés d'éléments fins à grossiers et occupent de préférence les pentes raides bien exposées. Ils accueillent une végétation parfois fournie, dont le recouvrement peut dépasser 40 %. Bon état de conservation	• Aménagements (construction de routes, de carrières, sécurisation par dispositifs pare-blocs) • Création de sentiers pédestres en travers des éboulis (piétinement, ravinement)

Espèces d'intérêt communautaire susceptibles d'être affectés par le projet (données issues du DOCOB du site) :

La plateforme Biodiv'AURA ne mentionne aucune espèce d'intérêt communautaire sur le secteur concerné par les travaux. Durant les travaux, la présence des intervenants de chantier et des engins engendre des bruits, des mouvements et de la poussière qui peuvent être préjudiciables à la faune, notamment aux espèces les plus sensibles au dérangement (chiroptères et oiseaux nicheurs notamment). Le risque est de voir ces espèces quitter les abords du chantier, et donc d'assister à un appauvrissement temporaire de la biodiversité dans le périmètre des travaux et ses environs immédiats.

Synthèse

- Un habitat d'intérêt communautaire est présent sur le secteur du projet
- La réalisation de travaux durant la période sensible (avril à septembre) pour les espèces se trouvant à proximité du site est susceptible d'entraîner des perturbations sur la faune sauvage.
- La présence d'engins de chantier peut générer diverses pressions sur les habitats naturels : émissions de poussières, risques de pollution, ou encore dispersion accidentelle d'espèces exotiques envahissantes via le matériel utilisé.



Office National des Forêts

Agence Etude Auvergne Rhône-Alpes
UP Etudes Isère
9 quai créqui
38000 Grenoble