

Projet photovoltaïque sur la commune de Lacrouzette (81) : résultats et analyse des inventaires faune et flore du 20 avril 2026

v1. 29 mai 2026, pour SEML Énergie Commune 81



Pierre-Olivier Cochard, consultant naturaliste, Entreprise Individuelle
113 grande rue Saint-Michel, 31400 Toulouse
pierre-olivier.cochard@posteo.net ; 06 37 275 474
Siren 511 207 441

Sommaire

Nature du projet.....	2
Déroulement de l'inventaire.....	3
Résultats flore et habitats.....	3
Dans la zone du projet.....	3
Sur la future zone d'accès située à l'Est.....	5
Bordures Nord (talus et bords de piste) et future zone d'accès située au Nord.....	6
Éléments faunistiques notés.....	8
Analyse des enjeux sur le site et ses abords (avérés et potentiels).....	8
Enjeux flore et habitats.....	8
Enjeux faune.....	8
Annexe : liste des espèces observées.....	11
Flore.....	11
Faune.....	17

Photo de couverture : Aspect typique de la zone d'étude sur sa partie Est (photographie prise au 2.37468 / 43.65432). On note d'une part les importantes surfaces de sol à nu, très dépourvues de plantes herbacées, et d'autre part la forte dynamique de certains arbres en cours de colonisation (très visibles ici notamment, les peupliers *Populus nigra*).

Nature du projet

Un projet photovoltaïque est envisagé sur une parcelle au sud-est du village de Lacrouzette. Les surfaces, remblayées depuis au moins 20 ans par des particules fines issues des résidus d'exploitation du granite, sont aujourd'hui en cours de recolonisation par une végétation spontanée dans un contexte encore perturbé (exploitation assez récentes, décharges ou carrières encore à proximité, ligne à haute-tension...). La zone qui devait être étudiée (Fig.1), en considérant ses abords, couvre environ 22 000 m².




Figure 1: Zone du projet avec ses délimitations et plans d'implantation.

La possibilité de présence d'espèces patrimoniales, rares ou protégées, était assez limitée dans ces

conditions mais considérée comme restant possible (potentiel pour des amphibiens et reptiles protégés, ou des oiseaux nicheurs). Quelques plantes un peu rares, notamment dans les espèces pionnières, étaient également envisagées.

L'étude ici présentée fait le bilan d'un seul passage, qui permet de diagnostiquer les milieux (inventaires floristiques, description des habitats, liste des espèces animales détectables au moment du passage), et donc d'évaluer les enjeux potentiels de la zone notamment pour les espèces protégées ou patrimoniales.

Une seule date d'inventaire ne permet pas d'avoir une liste complète des espèces (seul un inventaire sur une année avec 4 ou 5 passages permettrait d'être assez exhaustif), seulement d'évaluer le potentiel de présence pour d'autres taxons.

Le rapport de cette expertise analyse donc les espèces rencontrées ou potentielles, leurs éventuels enjeux réglementaires et patrimoniaux dans la région. Il décrit aussi les milieux, en accompagnant ces descriptions de photographies.

Déroulement de l'inventaire

L'étude a été réalisée le 20 avril 2026, par bonnes conditions météorologiques pour mener ces recherches : 19°C en milieu de matinée, montant à 21°C vers 14h ; ciel voilé (nuages d'étage moyen) avec couverture 6 à 7/8ème (temps pré-orageux sans vent), devant peu nuageux en cours d'après-midi.

Aucune difficulté n'a été rencontrée pour accéder au site ou l'étudier.

Résultats flore et habitats

106 plantes (4 au genre : *Festuca*, *Juncus*, *Taraxacum* et *Rubus* ; 102 espèces) ont été notées. Un nombre assez important l'a été uniquement sur les bordures nord (lisières et bas de remblais en bord de piste) ou dans les zones interstitielles entre les surfaces du projet (bordure est, zone centrale), qui sont moins perturbées et donc plus « naturelles ».

Dans la zone du projet

Toutes les surfaces prévues pour l'installation de panneaux sont occupées par une végétation indiquant des perturbations passées, et une dynamique lente vers un reboisement.

Sans doute suivant l'ancienneté des derniers dépôts, la flore est :

- soit plutôt herbacée et pionnière ; c'est le cas sur une partie de la zone Est (Fig.2) : *Plantago lanceolata*, *Hypochaeris radicata*, *Cerastium glomeratum*, *Medicago sativa*, *Lotus corniculatus*, *Rumex acetosa*, *Veronica persica*, *Poa annua*, des Poacées vivaces au stade végétatif, etc. Mais l'évolution naturelle semble rapide sur ces surfaces ouvertes, ainsi que l'atteste l'abondance de nombreux buissons ou jeunes arbres d'essences pionnières, encore de petite taille : *Populus nigra* (assez nombreux), *Pinus sylvestris*, *Betula pendula*, *Buddleja davidii*, *Cytisus scoparius*, *Ulex europaeus* (ces deux derniers surtout sur les bordures)...



Figure 2: vue sur la partie Est, dans des zones où la végétation herbacée couvre de façon plus continue le sol. On note malgré tout la forte dynamique de boisement à venir, avec de nombreux jeunes arbres (pins, bouleaux, peupliers...).

- ou plutôt ligneuses avec de nombreux pins sylvestres (paraissant au moins en partie plantés) ; c'est le cas sur la partie ouest. Mais on retrouve une petite partie des espèces herbacées signalées sur la partie Est, simplement en effectifs très réduits (Fig.3).

Dans les deux cas donc sur l'ensemble des surfaces, que l'on soit dans des zones denses en pins ou sur les parties pionnières, les sols sont régulièrement à nu et révèlent la nature des matériaux déposés sur plusieurs mètres d'épaisseur : une matrice fine sablo-argileuse, sans doute souvent compactée par les engins au fil des années. Quelques plantes hygroclines peu exigeantes sont alors notées. Ainsi le saule *Salix atrocinerea* est bien présent sur la zone du projet, en tant qu'arbuste pionnier. Il tend même à coloniser assez fortement par endroit.

Le tout étant sur une épaisseur de plusieurs mètres de fines, il en résulte que localement quelques cuvettes se sont formées par affaissement/tassements et sont certainement en eau en hiver/début de printemps (notamment une zone située vers les coord. 2.37468 / 43.65432). Aucune flore particulière associée n'y a été notée, si ce n'est des populations de *Tussilago farfara*, une plante parfaitement adaptée aux sols très tassés argileux.

Au total on peut considérer qu'une cinquantaine d'espèces de plantes ont été répertoriées sur les aires des futures implantations de panneaux, ce qui montre une diversité faible.



Figure 3: aspect général de la partie Ouest, assez particulière. Les pins y sont particulièrement nombreux et serrés (plantés ?), accompagnés par des peuplier en voie d'installation également, tandis que le sol est de façon quasi continue à nu.

Sur la future zone d'accès située à l'Est

Immédiatement au-delà de la zone projetée pour l'implantation proprement dite, se trouve une rampe d'accès venant de la piste et montant progressivement dans la parcelle. Le substrat y semble plus filtrant, constitué de matériaux grossiers (sables, gravillons, pierres).

La flore partage des points communs avec le reste de la zone d'étude, mais se distingue néanmoins par un cortège plus bas et xérophile avec d'assez nombreuses plante annuelles (Fig.4), et constitue localement des végétations de tonsures rudérales secondaires. Ces plantes sont non seulement souvent associées aux activités humaines, mais apprécient de plus fréquemment les contraintes de piétinements (passages de véhicules par exemple). En exemples d'espèces abondamment présentes : *Geranium columbinum*, *Myosotis arvensis*, *Poa bulbosa*, *Sagina apetala*, *Trifolium dubium*, *Veronica arvensis*, *Arenaria serpyllifolia*, *Erodium cicutarium*, *Sherardia arvensis*...

Cette partie à l'Est fait ponctuellement l'objet de dépotoir (déchets verts, plastiques, morceaux de granites taillés).



Figure 4: extrémité de la partie Est, correspondant à la future zone d'accès (et faisant déjà actuellement office de zone d'accès). On note le caractère plus sec et caillouteux, avec une végétation avant tout herbacée pionnière.

Bordures Nord (talus et bords de piste) et future zone d'accès située au Nord

Entre la parcelle du projet et la piste au Nord, on remarque un habitat assez différent et plus naturel (Fig.5), correspondant à des lisières forestières fraîches, ou de sous-bois, parfois plutôt humides. On retrouve également ce cortège entre les deux parties de la future centrale, mais sans zones humides pour cette dernière.

De nombreuses espèces sont alors notées et relèvent de cortèges habituellement présents dans cette zone du Sidobre ou plus généralement sur les lisières de bois ou dans des clairières en conditions neutrophiles ou acidiclinales : *Pteridium aquilinum*, *Hedera helix*, *Dactylis glomerata*, *Lonicera periclymenum*, *Polystichum setiferum*, *Polypodium interjectum*, *Fragaria vesca*, *Festuca* sp., *Rubus holostea*, *Vicia cracca*, *Prunella vulgaris*, etc.

Elles sont accompagnées par une diversité importante d'arbres, plutôt assez bas (relativement jeunes) : *Fagus sylvatica*, *Tilia platyphyllos*, *Castanea sativa*, *Fraxinus excelsior*... Ainsi que d'arbustes : *Frangula alnus*, *Ribes alpinum*, *Crataegus monogyna*, *Crataegus germanica*, *Corylus avellana*, etc.



Figure 5: zone de végétation plus naturelle, en contact avec le pied du remblai (à gauche sur la photographie), situé en bordure Nord de la zone du projet.



Figure 6: zone humide en pied de talus au Nord.

Ces végétations sur la pente du talus et bord de la piste sont aussi localement associées à des petites zones humides (fossé élargi et en eau, « suintement » provenant de la rupture de pente en bas de talus).

Des plantes caractéristiques s'y rencontrent alors : *Juncus* groupe *articulatus/acutiflorus*, *Cardamine pratensis*, *Ranunculus repens*, *Juncus conglomeratus*, *Agrostis stolonifera*, *Eupatorium cannabinum*, *Mentha suaveolens*, *Epilobium hirsutum*... Ces herbacées sont accompagnées d'aulnes *Alnus glutinosa* et de saules *Salix atrocinerea*.

La zone « humide » principale correspond à un fossé en eau aux pentes douces (Fig.6), d'une longueur d'environ 20 m et profond d'au moins 40 cm. L'eau y est transparente.

Éléments faunistiques notés

Très peu d'espèces animales ont pu être notées lors de l'inventaire. Outre la petitesse du site et sa flore pauvre, développée sur des remblais (ne favorisant donc pas beaucoup l'entomofaune par exemple), des perturbations environnantes contribuent sans doute, au moins pour les oiseaux, à n'avoir que peu de taxons fréquentant le site : bruits permanents de camions manœuvrant dans les zones de stockages à côté, bruits de machines, coups de klaxon.

Par exemple, en ce qui concerne les lépidoptères, quasi aucun papillon n'a été repéré (seulement quatre espèces de papillons de jour : *Anthocharis cardamines*, *Gonepteryx rhamni*, *Pararge aegeria*, *Vanessa atalanta*), l'ensemble de la zone d'étude semblant désertique. Une séance d'inventaire menée à l'aide d'un filet fauchoir, permettant normalement de détecter de nombreux taxons d'autres groupes (par exemple punaises, orthoptères...) s'est révélée également d'une grande pauvreté.

Les conditions météorologiques étaient très propices à l'observation des reptiles, notamment les serpents qui sont des animaux souvent discrets. Malgré un temps de recherche consacré à ce groupe, seuls quelques lézards des murailles *Podarcis muralis*, espèce souvent favorisée dans les habitats secondaires et vivant souvent dans des conditions artificialisées voire dans les villages, ont été vus. Pourtant, les lisières assez structurées et les fourrés entourant la zone d'étude offrent des micro-habitats favorables à d'autres reptiles.

Analyse des enjeux sur le site et ses abords (avérés et potentiels)

Enjeux flore et habitats

Aucune plante rare, menacée, déterminante ZNIEFF ou protégée par la Loi n'a été détectée au cours de l'inventaire de terrain. La nature des milieux, même en incluant les bordures extérieures, ne permet pas d'envisager que de telles espèces puissent être détectées sur d'autres périodes. **L'enjeu flore doit donc être considéré comme nul.**

Concernant les habitats rencontrés sur la zone du projet et ses abords, aucun n'est rare, fragile, d'intérêt communautaire (habitats dits « Natura 2000 »), **ou déterminant ZNIEFF.**

Seules les petits zones humides (en réalité, associées aux fossés) et les lisières/boisements repérés sur les bords de piste au nord sont des habitats plus sensibles et qui doivent faire l'objet d'un maintien et de précautions lors de futurs chantiers, en raison de la présence avérée d'amphibiens (incluant quelques autres espèces non vues, mais ayant une bonne probabilité de présence).

Enjeux faune

Où que l'on se trouve dans la région, beaucoup d'espèces protégées sont généralement présentes. Ainsi des hérissons, de nombreux oiseaux (presque tous étant protégés par la Loi), ou encore quelques reptiles ou amphibiens peuvent être rencontrés même en ville. Il en est donc de même dans toutes les sortes d'habitats de la région y compris des milieux perturbés à répétition comme la zone d'étude.

Nous pouvons signaler, en présence avérée :

- **lézard des murailles** *Podarcis muralis*, qui a été vu à plusieurs reprises et vit en permanence

certainement sur toute la zone. Ce lézard est très commun dans la région, s'adapte à des conditions variées jusqu'à des habitats artificiels où il peut souvent se trouver favorisé par rapport à d'autres reptiles.

- **triton palmé** *Lissotriton helveticus*, avec une femelle vue (certainement d'autres individus présents) dans une vasque d'eau en bordure nord du projet (situé aux coord. 2.37373 43.65509 ; Fig.7). Ce triton a besoin d'eau pour se reproduire, toujours de petit volume (fossés, petites mares). Après cette phase de reproduction, il vit en phase terrestre partout autour (sans doute ici dans les zones fraîches et boisées autour, incluant le talus Nord, boisé, de la parcelle étudiée).



Figure 7: Dépression en eau en bordure de la piste au Nord, où une femelle de triton palmé a été vue en train de pondre.

- **grenouilles vertes** *Pelophylax* sp. (probablement *Pelophylax ridibundus*), avec de nombreux juvéniles dans les vasques d'eau en bordure nord du projet. Ces grenouilles sont des individus en dispersion ou qui profitent pour leur croissance de milieux aquatiques de petite taille. Les adultes cherchent les grandes mares, les étangs artificiels, etc. La reproduction de cette espèce doit avoir lieu beaucoup plus loin vers le nord (chants puissants entendus au-delà de la ligne haute-tension).

- **des oiseaux** : la fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla*, le pinson des arbres *Fringilla coelebs*, la mésange charbonnière *Parus major*, etc. ont tous été vus/entendus au sein de la zone du projet ou ses abords. Néanmoins, la nature des milieux rencontrés laisse à penser que ces espèces pourtant répandue ne nichent pas là où l'installation photovoltaïque est prévue (par contre ils nichent certainement sur les pourtours, les végétations étant plus structurées, plus hautes...). Leur

fréquentation au sein même du site est associée soit à des survols (transits), soit à des recherches de nourriture.

D'autres reptiles (toutes les espèces étant protégées) sont aussi certainement présents – uniquement sur les pourtours notamment la bordure Nord car associés aux lisières, fourrés, etc. – mais leur détection est plus difficile en un seul passage (espèces discrètes, généralement en effectifs faibles...).

Au total ce groupe d'animaux pourrait présenter une diversité assez élevée avec les habitats qui conviennent : couleuvre helvétique *Natrix helvetica* (présence très probable à la faveur des nombreuses grenouilles, une de ses proies de prédilection), couleuvre verte et jaune *Hierophis viridiflavus* (serpent commun dans toute la région), lézard à deux raies *Lacerta bilineata* (généralement commun à très commun dans ces conditions de lisières)... et quelques autres possibles mais plus difficiles à détecter et pas toujours présentes malgré des conditions qui ici pourraient leur convenir : couleuvre d'Esculape *Zamenis longissimus* (espèce appréciant les lisières fraîches dans des contextes plutôt forestiers), coronelle girondine *Coronella girondica* (espèce de milieux plutôt chauds et secs, pouvant être favorisée par les talus et zones granitiques dans les environs).

Concernant les amphibiens, outre le triton palmé qui doit être présent régulièrement et tous les ans comme reproducteur, et les grenouilles vertes juvéniles, **la salamandre tachetée *Salamandra salamandra* a de grandes chances de se reproduire dans ces mêmes petits points d'eau**. En effet cette espèce répandue dans tous les contextes avec ambiance forestière dominante se reproduit toujours à la faveur de ruisselets, fossés et ornières, ou de petites mares. Nous nous attendions d'ailleurs à découvrir des larves ce jour là, mais leur présence est plus facilement détectable de nuit lors de recherches à la lampe.

Aucun autre espèce d'amphibien ne semble sinon pouvoir être présent et se reproduire sur ces bordures du site.

Que ce soit pour les amphibiens et les reptiles présents, ou pour tous ceux signalés comme potentiels, aucun n'est considéré comme menacé dans la région ou en France (au sens des Listes rouges existantes). Ces espèces sont communes mais bénéficient néanmoins d'une protection légale¹, incluant ou pas (suivant les taxons), une protection intégrale de leurs habitats.

Ici, la zone projetée pour l'installation des panneaux n'impacte en rien ces espèces ou leurs milieux. On prendra juste des précautions pendant le chantier concernant les accès, les manœuvres, les risques d'écoulements ou de pollution accidentelle, les dépôts de matériaux, qui devront respecter scrupuleusement tous les abords situés au Nord.

1 Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection.
<https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043113964/?isSuggest=true>

Annexe : liste des espèces observées

Flore

Note : les trois dernières colonnes sont données à titre d'information. Elles sont renseignées automatiquement à partir des bases de données phytosociologiques compilées et ordonnancées par Philippe Julve (programmes Catminat et Baseflor. <https://www.e-veg.net/accueil>).

Nom scientifique	Nom commun	Chorologie	Description écologique du groupement	Groupement phytosociologique caractéristique
Homalothecium lutescens (Hedw.) H. Rob., 1962				
Porella platyphylla (L.) Pfeiff., 1855				
Achillea millefolium L., 1753	Achillée millefeuille	eurasiatique	prairies européennes mésotrophiles à eutrophiles	Agrostio stoloniferae - Arrhenatheretea elatioris subsp. elatioris (Tüxen 1937 em. 1970) de Foucault 1984
Agrostis stolonifera L., 1753	Agrostide stolonifère	circumboréal	prairies européennes hygrophiles à hydrophiles, inondables	Agrostienea stoloniferae var. stoloniferae (Oberdorfer & Müller ex Gills 1966) de Foucault 1984
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790	Aulne glutineux	européen	bois caducifoliés hygrophiles à amphibies	Fraxino excelsioris - Alnetalia glutinosae Julve 1993
Anacamptis morio (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase, 1997	Anacamptide bouffon	européen	pelouses basophiles médio-européennes occidentales, mésohydriques à mésohygroclines	Brizo mediae - Plantaginenea mediae Julve 2019 subcla. nov. hoc loco
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934	Brome stérile	eurasiatique méridional	friches annuelles rudérales, européennes	Sisymbrietea officinalis Korneck 1974
Arenaria serpyllifolia L., 1753	Sabline à feuilles de serpolet	circumboréal	annuelles des tonsures basophiles, européennes	Stipello capensis - Brachypodietea distachyi (Braun-Blanquet 1947) Brullo 1985
Bellis perennis L., 1753	Pâquerette vivace	européen	prairies mésohydriques européennes, picturées, planitaires à montagnardes	Trifolio repentis - Phleetealia pratensis Passarge 1969
Betula pendula Roth, 1788	Bouleau pleureur	eurasiatique	associations arborescentes pionnières plutôt héliophiles, oligotrophiles, mésohydriques	Betulion pendulae Lakušić, Pavlović, Abadžić & Grgić 1978
Blackstonia perfoliata subsp. perfoliata (L.) Huds., 1762	Blackstonie perfoliée	méditerranéen(eury)-atlantique(eury)	annuelles des tonsures mésohygrophiles, basophiles	Centaurio pulchelli - Blackstonion perfoliatae (Müller-Stoll & Pietsch 1965 apud Pietsch 1973) de Foucault 1988
Brachypodium rupestre subsp. rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817	Brachypode rupestre	méditerranéen(eury)-atlantique(eury)	ourlets basophiles médio-européens	Trifolio medii - Geranietea sanguinei Müller 1962

Nom scientifique	Nom commun	Chorologie	Description écologique du groupement	Groupement phytosociologique caractéristique
<i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>hordeaceus</i> L., 1753	Brome mou	eurasiatique	friches annuelles rudérales, européennes	Sisymbrietea officinalis Korneck 1974
<i>Buddleja davidii</i> Franch., 1887	Buddleia de David	introduit (Himalaya)	fourrés arbustifs et d'arbrisseaux médio-européens, planitiaux à montagnards	Rhamno catharticae - Prunetea spinosae Rivas Goday & Borja Carbonell 1961 ex Tüxen 1962
<i>Cardamine pratensis</i> L., 1753	Cardamine des prés	circumboréal	prairies hygrophiles, médio-européennes, mésothermes	Loto pedunculati - Cardaminetalia pratensis subsp. pratensis Julve 1993
<i>Carex pendula</i> Huds., 1762	Laîche à épis pendants	eurasiatique méridional	ourlets internes et clairières vivaces médio-européennes, eutrophiles, mésohygrophiles	Circaeolutoletia - Stachyetalia sylvaticae Passarge 1967
<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768	Châtaignier cultivé	européen méridional	associations arborescentes des forêts et bois caducifoliés climatiques, malacophylles, du tempéré modal médio-européen, sub/supraméditerranéen	Quercetea fagineo - pubescentis Julve 2017 class. nov. hoc loco
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799	Céraiste aggloméré	cosmopolite	ourlets thérophytiques vernaux, nitrophiles, médio-européens, planitiaux	Anisantho sterilis - Cardaminetalia hirsutae de Foucault 2009
<i>Clematis vitalba</i> L., 1753	Clématite des haies	circumboréal	lianes grimpantes sur parois de falaises ou murs, épiphytes sur troncs d'arbres et d'arbustes	Hederetea helici Julve 2005 cla. nov. hoc loco
<i>Corylus avellana</i> L., 1753	Noisetier commun	eurasiatique	associations arborescentes pionnières des contextes forestiers mésotrophes	Corylo avellanae - Populion tremulae Braun-Blanquet 1961 ex Rivas-Martinez & Costa 1998
<i>Crataegus germanica</i> (L.) Kuntze, 1891	Néflier d'Allemagne	eurasiatique méridional	fourrés arbustifs et d'arbrisseaux septentrionaux, acidophiles, mésotrophiles, planitiaux à collinéens	Crataego germanicae - Illicion aquifolii de Foucault 1998
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style	eurasiatique méridional	fourrés arbustifs et d'arbrisseaux médio-européens, planitiaux à montagnards	Rhamno catharticae - Prunetea spinosae Rivas Goday & Borja Carbonell 1961 ex Tüxen 1962
<i>Cytisus scoparius</i> subsp. <i>scoparius</i> (L.) Link, 1822	Cytise à balais	européen occidental	fourrés d'arbrisseaux européens pionniers, acidophiles, mésohydriques à mésoxérophiles	Cytisetea scopario – striati
<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i> L., 1753	Dactyle aggloméré	eurasiatique méridional	prairies mésohydriques, fauchées, planitiales à montagnardes	Arrhenatheretalia elatioris subsp. elatioris Tüxen 1931
<i>Daucus carota</i> L., 1753	Carotte sauvage	européen	friches vivaces mésoxérophiles européennes	Artemisietalia vulgaris Lohmeyer in Tüxen 1947
<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	Cardère à foulon	européen méridional	mégaphorbiaies eutrophisées, planitiales, médio-européennes plutôt occidentales	Convolvulion sepium Tüxen 1947
<i>Draba verna</i> L., 1753	Drave printanière	eurasiatique	ourlets thérophytiques vernaux, nitrophiles, méridionaux, hémisciaphiles à hémihéliophiles	Cardaminetea hirsutae Géhu 1999
<i>Echium vulgare</i> L., 1753	Vipérine commune	européen	friches vivaces mésoxérophiles européennes	Artemisietalia vulgaris Lohmeyer in Tüxen 1947
<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	Épilobe hérissé	européen	mégaphorbiaies hygrophiles, planitiales-collinéennes à montagnardes	Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium (Preisig apud Hülbusch 1973) Géhu & Géhu-Franck 1987
<i>Erodium cicutarium</i> subsp. <i>ciutarium</i> (L.) L'Hér., 1789	Érodium à feuilles de ciguë	cosmopolite	annuelles des tonsures basophiles, européennes	Stipello capensis - Brachypodietea distachyi (Braun-Blanquet 1947) Brullo 1985

Nom scientifique	Nom commun	Chorologie	Description écologique du groupement	Groupement phytosociologique caractéristique
<i>Eupatorium cannabinum</i> subsp. <i>cannabinum</i> L., 1753	Eupatoire chanvrine	eurasiatique méridional	mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles, nitrophiles	Convolvuletalia sepium Tüxen 1950 ex Mucina in Mucina, Grabherr & Ellmauer 1993
<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	Hêtre des forêts	européen	associations arborescentes des forêts et bois caducifoliés climaciques, malacophylles, du tempéré modal médio-européen	Fraxino excelsioris - Quercetea roboris Gillet 1986 ex Julve 1993
<i>Festuca</i> sp.	Fétuques			
<i>Fragaria vesca</i> L., 1753	Fraisier sauvage	cosmopolite	ourlets internes des clairières basophiles médio-européennes, mésohydriques	Fragarion vescae Tüxen 1950
<i>Frangula alnus</i> subsp. <i>alnus</i> Mill., 1768	Bourdaie aulne	eurasiatique septentrional	fourrés d'arbrisseaux médio-européens, planitiaires à montagnards, hydrophiles, des sols tourbeux	Franguletea alni
<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	Frêne élevé	européen	associations arborescentes des forêts et bois caducifoliés climaciques, malacophylles, du tempéré modal médio-européen	Fraxino excelsioris - Quercetea roboris Gillet 1986 ex Julve 1993
<i>Geranium columbinum</i> L., 1753	Géranium colombin	eurasiatique	ourlets thérophytiques vernaux, nitrophiles, méridionaux, hémisciaphiles à hémihéliophiles	Cardaminetea hirsutae Géhu 1999
<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	Géranium découpé	eurasiatique	annuelles commensales des cultures basophiles	Papaveretalia rhoeadis Hüppe & Hofmeister 1990
<i>Geranium rotundifolium</i> L., 1753	Géranium à feuilles rondes	européen méridional	ourlets thérophytiques vernaux, nitrophiles, méridionaux, hémisciaphiles à hémihéliophiles	Cardaminetea hirsutae Géhu 1999
<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	Gléchome lierre terrestre	eurasiatique	friches et lisières vivaces médio-européennes, eutrophiles, mésohydriques	Lamio albi - Chenopodietalia boni-henrici Kopecký 1969
<i>Hedera helix</i> L., 1753	Lierre grimpant	eurasiatique méridional	lianes grimpantes sur parois de falaises ou murs, épiphytes sur troncs d'arbres et d'arbustes	Hederetea helici Julve 2005 cla. nov. hoc loco
<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	Millepertuis perforé	cosmopolite	friches vivaces mésoxérophiles européennes	Artemisietalia vulgaris Lohmeyer in Tüxen 1947
<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	Porcelle enracinée	européen méridional	pelouses des sables continentaux acidophiles, médio-européennes à méditerranéennes	Rumicenea acetosellae de Foucault 1999
<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Houx commun	européen méridional	fourrés arbustifs et d'arbrisseaux septentrionaux, acidophiles, mésotrophiles, planitiaires à collinéens	Crataego germanicae - Ilicion aquifolii de Foucault 1998
<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753	Jonc aggloméré	européen	jonçaises des prés paratourbeux acidophiles, atlantiques	Juncion acutiflori Braun-Blanquet 1947
<i>Juncus</i> groupe <i>acutiflorus/articulatus</i>	Joncs acutiflore/articulé			
<i>Knautia arvernensis</i> (Briq.) Szabó, 1934	Knautie d'Auvergne	orophyte auvergnat	ourlets basophiles à neutroclines, mésohydriques, montagnards	Knaution maximae Julve 1993
<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753	Gesse des prés	eurasiatique méridional	ourlets basophiles mésohydriques, mésotrophiles, médio-européens	Agrimonia eupatoria - Trifolietalia medii Julve 1993
<i>Lepidium campestre</i> (L.)	Passerage	européen	annuelles commensales des cultures sarclées basophiles,	Fumario officinalis - Euphorbion helioscopiae Müller

Nom scientifique	Nom commun	Chorologie	Description écologique du groupement	Groupement phytosociologique caractéristique
W.T.Aiton, 1812	champêtre		mésothermes	ex Gî¶rs 1966
Leucanthemum vulgare Lam., 1779	Marguerite commune	eurasiatique	pelouses basophiles médio-européennes occidentales, mésohydriques à mésohygroclines	Brizo mediae - Plantaginenea mediae Julve 2019 subcla. nov. hoc loco
Linum usitatissimum subsp. angustifolium (Huds.) Thell., 1912	Lin à feuilles étroites	méditerranéen(eury)-atlantique(eury)	prairies mésohydriques à mésohygroclines, fauchées, thermo-atlantiques à subméditerranéennes	Lino usitatissimi subsp. angustifolii - Gaudinion fragilis écoph. vivace
Lonicera periclymenum L., 1753	Chèvrefeuille des bois	européen méridional	lianes grimpantes sur parois de falaises ou murs, épiphytes sur troncs d'arbres et d'arbustes	Hederetea helici Julve 2005 cla. nov. hoc loco
Lotus corniculatus subsp. corniculatus L., 1753	Lotier corniculé	eurasiatique méridional	pelouses basophiles médio-européennes et nevado-illyriennes	Festuco valesiacae - Bromopsietea erectae Braun-Blanquet & Tüxen 1943 em. Royer 1987
Medicago sativa subsp. sativa L., 1753	Luzerne cultivée	eurasiatique	friches vivaces mésohydriques, médio-européennes	Dauco carotae subsp. carotae - Melilotion albi Gî¶rs 1966
Mentha pulegium L., 1753	Menthe pouliot	eurasiatique	prairies hydrophiles européennes, thermophiles	Mentho pulegii - Eleocharitenalia palustris subsp. palustris Julve 1993
Mentha suaveolens Ehrh., 1792	Menthe à feuilles rondes	méditerranéen-atlantique	prairies hygrophiles pîcturées, thermophiles, basophiles, glycophiles à subhalophiles	Scirpoido holoschoeni - Juncion inflexi de Foucault in de Foucault & Catteau 2012
Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764	Myosotis des champs	circumboréal	ourlets thérophytiques vernaux, nitrophiles, médio-européens, planitiaires	Anisantho sterilis - Cardaminetalia hirsutae de Foucault 2009
Odontites vernus subsp. serotinus (Coss. & Germ.) Corb., 1894	Odontite tardif	eurasiatique	friches annuelles médio-européennes, subnitrophiles à nitrophiles	Sisymbrietalia officinalis J. Tüxen in Lohmeyer, A. & W. Matuszkiewicz, Merker, Moore, Müller, Oberdorfer, Poli, Seibert, Sukopp, Trautmann, J. Tüxen, R. Tüxen, & Westhoff 1962 ex Gî¶rs 1966
Ophrys exaltata Ten., 1819	Ophrys exalté	méditerranéen(eury)	pelouses basophiles mésoméditerranéennes, mésoxérophiles	Phlomidio lychnitidis - Brachypodion retusi (Rivas-Martínez 1978) Mateo 1983
Origanum vulgare subsp. vulgare L., 1753	Origan commun	eurasiatique	ourlets basophiles médio-européens	Trifolio medii - Geranietea sanguinei Müller 1962
Pastinaca sativa L., 1753	Panais cultivé	eurasiatique septentrional	friches vivaces mésohydriques, médio-européennes	Dauco carotae subsp. carotae - Melilotion albi Gî¶rs 1966
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964	Pétrorhagie prolifère	européen	annuelles des tonsures basophiles, aéromésohydriques, méso à subméditerranéennes	Brachypodietalia distachyi
Picris hieracioides L., 1753	Picride fausse épervière	eurasiatique	friches vivaces mésohydriques, médio-européennes	Dauco carotae subsp. carotae - Melilotion albi Gî¶rs 1966
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862	Pilloselle officinale	eurasiatique	pelouses des sables continentaux à submaritimes, médio-européennes à méditerranéennes	Koelerio glaucae - Corynephoretea canescentis Klika in Klika & Novîk 1941
Pinus sylvestris L., 1753	Pin sylvestre	eurasiatique	associations arborescentes pionnières des forêts sempervirentes, aciculifoliées, boréo-montagnardes, parfois climaciques sur sols oligotrophes	Pinetea sylvestris Julve 2016 class. nov. hoc loco

Nom scientifique	Nom commun	Chorologie	Description écologique du groupement	Groupement phytosociologique caractéristique
<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	Plantain lancéolé	eurasiatique	prairies européennes mésotrophiles à eutrophiles	Agrostio stoloniferae - Arrhenatheretea elatioris subsp. elatioris (Tüxen 1937 em. 1970) de Foucault 1984
<i>Plantago major</i> subsp. <i>major</i> L., 1753	Plantain élevé	eurasiatique	prairies mésohydriques, surpâturées ou surpiétinées, planitiales à montagnardes	Lolio perennis - Plantaginion majoris subsp. majoris Sissingh 1969
<i>Poa annua</i> subsp. <i>annua</i> L., 1753	Pâturin annuel	cosmopolite	annuelles eutrophiles des tonsures surpiétinées	Lepidio squamati - Polygonetea avicularis subsp. depressi
<i>Poa bulbosa</i> subsp. <i>bulbosa</i> L., 1753	Pâturin bulbeux	eurasiatique	pelouses des sables continentaux à submaritimes, médio-européennes à méditerranéennes	Koelerio glaucae - Corynepherea canescentis Klika in Klika & Novák 1941
<i>Polypodium interjectum</i> Shivas, 1961	Polypode intermédiaire	eurasiatique tempéré	chasmophytes de parois européennes, acidophiles, planitiales-montagnardes	Asplenietalia septentrionalis
<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyne, 1913	Polystic à soies	méditerranéen(eury)-atlantique(eury)	sous-bois herbacés acidophiles, planitiales-collinéens, subatlantiques à subméditerranéens, mésothermes à thermophiles	Luzulion forsteri Julve 2006 all. nov. hoc loco
<i>Populus nigra</i> L., 1753	Peuplier noir	européen méridional	associations arborescentes européennes de nomades à bois tendres hydrophiles à amphibies sur sols minéraux	Salici albae - Populetea nigrae Julve 2016 cla. nov. hoc loco
<i>Populus tremula</i> L., 1753	Peuplier tremble	eurasiatique méridional	associations arborescentes de nomades à bois tendres, pionniers des climax caducifoliés et sempervirents du tempéré modal et du tempéré froid eurasiatiques, planitiales à boréo-subalpins, sur sols oligotrophes à mésotrophes	Betulo pendulae - Populetea tremulae
<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	Potentille rampante	eurasiatique	prairies européennes hygrophiles à hydrophiles, inondables	Agrostienea stoloniferae var. stoloniferae (Oberdorfer & Müller ex Gilks 1966) de Foucault 1984
<i>Poterium sanguisorba</i> subsp. <i>sanguisorba</i> L., 1753	Potérium sanguisorbe	eurasiatique méridional	pelouses basophiles médio-européennes et nevado-illyriennes	Festuco valesiacae - Bromopsietea erectae Braun-Blanquet & Tüxen 1943 em. Royer 1987
<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	Herbe Catois	cosmopolite	prairies mésohydriques européennes, pâturées, planitiales à montagnardes	Trifolio repentis - Phleetea pratensis Passarge 1969
<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	Prunier merisier	eurasiatique méridional	bois caducifoliés médio-européens, mésotrophiles, planitiales-collinéens	Pruno avium - Carpinetalia betuli Gillet 1986 ex Julve 1993
<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	Prunier épineux	eurasiatique	fourrés arbustifs et d'arbrisseaux médio-européens, planitiales à montagnards	Rhamno catharticae - Prunetea spinosae Rivas Goday & Borja Carbonell 1961 ex Tüxen 1962
<i>Pseudoturritia turrita</i> (L.) Al-Shehbaz, 2005	Fausse tourette tourette	méditerranéen occidental	ourlets basophiles supraméditerranéens, mésoxérophiles	Potentillion micranthae Julve 2010 all. nov. hoc loco
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Ptéridion aigle	cosmopolite	mégaphorbiaies pionnières de clairières acidophiles, méso-eutrophiles, médio-européennes	Pteridion aquilini Lakušić, Pavlović, Abadžić & Grgić 1978
<i>Quercus pubescens</i> Willd., 1796 [nom. et typ. cons.]	Chêne pubescent	européen méridional	associations arborescentes des forêts et bois caducifoliés climaciques, malacophylles, du tempéré modal médio-européen, sub/supraméditerranéen	Quercetea fagineo - pubescentis Julve 2017 class. nov. hoc loco
<i>Quercus robur</i> L., 1753	Chêne pédonculé	européen	associations arborescentes des forêts et bois caducifoliés	Fraxino excelsioris - Quercetea roboris Gillet 1986 ex

Nom scientifique	Nom commun	Chorologie	Description écologique du groupement	Groupement phytosociologique caractéristique
			climaciques, malacophylles, du tempéré modal médio-européen	Julve 1993
Rabelera holostea (L.) M.T.Sharples & E.A.Tripp, 2019	Stellaire holostée	européen méridional	ourlets externes acidoclines vernaux, atlantiques	Violo riviniana - Stellarion holostea
Ranunculus repens L., 1753	Renoncule rampante	circumboréal	prairies européennes hygrophiles à hydrophiles, inondables	Agrostienea stoloniferae var. stoloniferae (Oberdorfer & Müller ex Gilrs 1966) de Foucault 1984
Ribes alpinum L., 1753	Groseillier des Alpes	européen	fourrés arbustifs et d'arbrisseaux basophiles, mésotrophiles, centro-européens à septentrionaux, planitiaires à montagnards	Ribeso alpini - Viburnion lantanae de Foucault & Julve 2001
Robinia pseudoacacia L., 1753	Robinier faux-acacia	introduit (Amér. du nord or.)	associations arborescentes climaciques caducifoliées malacophylles des forêts du tempéré modal nord-est américain	Aceri sacchari - Fagetea grandifoliae Julve 2019 class. nov. hoc loco
Rubus L., 1753 [nom. et typ. cons.]	Ronces			
Rumex acetosa subsp. acetosa L., 1753	Patience oseille	circumboréal	prairies européennes mésotrophiles à eutrophiles	Agrostio stoloniferae - Arrhenatheretea elatioris subsp. elatioris (Tüxen 1937 em. 1970) de Foucault 1984
Rumex obtusifolius subsp. obtusifolius L., 1753	Patience à feuilles obtuses	circumboréal	friches et lisières vivaces médio-européennes, eutrophiles, mésohydriques à mésohygrophiles	Glechomo hederaceae - Urticetea dioicae (Passarge 1967) Julve 2003 nom. nov. hoc loco
Sagina apetala subsp. apetala Ard., 1763	Sagine apétale	européen méridional	annuelles eutrophiles des tonsures surpiétinées, médio-européennes	Lepidio squamati - Polygonetalia avicularis subsp. depressi Lohmeyer 1970
Salix atrocinerea Brot., 1804	Saule gris cendré foncé	européen méridional	fourrés d'arbrisseaux médio-européens, planitiaires à montagnards, hydrophiles, des sols tourbeux	Franguletea alni Doing 1962
Senecio inaequidens DC., 1838	Séneçon du Cap	introduit (Afrique du sud)	friches vivaces mésoxérophiles européennes	Artemisietalia vulgaris Lohmeyer in Tüxen 1947
Sherardia arvensis L., 1753	Shérardie des champs	eurasiatique méridional	annuelles commensales des cultures basophiles	Papaveretalia rhoeadis Hüppe & Hofmeister 1990
Taraxacum F.H.Wigg., 1780	Pissenlits			
Taraxacum groupe groupe oxoniense / christelianum	Pissenlit d'Oxford	européen occidental	friches vivaces rudérales pionnières, mésoxérophiles à mésohydriques, médio-européennes	Elytrigietalia intermedio - repentis Oberdorfer, Gilrs, Korneck, Lohmeyer, Müller, Philippi & Seibert 1967
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]	Tilleul à grandes feuilles	européen	bois caducifoliés à mixtes, médio-européens, basophiles à basoclines, montagnards à collinéens	Aceri platanoidis - Tilion platyphylli Gillet 1986 em. Julve 1993
Trifolium dubium Sibth., 1794	Trèfle douteux	cosmopolite	annuelles mésohydriques des trouées des prairies (mosaïques contigües)	Trifolion dubii Julve 2011 all. nov. hoc loco
Trifolium pratense L., 1753	Trèfle des prés	eurasiatique	prairies européennes mésotrophiles à eutrophiles	Agrostio stoloniferae - Arrhenatheretea elatioris subsp. elatioris (Tüxen 1937 em. 1970) de Foucault 1984
Tussilago farfara L., 1753	Tussilage pas-d'âne	eurasiatique	friches vivaces pionnières mésohygrophiles, des substrats argileux	Tussilaginion farfarae (Szabo 1971) Popescu & Sanda 1988
Ulex europaeus subsp. europaeus	Ajonc d'Europe	atlantique(eury)	fourrés d'arbrisseaux européens pionniers, acidophiles,	Cytisetea scopario - striati Rivas-Martínez 1974

Nom scientifique	Nom commun	Chorologie	Description écologique du groupement	Groupement phytosociologique caractéristique
L., 1753			mésohydriques à mésoxérophiles	
Urtica dioica subsp. dioica L., 1753	Ortie dioïque	cosmopolite	friches et lisières vivaces médio-européennes, eutrophiles, mésohydriques à mésohygrophiles	Glechomo hederaceae - Urticetea dioicae (Passarge 1967) Julve 2003 nom. nov. hoc loco
Valeriana officinalis L., 1753	Valériane officinale	européen	mégaphorbiaies hygrophiles, planitiaies-collinéennes à montagnardes	Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium (Preisling apud Hülbusch 1973) Géhu & Géhu-Franck 1987
Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821	Valérianelle potagère	européen	annuelles pionnières nitrophiles des clairières et lisières européennes, psychrophiles, hémihéliophiles, boréocentro-européennes	Arabidopsion thalianae Passarge 1964
Veronica arvensis L., 1753	Véronique des champs	eurasiatique méridional	ourlets thérophytiques vernaux, nitrophiles, méridionaux, hémisciaphiles à hémihéliophiles	Cardaminetea hirsutae Géhu 1999
Veronica chamaedrys subsp. chamaedrys L., 1753	Véronique petit chêne	eurasiatique	ourlets basophiles mésohydriques, mésotrophiles, médio-européens	Agrimonio eupatoriae - Trifolietalia medii
Veronica persica Poir., 1808	Véronique de Perse	cosmopolite	annuelles commensales des cultures basophiles	Papaveretalia rhoeadis Hüppe & Hofmeister 1990
Vicia cracca L., 1753	Vesce cracca	européen	ourlets basophiles médio-européens	Trifolio medii - Geranietea sanguinei Müller 1962
Vicia sativa L., 1753	Vesce cultivée	européen méridional	annuelles mésohydriques des trouées des prairies (mosaïques contigües)	Trifolion dubii Julve 2011 all. nov. hoc loco

Faune

Embranchement	Classe	Ordre	Nom scientifique	Nom commun
Chordés	Amphibiens	Urodela	Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789)	Triton palmé
Chordés	Amphibiens	Anura	Pelophylax Fitzinger, 1843	Grenouilles vertes
Chordés	Reptiles	Squamata	Podarcis muralis (Laurenti, 1768)	Lézard des murailles
Chordés	Mammifères	Cetartiodactyla	Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)	Chevreuil européen
Chordés	Mammifères	Lagomorpha	Lepus europaeus Pallas, 1778	Lièvre d'Europe
Chordés	Oiseaux	Accipitriformes	Buteo buteo (Linnaeus, 1758)	Buse variable
Chordés	Oiseaux	Passeriformes	Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)	Mésange bleue
Chordés	Oiseaux	Passeriformes	Fringilla coelebs Linnaeus, 1758	Pinson des arbres
Chordés	Oiseaux	Passeriformes	Parus major Linnaeus, 1758	Mésange charbonnière

Embranchement	Classe	Ordre	Nom scientifique	Nom commun
Chordés	Oiseaux	Passeriformes	Prunella modularis (Linnaeus, 1758)	Accenteur mouchet
Chordés	Oiseaux	Passeriformes	Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)	Fauvette à tête noire
Chordés	Oiseaux	Passeriformes	Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)	Troglodyte mignon
Chordés	Oiseaux	Passeriformes	Turdus merula Linnaeus, 1758	Merle noir
Chordés	Oiseaux	Passeriformes	Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831	Grive musicienne
Arthropodes	Insectes	Coleoptera	Anostirus purpureus (Poda, 1761)	
Arthropodes	Insectes	Coleoptera	Chrysomela populi Linnaeus, 1758	Chrysomèle du peuplier
Arthropodes	Insectes	Coleoptera	Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758	Coccinelle à 7 points
Arthropodes	Insectes	Coleoptera	Tropinota hirta (Poda, 1761)	
Arthropodes	Insectes	Hemiptera	Camptopus lateralis (Germar, 1817)	Alydide des genêts
Arthropodes	Insectes	Hemiptera	Carpocoris purpureipennis (De Geer, 1773)	
Arthropodes	Insectes	Hemiptera	Piezodorus lituratus (Fabricius, 1794)	
Arthropodes	Insectes	Lepidoptera	Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)	Aurore
Arthropodes	Insectes	Lepidoptera	Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)	Citron
Arthropodes	Insectes	Lepidoptera	Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)	Tircis
Arthropodes	Insectes	Lepidoptera	Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758)	Panthère
Arthropodes	Insectes	Lepidoptera	Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775)	Processionnaire du Pin
Arthropodes	Insectes	Lepidoptera	Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)	Vulcain
Arthropodes	Insectes	Orthoptera	Aiolopus strepens (Latreille, 1804)	OEdipode automnale
Arthropodes	Insectes	Orthoptera	Nemobius sylvestris (Bosc, 1792)	Grillon des bois
Arthropodes	Insectes	Orthoptera	Paratettix meridionalis (Rambur, 1838)	Tétrix méridional
Arthropodes	Insectes	Orthoptera	Tetrix undulata (Sowerby, 1806)	Tétrix forestier
Arthropodes	Insectes	Orthoptera	Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)	Grande Sauterelle verte
Arthropodes	Arachnides	Araneae	Pisaura mirabilis (Clerck, 1758)	Pisaure admirable