

Annexe 1 : Diagnostic stationnel (à remplir par station, renvoi scanné)

Station correspondante :	Sondage 1	Sondage 2	Sondage 3	Sondage 4
N° sondage identique (le cas échéant)	Station 1	Station 2 et 3	Station 4	Station 5
Type de sol*	Sablo/limoneux (0-60) puis sablo argileux 80 et + Drainant	Sablo/limoneux (0-50) puis sablo argileux 100 et + Trace d'hydromorphie à 30cm	Sablo/limoneux (0-50) puis sablo 90 et + Trace d'hydromorphie à 50cm	Sablo/limoneux (0-40) puis limoneux argileux 80 et +
Profondeur de sol/sondée*	1 m	1 m	1 m	1 m
Cause d'arrêt de sondage*	Limite tarrière	Limite tarrière	Limite tarrière	Limite tarrière
Texture*				
Structure				
Forme d'humus	/			
Profondeur prospectée par les racines fines*	/			
Effervescence HCL* (si oui, préciser la profondeur)				
Fertilité estimée* (essence diagnostiquée, âge estimatif, hauteur dominante, préciser la raison si diagnostic non réalisé)				

Par horizon :

Texture

Hydromorphie

% d'éléments
grosiers

Version

Exemple

10 cm

Lm
0
2%

40 cm

LmS
1
2%

60 cm

LmS
1
15%

Station correspondante :	Sondage 5	Sondage 6	Sondage 7	Sondage 8
N° sondage identique (le cas échéant)	Station 6	Station 7	Station 8	
Type de sol*	Sablo/limoneux (0-40) puis sablo argileux 80 et + Hydromorphie à 20 cm	Sablo/limoneux (0-50) puis sablo argileux 100 et + Trace d'hydromorphie à 30cm		
Profondeur de sol/sondée*	1 m	1 m		
Cause d'arrêt de sondage*	Limite tarrière	Limite tarrière		
Texture*				
Structure				
Forme d'humus	/			
Profondeur prospectée par les racines fines*	/			
Effervescence HCL* (si oui, préciser la profondeur)				
Fertilité estimée* (essence diagnostiquée, âge estimatif, hauteur dominante, préciser la raison si diagnostic non réalisé)			Peuplier dépérissant avec accrue naturelle de chêne et frêne	

Par horizon :

Texture
Hydromorphie

% d'éléments
grossiers

Lm

0

2%

10

cm

LmS

1

2%

40

cm

LmS

1

15%

60

cm

Exemple