

Impact de la création d'une retenue d'eau sur l'avifaune du domaine de Drémont, 58800 Anthien

Rappel

Le projet implique :

- La disparition d'une zone herbeuse inférieure à 2 ha
- La dérivation du ru du Drémont sur environ 200 m
- La création d'une retenue d'eau par construction d'un barrage

Point sur la connaissance actuelle de l'avifaune locale

Le tableau qui suit donne la liste des espèces qui ont été repérées sur le domaine de Drémont depuis l'année 2009 jusqu'à aujourd'hui. 63 espèces sont listées.

Ces espèces sont pour la plupart très occasionnelles :

- Certaines seulement vues ou entendues en vol (Grues cendrées, Vanneaux huppés...)
- Beaucoup se posent en hiver ou en migration pour se nourrir et se reposer
- Certaines n'ont pas été revues récemment (Pie Grièche, Bruant jaune...)

D'autres sont très probablement ou constatées nicheuses :

- Buse variable, Effraie des clochers, Chevêche d'Athéna, Pic épeiche, Hirondelles rustiques, Moineaux domestiques, Pinsons des arbres, Bruant proyer...

Impacts liés à la disparition de la zone herbeuse

Les zones herbeuses pâturées ne permettent pas la nidification d'espèces d'oiseaux.

Pour la nourriture, les prairies ne sont pas les zones les plus riches. Par ailleurs, l'impact de la suppression de 2 ha d'herbe est faible compte tenu de la surface totale en herbe sur le domaine (2 ha/ 70 ha de prairies permanentes → 2,8 %).

Impacts liés à la dérivation du ru du Drémont

Étant donné la taille du ru, il n'a pas un intérêt direct sur les oiseaux mais il favorise le développements d'insectes qui leur servent de nourriture au printemps.

Le déplacement du ru sera effectué de façon à conserver sa capacité à développer les plantes et les insectes. Il ne devrait donc pas y avoir d'impact.

Impacts liés à la présence d'une retenue d'eau

La présence d'un plan d'eau est en général source de diversité biologique.

Sa taille et sa variation importante de niveau a peu de chance d'apporter des espèces nicheuses mais il peut être une source de nourriture importante pour les espèces environnantes (insectes).

L'étang doit donc avoir un impact positif sur la présence des oiseaux.

Notons que l'attrait de la réserve sur la faune avicole peut être augmenté par la présence d'au minimum quelques zones de berge à faible pente. Cela permet aux oiseaux (et autres animaux) de se laver, boire et aussi à ceux qui seraient tombés dans l'eau de pouvoir en sortir. Une roselière serait bien, mais peu compatible avec un niveau d'eau variable.

Conclusion

L'impact du projet sur la présence des oiseaux est donc globalement nul, voire positif suivant l'attrait de la retenue d'eau.

Liste des espèces observées au domaine de Drémont de 2009 à janvier 2025 :

	<i>Phasianidae</i>
Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>
Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>
	<i>Anatidae</i>
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>
	<i>Apodidae</i>
Martinet noir	<i>Apus apus</i>
	<i>Cuculidae</i>
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>
	<i>Columbidae</i>
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>
	<i>Gruidae</i>
Grue cendrée	<i>Grus grus</i>
	<i>Charadriidae</i>
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>
	<i>Ardeidae</i>
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
	<i>Accipitridae</i>
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>
	<i>Tytonidae</i>
Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>
	<i>Strigidae</i>
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>
Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>
	<i>Upupidae</i>
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>
	<i>Picidae</i>
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>
Pic vert	<i>Picus viridis</i>
	<i>Falconidae</i>
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>
	<i>Laniidae</i>
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
	<i>Corvidae</i>
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>
	<i>Alcedinidae</i>
Martin pêcheur	<i>Alcedo atthis</i>

	<i>Paridae</i>
Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>
	<i>Alaudidae</i>
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>
	<i>Hirundinidae</i>
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
	<i>Aegithalidae</i>
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>
	<i>Phylloscopidae</i>
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>
	<i>Sylviidae</i>
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>
	<i>Troglodytidae</i>
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
	<i>Sittidae</i>
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>
	<i>Sturnidae</i>
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>
	<i>Turdidae</i>
Merle noir	<i>Turdus merula</i>
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>
	<i>Muscicapidae</i>
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Tarier pâle	<i>Saxicola rubicola</i>
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>
	<i>Passeridae</i>
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
	<i>Prunellidae</i>
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>
	<i>Motacillidae</i>
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>
	<i>Fringillidae</i>
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>
Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>
Verdier d'Europe	<i>Chloris chloris</i>
Linotte mélodieuse	<i>Linaria cannabina</i>
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>
Tarin des aulnes	<i>Spinus spinus</i>
	<i>Emberizidae</i>
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>